

★ 水稻 トビイロウンカ情報 ★

「イネウンカ類の飛来予測システム（日本植物防疫協会 J P P - N E T）」によると、京都府では6月末から現在まで断続的に飛来が予測されており、トビイロウンカも早期に飛来している可能性もあります。また、トビイロウンカは局所的に発生する傾向があり、中晩生品種には収穫までの期間が長いものもあるので、今後の発生状況に注意してください。

府内のトビイロウンカに関する現在の状況についてお知らせします。

- 府内の**予察灯**調査で**トビイロウンカ**が、京田辺市で**8月20日**に1頭、京丹後市で**21日**に2頭**確認**されました。
- 8月中旬の巡回調査における**水田の見取り・払い落とし調査**及び**すくい取り調査**では**トビイロウンカ**は**確認していません**。
- その後、8月25日に山城・南丹地域、27日に丹後地域の調査を行いました。調査は「トビイロウンカの多飛来時の調査地区」及び「平成19年にトビイロウンカによる坪枯れの発生した地点」から抽出した11地点19ほ場で行いました。
その結果、**山城地域の井手町多賀、精華町菅井、精華町下狛、木津川市山城町上狛、南丹地域の南丹市八木町北広瀬**で**トビイロウンカの長翅成虫を確認**しましたが、**短翅成虫、幼虫は見られません**でした（表1）。
- トビイロウンカの飛来世代は通常密度が低いので実害はありませんが、次世代以降急速に増殖し、坪枯れを生じさせることがあります。通常1ヶ月弱で世代を繰り返します。

表1 トビイロウンカ調査結果 調査日 山城・南丹：8月25日 丹後：8月27日

地域	調査地点	25株見取り・払い落とし調査						20回振りすくい取り調査				
		成虫		幼虫	計	程度	成虫		幼虫	計	程度	
		長翅	短翅				長翅	短翅				
山城	八幡市内里	1	0	0	0	0	無	0	0	0	0	無
		2	0	0	0	0	無	0	0	0	0	無
	井手町多賀	1	0	0	0	0	無	0	0	0	0	無
		2	0	0	0	0	無	2	0	0	2	少
	精華町下狛	1	0	0	0	0	無	1	0	0	1	少
		2	0	0	0	0	無	0	0	0	0	無
	精華町祝園	1	0	0	0	0	無	0	0	0	0	無
		2	0	0	0	0	無	0	0	0	0	無
精華町菅井	1	0	0	0	0	無	1	0	0	1	少	
	2	0	0	0	0	無	0	0	0	0	無	
木津川市山城町上狛	1	0	0	0	0	無	2	0	0	2	少	
	2	0	0	0	0	無	0	0	0	0	無	
南丹	亀岡市保津	1	0	0	0	0	無	0	0	0	0	無
		2	0	0	0	0	無	0	0	0	0	無
	南丹市八木町北広瀬	1	0	0	0	0	無	0	0	0	0	無
2		0	0	0	0	無	1	0	0	1	少	
丹後	京丹後市丹後町此代	0	0	0	0	0	無	0	0	0	0	無
	京丹後市丹後町尾和	0	0	0	0	0	無	0	0	0	0	無
	伊根町本庄浜	0	0	0	0	0	無	0	0	0	0	無