

キャベツ

病害虫発生状況

- 1 ベト病 ······ 発生を認めなかった（平年並）。
- 2 黒腐病 ······ 発生を認めなかった（平年並）。
- 3 菌核病 ······ 発生を認めなかった（平年並）。
- 4 アブラムシ類 ······ 平年並の発生であった。
- 5 モンシロチョウ ······ 発生を認めなかった（平年並）。
- 6 コナガ ······ 発生を認めなかった（平年並）。
- 7 ハスマニヨトウ ······ 発生を認めなかった。
- 8 ヨトウガ ······ 発生を認めなかった。
- 9 ウワバ類 ······ 発生を認めなかった（平年並）。
- 10 アザミウマ類 ······ 例年比やや多い発生であった。
- 11 その他の病害虫 ······

キャベツ調査結果（25株調査：害虫個体数は10株換算）

調査日：平成31年3月20日

調査場所	べと病	黒腐病	菌核病	アブラムシ類				モンシロチョウ		コナガ			ハスマニヨトウ			ヨトウガ			ウワバ類		アザミウマ類	
	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	有翅虫数 (/10株)	無翅虫数 (/10株)	発生程度指標	寄生株率 (%)	幼虫数 (/10株)	寄生株率 (%)	幼虫・蛹数 (/10株)	寄生株率 (%)	卵塊数 (/10株)	幼虫数 (/10株)	寄生株率 (%)	卵塊数 (/10株)	幼虫数 (/10株)	寄生株率 (%)	卵塊数 (/10株)	幼虫数 (/10株)	寄生株率 (%)	寄生株率 (%)	被害株率 (%)
西京区①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
西京区②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
西京区③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0
西京区④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
南区①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
南区②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
31年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7
平年(例年)比	並	並	並	並	並	一	並	並	並	並	並	一	一	一	一	一	一	一	並	並	やや多	—
平年	0.1	0.0	0.1	0.2	0.4	1.1	2.7	0.0	0.0	0.02	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	1.7	5.8
30年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28年	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	2.3	4.7	0.0	0.0	0.1	0.7	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	8.7	17.3
平均	27年	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	—
	26年	0.0	0.0	0.0	0.3	2.3	—	8.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.7	—
	25年	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	—	2.7	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.7	—
	24年	0.0	0.0	0.7	0.2	0.7	—	4.7	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—
	23年	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	—	2.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—
	22年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—
	21年	0.7	0.0	0.7	0.3	0.0	—	2.7	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—
31年	0.0	0.0	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3	
平年(例年)比	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	—	—	—	—	—	—	並	並	多		
平年	1.9	0.0	3.7	37.0	37.0	0.0	3.7	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	
発生率 (%)	30年	0.0	0.0	0.0	25.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0
	29年	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0
	28年	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	50.0	—
	27年	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0
	26年	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	16.7	—
	25年	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	16.7	—
	24年	0.0	0.0	16.7	83.3	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—
	23年	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—
	22年	0.0	0.0	0.0	0.0	—	16.7	0.0	0.0	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—
	21年	16.7	0.0	16.7	50.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—

発生程度別基準

調査項目	無	少	中	多	甚	
菌核病	発病株率 (%)	0	1~10	11~20	21~35	36以上
モンシロチョウ	10株当たり幼虫数	0	1~5	6~20	21~40	41以上
コナガ	10株当たり幼虫・蛹数	0	1~10	11~40	41~100	101以上
ヨトウガ	卵・幼虫の寄生株率 (%)	0	1~5	6~15	16~30	31以上
アブラムシ類	寄生株率 (%)	0	1~25	26~50	51~75	76以上
ハスマニヨトウ	寄生株率 (%)	0	1~5	6~15	16~30	31以上

※ アブラムシ類発生程度指数

$$\text{発生程度指数} = (4A + 3B + 2C + 1D) \times 50 / \text{(調査株数)}$$

A : 201頭～、B : 51～200頭、C : 11～50頭、D : 1～10頭、E : 寄生なし