

トマト(施設)

病害虫の発生状況

- 1 疫病、モザイク病、葉かび病、うどんこ病は、発生を認めなかった(平年並)。
- 2 アブラムシ類、コナジラミ類は、発生を認めなかった(平年並)。
- 3 ハモグリバエ類は、発生を認めなかった(平年並)。
- 4 ハスモンヨトウは、発生を認めなかった。
- 5 その他の病害虫は、発生を認めなかった。

巡回調査結果(令和2年3月17日)

25株・2複葉・4果調査(単位:%、頭/葉)

	疫病	灰色かび病	モザイク病	葉かび病	うどんこ病	アブラムシ類	アザミウマ類		コナジラミ類		ハモグリバエ類		ハスモンヨトウ	
	発病 程度	発病 程度	発病 株率	発病 程度	発病 程度	寄生 株率	寄生 花率	白ぶくれ症 果率	寄生 虫数	寄生 葉率	被害 葉率	被害 株率	寄生 株率	被害 株率
伏見①	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
久御山①	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
久御山②	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
久御山③	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
亀岡①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
平均	2年	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年比	並	-	並	並	並	並	-	並	並	並	並	-	-
	平年値	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	31年	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30年	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	-	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
	29年	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
	28年	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	27年	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	26年	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	25年	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.00	0.0	0.0	0.0	-	-
	24年	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.00	0.0	0.0	0.0	-	-
	23年	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.00	0.0	0.0	0.0	-	-
	22年	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.00	0.0	0.0	0.0	-	-
ほ場率	2年	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年比	並	-	並	並	並	並	-	並	並	並	並	-	-
	平年値	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	31年	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30年	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	29年	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	28年	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	27年	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	26年	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	25年	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	24年	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	23年	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	22年	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-

(程度別基準)

	程度	無	少	中	多	甚
疫病	発病度	0	1~25	26~50	51~75	76以上
灰色かび病	発病度	0	1~20	21~40	41~70	71以上
モザイク病	発病株率(%)	0	1~20	21~40	41~70	71以上
葉かび病、うどんこ病	発病度	0	1~20	21~40	41~60	61以上
アブラムシ類	寄生株率(%)	0	1~10	11~20	21~40	41以上
コナジラミ類	寄生成虫数(頭/葉)	0	0.01~9	10~29	30~59	60以上
	寄生葉率(%)	0	1~30	31~50	51~80	81以上
ハスモンヨトウ	寄生株率(%)	0	1~10	11~20	21~40	41以上
	被害株率(%)	0	1~10	11~20	21~40	41以上
アザミウマ類	寄生花率(%)	0	1~10	11~20	21~40	41以上
	白ぶくれ症果率(%)	0	1~5	6~15	16~30	31以上