

アズキ

- 1 チョウ目害虫による莢被害は平年並であった。
- 2 園部②及び亀岡①、②において、ハスモンヨトウ幼虫の発生を認めた。

アズキ巡回調査結果(25株200莢調査)

調査日:令和2年10月13、14日

調査結果	チョウ目害虫 食害莢率	備 考
	%	
福知山 ①	8.0	
〃 ②	9.0	オオタバコガ確認
綾 部	13.0	
園 部 ①	27.0	オオタバコガ確認
〃 ②	22.5	オオタバコガ、マメノメイガ確認
亀 岡 ①	23.5	オオタバコガ確認
〃 ②	22.5	オオタバコガ確認
〃 ③	5.0	
〃 ④	11.5	
平均	R2年	15.8
	平年比	並
	平年値	18.6
	R元年	16.5
	H30年	7.5
	H29年	7.6
	H28年	16.7
	H27年	8.6
	H26年	15.3
	H25年	14.6
	H24年	21.2
発 生 ほ場率	元年	100.0
	平年比	並
	平年値	100.0
	R元年	100.0
	H30年	100.0
	H29年	100.0
	H28年	100.0
	H27年	100.0
	H26年	100.0
	H25年	100.0
	H24年	100.0
H23年	100.0	
H22年	100.0	