

アズキ

- ・ チョウ目害虫による英被害は平年並であった。

アズキ巡回調査結果(25株200英調査)

調査日: 令和5年10月11、12、13、17日 (%)

調査結果		チョウ目害虫 食害英率	備考
舞鶴	①	13.5	
"	②	2.0	
福知山	①	5.5	ハスモンヨトウ
"	②	7.0	アズキノメイガ、オオタバコガ
綾部	①	4.5	タマナギンウワバ
"	②	4.0	フキノメイガ、アズキノメイガ
園部	①	12.5	ハスモンヨトウ、アズキノメイガ
"	②	8.0	アズキノメイガ、オオタバコガ
亀岡	①	11.5	アズキノメイガ、オオタバコガ
"	②	19.0	オオタバコガ
"	③	26.0	アズキノメイガ、オオタバコガ、マメノメイガ
"	④	31.0	オオタバコガ
平均	R5年	12.0	
	平年比	並	
	平年値	11.7	
	R4年	7.5	
	R3年	6.9	
	R2年	15.8	
	R元年	16.5	
	H30年	7.5	
	H29年	7.6	
	H28年	16.7	
	H27年	8.6	
	H26年	15.3	
H25年	14.6		
発生 ほ場率	R5年	100.0	
	平年比	並	
	平年値	100.0	
	R4年	100.0	
	R3年	100.0	
	R2年	100.0	
	R元年	100.0	
	H30年	100.0	
	H29年	100.0	
	H28年	100.0	
	H27年	100.0	
	H26年	100.0	
H25年	100.0		