

アズキ

病害虫等発生状況

- モザイク病・・・・・・・・・・・・・ 平年比やや多かった。
- 炭疽病・・・・・・・・・・・・・・・・・ 発生を認めなかった（平年並）。
- さび病・・・・・・・・・・・・・・・・・ 発生を認めなかった（平年並）。
- ハダニ類・・・・・・・・・・・・・・・・・ 発生を認めなかった（平年並）。
- アブラムシ類・・・・・・・・・・・・・ 平年比やや多かった。
- ハスモンヨトウ・・・・・・・・・・・・・ 平年並であった。
- サヤムシガ類・・・・・・・・・・・・・ 発生を認めなかった（平年並）。
- 食葉性チョウ目幼虫・・・・・ 例年比やや多かった。
- その他の病害虫・・・・・・・・・・・・・ ヨトウガの卵塊、スズメガ類の卵

(参考)ダイズにおける発生程度基準

病害虫名	調査項目	無	少	中	多	甚
べと病、葉焼病	発病度	0	1~25	26~50	50~75	76以上
	25小葉当たり虫数	0	1~80	81~330	331~1000	1001以上
ハダニ類	25株当たり虫数	0	1~5	6~25	26~50	51以上
吸葉性カメムシ類	25株当たり虫数	0	1~5	6~25	26~50	51以上
	食害度	0	1~10	11~25	26~50	51以上
ハスモンヨトウ	白変葉	0	1~2	3~5	6~7	8以上
	白変葉か所数(1a)	0	1~2	3~5	6~7	8以上

* 発病度 = $((4A + 3B + 2C + D) / (4 \times N)) \times 100$
 A: 病斑面積76%以上、B: 同面積51~75%、C: 同面積26~50%、D: 1~25%
 N: 調査株数
 * 食害度 = $((4A + 3B + 2C + D) / (4 \times N)) \times 100$
 A: 食害面積51%以上、B: 同面積26~50%、C: 同面積11~25%、D: 1~10%
 N: 調査株数

令和6年8月14、16日

調査結果	サビ病	炭疽病	さび病	ハダニ類		アブラムシ類		ハスモンヨトウ			サヤムシガ類			食葉性チョウ目幼虫		備考 (調査外株で発生を確認)	
				発生株率	虫数	発生株率	虫数	発生株率	虫数	白変葉 箇所/10a	発生株率	虫数	被害率	被害数	発生株率		虫数
	%	%	%	%	頭/25小葉	%	頭/25小葉	%	頭/25株	箇所/10a	%	頭/25株	%	箇所/25株	%	頭/25株	
福知山 ①	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
" ②	0.0	0.0	0.0	0.0	0	12.0	3	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	ヨトウガ卵塊
綾部 ①	2.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
" ②	4.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
園部 ①	12.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
" ②	3.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	2	0.0	0	0.0	0	4.0	1	
亀岡 ①	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	2	0.0	0	0.0	0	4.0	1	スズメガ類卵
" ②	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1	0.0	0	0.0	0	8.0	2	スズメガ類卵
" ③	2.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	スズメガ類卵
" ④	3.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	4.0	1	スズメガ類卵
平均	R6年	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.3	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.5
	平年比(例年比)	やや多	並	並	並	並	やや多	やや多	並	並	並	並	並	並	並	(並)	(並)
	平年値(例年値)	1.1	0.1	0.3	0.5	0.5	0.7	0.3	0.3	0.1	1.4	0.2	0.04	0.4	0.1	(1.4)	(0.3)
	R5年	0.4	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.8	0.2	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.4
	R4年	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	R3年	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.4	0.3	0.1	0.0	0.1	1.7	0.4
	R2年	2.0	0.0	0.0	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.7	0.2	0.3	0.1
	R元年	0.5	0.0	0.3	0.7	0.2	0.0	0.0	0.3	0.4	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	H30年	2.0	0.7	0.0	2.5	3.9	0.4	0.1	0.4	0.1	7.5	0.0	0.0	0.4	0.1	1.5	0.4
	H29年	0.3	0.0	2.6	0.0	0.0	0.9	0.1	0.6	0.1	0.9	0.0	0.0	0.9	0.2	3.4	0.9
H28年	0.6	0.0	0.4	1.1	0.5	5.5	2.5	0.4	0.1	0.4	0.4	0.1	1.1	0.3	2.5	0.6	
H27年	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.4	1.1	0.3	1.5	0.4	-	-	
H26年	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
発生 ほ場率	R6年	60.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0		
	平年比(例年比)	多	並	並	並	やや多	並	並	やや多	並	並	並	並	並	(やや多)		
	平年値(例年値)	32.9	2.7	3.2	9.9	8.7	5.4	31.8	2.7	7.7	(27.6)						
	R5年	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0		
	R4年	36.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0			
	R3年	33.3	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	25.0	0.1	0.0	0.0	0.0	25.0			
	R2年	41.7	8.3	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	8.3	8.3					
	R元年	25.0	0.0	8.3	8.3	0.0	9.1	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0					
	H30年	63.6	9.1	0.0	45.5	9.1	9.1	90.9	0.0	9.1	36.4						
	H29年	35.7	0.0	14.3	0.0	14.2	7.1	42.9	0.0	14.3	50.0						
H28年	36.4	0.0	9.1	18.2	45.6	9.1	18.2	9.1	18.2	36.4							
H27年	27.3	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1	27.3	18.2	27.3	-							
H26年	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-							