

ブドウ

- ・べと病は久美浜町2で発生を認めた（平年並）。
- ・うどんこ病・さび病・褐斑病は、発生を認めなかった（平年並）。
- ・灰色かび病は発生を認めなかった。
- ・ハダニ類は発生を認めなかった（平年並）。
- ・チャノキイロアザミウマは発生を認めなかった。
- ・その他の病害虫は、久美浜町3でカスミカメ被害葉が散見され、久美浜町4でブトウサビダニの発生を認めた。

ブドウ巡回調査結果（100葉、50果穂調査）（単位：％）

令和元年6月11、12日

調査結果	べと病			うどんこ病			灰色かび病		さび病		褐斑病		ハダニ類		チャノキイロアザミウマ	
	発病葉率	発病果穂率	ほ場率	発病葉率	発病果穂率	ほ場率	発病果穂率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	寄生葉率	ほ場率	被害果穂率	ほ場率
京都市山科区 1	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
” 2	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
京丹後市久美浜町 1	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
” 2	1.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
” 3	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
” 4	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
元年	0.2	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年比	並	-	並	並	-	並	-	-	並	並	並	並	並	並	-	-
平年	0.9	-	22.3	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	9.3	-	-
30年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29年	0.2	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	33.3	0.7	16.7
28年	0.8	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27年	2.8	-	33.3	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
26年	3.0	-	66.7	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
25年	1.0	-	33.3	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
24年	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
23年	1.0	-	40.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	20.0	-	-
22年	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
21年	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	40.0	-	-

発生程度別基準

(%)

	べと病		うどんこ病	灰色かび病	さび病	褐斑病	ハダニ類	チャノキイロアザミウマ
	発病葉率	発病花穂率	発病花穂率	発病花穂率	発病葉率	発病葉率	寄生葉率	被害果穂率
無	0	0	0	0	0	0	0	0
少	1~10	1~10	1~5	1~10	1~10	1~10	1~10	1~10
中	11~30	11~30	6~15	11~30	11~30	11~30	11~20	11~30
多	31~50	31~50	16~30	31~50	31~70	31~70	21~40	31~50
甚	51以上	51以上	31以上	51以上	71以上	71以上	41以上	51以上