ブドウ

・べと病は、平年比少なかった。
・うどんこ病は、発生を認めなかった(平年並)。
・さび病は、平年比やや多い発生であった。
・褐斑病は、平年比やや多く、特に山科区で中程度の発生であった。
・ハダニ類は、平年比多かった。
・その他の病害虫として、久美浜町③でサビダニの被害葉を認めた。
・久美浜町③で、果実に晩腐病の発生を認めた。

発生程度別基準　　（%）

	べと病	さび病	褐斑病	ハダニ類
	発病葉率	発病葉率	発病葉率	寄生葉率
無	0	0	0	0
少	１～１０	１～１０	１～１０	１～１０
中	１１～３０	１１～３０	１１～３０	１１～２０
多	３１～５０	３１～７０	３１～７０	２１～４０
甚	５１以上	７１以上	７１以上	４１以上

ブドウ巡回調査結果（１００葉調査）　（単位：%）　　調査日：令和２年９月１１日、１５日

調査結果	べと病		うどんこ病		さび病		褐斑病		ハダニ類	
	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	寄生葉率	ほ場率
京都市山科区　①	0.0		0.0		0.0		28.0		0.0	
〃　②	0.0		0.0		0.0		17.0		0.0	
京丹後市久美浜町①	0.0		0.0		35.0		0.0		0.0	
〃　②	6.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
〃　③	0.0		0.0		0.0		0.0		2.0	
〃　④	6.0		0.0		21.0		1.0		0.0	
Ｒ２年	2.0	33.3	0.0	0.0	9.3	33.3	7.7	50.0	0.3	16.7
平年比	少	少	並	並	やや多	並	やや多	やや多	多	やや多
平　年	14.8	73.3	0.4	9.0	6.9	46.3	1.6	10.0	0.1	3.7
Ｒ元年	2.7	50.0	0.0	0.0	6.0	50.0	14.5	50.0	0.3	16.7
Ｈ３０年	7.8	100.0	0.0	0.0	4.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Ｈ２９年	12.3	100.0	0.0	0.0	1.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Ｈ２８年	8.3	83.3	0.0	0.0	2.5	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ｈ２７年	15.7	83.3	1.5	16.7	15.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Ｈ２６年	4.7	50.0	1.5	33.3	23.8	66.7	1.8	50.0	0.0	0.0
Ｈ２５年	9.5	66.7	0.0	0.0	12.0	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Ｈ２４年	25.0	60.0	0.4	20.0	1.8	40.0	0.0	0.0	0.2	20.0
Ｈ２３年	22.8	80.0	0.0	0.0	0.8	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ｈ２２年	39.0	60.0	0.6	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0