ブドウ

１　べと病・・・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
２　うどんこ病・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
３　灰色かび病・・・・・・・・発生を認めなかった(例年並)。
４　さび病・・・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
５　褐斑病・・・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
６　ハダニ類・・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
７　チャノキイロアザミウマ・発生を認めなかった(例年並)。
８　その他の病害虫・・・・・発生を認めなかった。

発生程度別基準　（%）

	べと病		うどんこ病	灰色かび病	さび病	褐斑病	ハダニ類	チャノキイロアザミウマ
	発病葉率	発病花穂率	発病花穂率	発病花穂率	発病葉率	発病葉率	寄生葉率	被害果穂率
無	0	0	0	0	0	0	0	0
少	1～10	1～10	1～5	1～10	1～10	1～10	1～10	1～10
中	11～30	11～30	6～15	11～30	11～30	11～30	11～20	11～30
多	31～50	31～50	16～30	31～50	31～70	31～70	21～40	31～50
甚	51以上	51以上	31以上	51以上	71以上	71以上	41以上	51以上

ブドウ巡回調査結果（１００葉、５０果穂調査）

調査日：令和６年６月１８日　（%）

調査結果	べと病			うどんこ病			灰色かび病		さび病		褐斑病		ハダニ類		チャノキイロアザミウマ	
	発病葉率	発病果穂率	ほ場率	発病葉率	発病果穂率	ほ場率	発病果穂率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	寄生葉率	ほ場率	被害果穂率	ほ場率
京都市山科区　①	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
〃　②	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
京丹後市久美浜町①	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
〃　②	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
〃　③	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
〃　④	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
Ｒ６年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年比(例年比)	並	(並)	並	並	(並)	並	(並)	(並)	並	並	並	並	並	並	(並)	(並)
平年(例年)	0.8	(0.0)	20.0	0.0	(0.0)	1.7	(0.0)	(0.0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	5.0	(0.1)	(2.1)
Ｒ５年	1.2	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ｒ４年	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	16.7	0.0	0.0
Ｒ３年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ｒ２年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ｒ元年	0.2	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ｈ３０年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ｈ２９年	0.2	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	33.3	0.7	16.7
Ｈ２８年	0.8	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ｈ２７年	2.8	－	33.3	0.0	－	0.0	－	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－
Ｈ２６年	3.0	－	66.7	0.0	－	0.0	－	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－