

ブドウ

病害虫等発生状況

- 1 ベと病・・・・・・・・・・平年並であった。
- 2 うどんこ病・・・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 3 さび病・・・・・・・・・・平年並であった。
- 4 褐斑病・・・・・・・・・・平年並であった。
- 5 ハダニ類・・・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 6 その他の病害虫・・・・・・・・ハスモンヨトウ卵塊：久美浜町①、④

発生程度別基準 (％)

	べと病	さび病	褐斑病	ハダニ類
	発病葉率	発病葉率	発病葉率	寄生葉率
無	0	0	0	0
少	1～10	1～10	1～10	1～10
中	11～30	11～30	11～30	11～20
多	31～50	31～70	31～70	21～40
甚	51以上	71以上	71以上	41以上

ブドウ巡回調査結果 (100葉調査)

調査日：令和6年9月17日 (％)

調査結果	べと病		うどんこ病		さび病		褐斑病		ハダニ類	
	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	寄生葉率	ほ場率
京都市山科区 ①	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
” ②	1.0		0.0		0.0		2.0		0.0	
京丹後市久美浜町①	2.0		0.0		76.0		0.0		0.0	
” ②	27.0		0.0		5.0		0.0		0.0	
” ③	16.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
” ④	5.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
R6年	8.5	83.3	0.0	0.0	13.5	33.3	0.3	16.7	0.0	0.0
平年比	並	並	並	並	並	やや少	並	並	並	並
	並		並		並		並		並	
平年	9.3	80.0	0.3	5.0	10.4	53.3	3.1	23.3	0.1	6.7
R5年	17.5	100.0	0.0	0.0	15.8	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0
R4年	12.2	100.0	0.0	0.0	13.5	66.7	3.2	33.3	0.0	0.0
R3年	10.3	100.0	0.0	0.0	11.7	66.7	3.8	50.0	0.3	33.3
R2年	2.0	33.3	0.0	0.0	9.3	33.3	7.7	50.0	0.3	16.7
R元年	2.7	50.0	0.0	0.0	6.0	50.0	14.5	50.0	0.3	16.7
H30年	7.8	100.0	0.0	0.0	4.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
H29年	12.3	100.0	0.0	0.0	1.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
H28年	8.3	83.3	0.0	0.0	2.5	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H27年	15.7	83.3	1.5	16.7	15.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0
H26年	4.7	50.0	1.5	33.3	23.8	66.7	1.8	50.0	0.0	0.0