ブドウ

・べと病は平年比やや少ない発生であった。
・うどんこ病、さび病、褐斑病は発生を認めなかった(平年並)。
・ハダニ類は発生を認めなかった(平年並)。
・果房調査は一分のみで行い、病害虫の発生は認めなかった。
・その他の病害虫は、発生を認めなかった。

発生程度別基準　　（％）

	べと病	さび病	褐斑病	ハダニ類
	発病葉率	発病葉率	発病葉率	寄生葉率
無	0	0	0	0
少	１～１０	１～１０	１～１０	１～１０
中	１１～３０	１１～３０	１１～３０	１１～２０
多	３１～５０	３１～７０	３１～７０	２１～４０
甚	５１以上	７１以上	７１以上	４１以上

ブドウ巡回調査結果（１００葉調査）　　調査日：令和３年７月１５日

調査結果	べと病		うどんこ病		さび病		褐斑病		ハダニ類		備考
	発病葉率(%)	ほ場率(%)	発病葉率(%)	ほ場率(%)	発病葉率(%)	ほ場率(%)	発病葉率(%)	ほ場率(%)	寄生葉率(%)	ほ場率(%)	
京都市山科区　①	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
〃　②	1.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
京丹後市久美浜町①	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
〃　②	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
〃　③	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
〃　④	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
Ｒ３年	0.2	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
平年比	やや少	やや少	並	並	並	並	並	並	並	並	
平　年	5.5	49.3	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.1	3.3	
Ｒ２年	0.8	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	16.7	0.0	0.0	
Ｒ元年	0.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ｈ３０年	15.8	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ｈ２９年	1.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	33.3	
Ｈ２８年	5.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ｈ２７年	6.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ｈ２６年	1.7	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ｈ２５年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ｈ２４年	4.2	60.0	0.2	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ｈ２３年	20.2	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	