

チャ

病害虫発生状況

1 病害の平年（例年）比較

	炭疽病	輪斑病	灰色かび病	新梢枯死症	もち病	網もち病
山城	並	多	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)
丹波	並	多	並 (発生を認めず)	やや多	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)
丹後	並 (発生を認めず)	多	並 (発生を認めず)	並	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)

2 害虫（No. 1）の平年（例年）比較

	カンザワハダニ	チャノホソガ			チャノコカクモンハマキ		
		調査	フェロモントラップ		調査	フェロモントラップ	
			誘殺数	誘殺時期		誘殺数	誘殺時期
山城	やや多	やや少	並	並	やや多	やや少	早
丹波	やや多	やや多	並	遅い	多	やや少	並
丹後	多	やや多	多	並	並	やや多	早

3 害虫（No. 2）の平年（例年）比較

	チャノキイロ アザミウマ	チャノミドリヒメ ヨコバイ	コミカン アブラムシ	ツマグロアオ カスミカメ	クワシロ カイガラムシ	チャトゲ コナジラミ
山城	並	やや多	やや多	やや少	並	少
丹波	並	やや多	やや多	やや少	並	並
丹後	並	やや多	並	並	並	並

4 その他の病害虫

舞鶴市2及び京丹後市1でかみのけ病散見。

京丹後市1でオオミノガ散見。

発生程度別基準(チャ)

病害虫名	調査項目	程 度				
		無	少	中	多	甚
炭疽病	病葉数/m ²	0	≦50	≦200	≦500	500<
輪斑病	病葉数/m ²	0	≦50	≦200	≦500	500<
もち病	病葉数/m ²	0	≦50	≦300	≦1000	1000<
網もち病	病葉数/m ²	0	≦50	≦300	≦1000	1000<
カンザワハダニ	寄生葉率(%)	0	≦10	≦30	≦70	70<
チャノホソガ	巻葉数/m ²	0	≦30	≦100	≦250	250<
チャノコカクモンハマキ	幼虫数/m ²	0	≦5	≦15	≦35	35<
チャノミドリヒメヨコバイ	被害芽率(%)	0	≦5	≦15	≦30	30<
ツマグロアオカスミカメ	被害芽数/m ²	0	≦25	≦80	≦160	160<
クワシロカイガラムシ	寄生株率(%)	0	≦20	≦50	≦70	70<

チャ病害虫発生状況平年比較（害虫No. 2）

チャノキイロアザミウマ

10月

地域	平年比	項目 \ 年次	平年比	R01	平年	H30	H29	H28	H27	H26	H25	H24	H23	H22	H21
山城	並	寄生・被害芽率 (%)	並	24.8	25.3	20.8	42.9	26.5	10.6	15.5	50.2	28.7	13.8	15.2	28.9
		虫数	並	22.8	62.0	10.2	101.1	24.6	0.7	0.7	309.1	15.3	21.9	118.8	18.0
		発生ほ場率 (%)	やや多	100.0	88.3	100.0	100.0	76.9	88.9	75.0	100.0	91.7	93.8	63.6	93.3
丹波	並	寄生・被害芽率 (%)	並	12.0	13.5	3.6	16.0	0.0	30.0	3.3	12.3	6.7	5.5	15.7	42.0
		虫数	並	3.2	7.4	0.4	27.0	0.0	34.0	0.0	3.0	0.0	6.0	3.7	0.0
		発生ほ場率 (%)	並	100.0	73.2	40.0	100.0	0.0	100.0	66.7	100.0	66.7	75.0	83.3	100.0
丹後	並	寄生・被害芽率 (%)	並	8.0	20.3	2.0	15.0	2.0	45.0	16.0	34.7	10.0	2.0	56.0	-
		虫数	並	1.0	1.8	0.0	1.0	2.0	3.0	0.5	0.0	4.0	0.0	6.0	-
		発生ほ場率 (%)	並	100.0	91.7	100.0	100.0	75.0	100.0	50.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-

チャノミドリヒメヨコバイ

10月

地域	平年比	項目 \ 年次	平年比	R01	平年	H30	H29	H28	H27	H26	H25	H24	H23	H22	H21
山城	やや多	寄生・被害芽率 (%)	やや多	12.8	7.2	12.0	6.9	5.5	4.1	7.7	16.7	4.0	8.1	5.8	1.1
		虫数	並	4.3	10.2	12.1	7.7	3.8	3.1	3.6	41.1	8.4	12.4	9.2	0.9
		発生ほ場率 (%)	並	46.2	45.6	66.7	38.9	46.1	70.6	13.6	54.5	35.7	62.5	40.9	26.7
丹波	やや多	寄生・被害芽率 (%)	やや多	21.2	11.8	10.8	16.0	3.5	16.0	20.3	0.3	24.0	3.5	23.3	0.0
		虫数	やや多	22.4	14.6	22.0	33.0	3.5	19.0	8.3	0.3	14.0	3.5	42.3	0.0
		発生ほ場率 (%)	やや多	83.3	62.7	60.0	50.0	100.0	100.0	100.0	16.7	66.7	50.0	83.3	0.0
丹後	やや多	寄生・被害芽率 (%)	やや多	10.0	3.7	10.0	13.0	1.5	2.0	0.0	4.7	0.0	0.0	2.0	-
		虫数	やや多	8.0	2.7	12.0	6.0	1.5	3.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	-
		発生ほ場率 (%)	並	100.0	57.4	100.0	100.0	50.0	100.0	0.0	66.7	0.0	0.0	100.0	-

コミカンアブラムシ

10月

地域	平年比	項目 \ 年次	平年比	R01	平年	H30	H29	H28	H27	H26	H25	H24	H23	H22	H21
山城	やや多	寄生芽率 (%)	やや多	1.1	0.9	4.1	1.0	0.6	0.1	0.5	0.7	0.1	0.6	1.0	0.4
		虫数	やや多	5.8	8.0	49.6	4.3	7.2	0.1	6.6	4.0	0.9	3.0	3.2	1.3
		発生ほ場率 (%)	並	23.1	26.4	83.3	22.2	23.1	6.3	9.1	36.4	7.1	31.3	31.8	13.3
丹波	やや多	寄生芽率 (%)	やや多	6.0	3.8	6.0	3.0	7.0	3.0	0.7	1.3	1.3	1.5	13.7	0.0
		虫数	並	25.2	21.3	38.4	13.0	36.0	5.0	2.0	7.0	20.7	9.0	82.0	0.0
		発生ほ場率 (%)	やや多	100.0	57.7	60.0	100.0	100.0	50.0	33.3	50.0	33.3	50.0	100.0	0.0
丹後	並	寄生芽率 (%)	並	1.0	4.5	14.0	3.0	5.0	0.0	0.0	0.7	0.0	18.0	0.0	-
		虫数	並	6.0	50.0	50.0	14.0	19.5	0.0	0.0	28.7	0.0	338.0	0.0	-
		発生ほ場率 (%)	並	50.0	39.8	100.0	50.0	75.0	0.0	0.0	33.3	0.0	100.0	0.0	-

ツマグロアオカシミカメ

10月

地域	平年比	項目 \ 年次	平年比	R01	平年	H30	H29	H28	H27	H26	H25	H24	H23	H22	H21
山城	やや少	被害芽率 (%)	やや少	0.0	1.5	1.4	1.7	2.6	1.5	0.6	0.0	3.0	0.0	3.9	0.1
		被害葉数	やや少	0.3	0.7	0.3	0.5	1.3	0.7	2.7	0.5	0.4	0.1	0.0	0.4
		発生ほ場率 (%)	やや少	9.1	28.9	45.5	36.4	31.8	27.3	27.3	28.6	40.9	6.3	40.9	4.5
丹波	やや少	被害芽率 (%)	やや少	1.6	4.6	9.2	4.0	2.5	14.0	3.0	5.0	0.0	0.5	7.3	0.0
		被害葉数	並	2.8	6.4	4.5	14.0	2.2	13.0	11.5	0.0	0.0	5.2	12.7	1.2
		発生ほ場率 (%)	並	83.3	68.3	83.3	66.7	66.7	83.3	100.0	83.3	0.0	66.7	100.0	33.3
丹後	並	被害芽率 (%)	並	3.0	8.0	0.0	0.0	25.0	0.0	4.0	3.3	4.0	10.0	26.0	-
		被害葉数	やや少	1.3	10.0	0.5	12.5	0.0	28.5	2.5	2.5	3.5	4.0	18.5	27.0
		発生ほ場率 (%)	やや多	100.0	62.5	50.0	25.0	50.0	50.0	75.0	75.0	50.0	50.0	100.0	100.0

クワシロカイガラムシ

10月

地域	平年比	項目 \ 年次	平年比	R01	平年	H30	H29	H28	H27	H26	H25	H24	H23	H22	H21
山城	並	寄生株率 (%)	並	24.5	20.5	7.5	13.0	30.0	11.1	15.5	26.7	27.3	7.7	35.5	30.5
		発生ほ場率 (%)	やや少	36.4	62.2	31.8	63.6	81.8	59.1	50.5	71.4	59.1	31.8	95.5	77.3
丹波	並	寄生株率 (%)	並	21.7	26.0	4.2	11.7	29.2	20.8	28.3	13.3	44.2	40.0	40.8	27.5
		発生ほ場率 (%)	やや多	100.0	75.0	33.3	66.7	83.3	66.7	83.3	66.7	100.0	83.3	100.0	66.7
丹後	並	寄生株率 (%)	並	12.5	21.0	20.0	21.3	50.0	50.0	5.0	46.3	12.5	5.0	0.0	0.0
		発生ほ場率 (%)	やや少	50.0	75.0	100.0	100.0	100.0	100.0	50.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0

チャトゲコナジラミ

10月

地域	平年比	項目 \ 年次	平年比	R01	平年	H30	H29	H28	H27	H26	H25	H24	H23	H22	H21
山城	少	寄生葉率 (%)	—	11.5	—	14.1	11.9	11.6	16.5	26.4	25.5	13.6	22.3	37.7	25.2
		発生量指数	—	6.9	—	7.6	6.9	6.8	11.0	10.0	8.5	4.5	9.3	17.2	12.3
		発生ほ場率 (%)	少	22.7	67.2	13.6	68.2	72.7	81.9	72.7	76.2	54.5	72.7	90.9	68.2
丹波	並	寄生葉率 (%)	—	2.7	—	12.0	3.3	10.7	6.0	29.2	2.5	38.3	3.3	4.2	0.0
		発生量指数	—	1.3	—	6.0	1.7	5.3	3.0	11.1	0.8	16.9	1.1	1.4	0.0
		発生ほ場率 (%)	並	50.0	50.8	66.7	33.3	100.0	83.3	66.7	25.0	66.7	33.3	33.3	0.0
丹後	並	寄生葉率 (%)	—	32.0	—	68.5	14.5	19.5	60.0	68.8	85.0	85.0	100.0	100.0	100.0
		発生量指数	—	18.8	—	50.5	8.0	12.0	51.3	47.9	67.1	31.7	78.3	100.0	94.2
		発生ほ場率 (%)	並	100.0	97.5	100.0	100.0	100.0	100.0	75.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

※H26年以前は参考値
(寄生葉率ではなく、寄生箇所率を調査)

令和元年 チャの病害発生状況（m²当たり）

山城地域		炭疽病 (病葉数)	輪斑病 (病葉数)	灰色かび病 (病葉数・枝数)	新梢枯死症 (枯死枝数)	もち病 (病葉数)	網もち病 (病葉数)	備 考
調査日	10月18日							
宇治市	1	0	0	0	0	0	0	
"	2	0	0	0	0	0	0	
"	3	1	0	0	0	0	0	
"	4	1	0	0	0	0	0	
"	5	0	0	0	0	0	0	
"	6	0	0	0	0	0	0	
城陽市	1	0	0	0	0	0	0	
"	2	0	0	0	0	0	0	
宇治田原町	1	0	0	0	0	0	0	
"	2	0	0	0	0	0	0	
"	3	0	0	0	0	0	0	
"	4	0	0	0	0	0	0	
京田辺市	1	0	0	0	0	0	0	
"	2	0	0	0	0	0	0	
木津川市	1	24	0	0	0	0	0	
"	2	15	0	0	0	0	0	
和束町	1	0	0	0	0	0	0	
"	2	0	0	0	0	0	0	
"	3	0	0	0	0	0	0	
"	4	17	44	0	0	0	0	
"	5	3	1	0	0	0	0	
"	6	0	0	0	0	0	0	
	平均値	2.8	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	前年値	0.5	0.2	0.0	0.5	0.0	0.0	
	平年値	2.9	0.03	0.0	0.3	1.6	0.0	
発生ほ場率	元年値(%)	22.7	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
	前年値(%)	22.7	9.1	0.0	22.7	0.0	0.0	
	平年値(%)	27.8	1.8	0.0	8.5	2.3	0.0	

丹波地域		炭疽病 (病葉数)	輪斑病 (病葉数)	灰色かび病 (病葉数・枝数)	新梢枯死症 (枯死枝数)	もち病 (病葉数)	網もち病 (病葉数)	備 考
調査日	10月15、17日							
福知山市	1	0	12	0	1	0	0	
"	2	1	9	0	0	0	0	
綾部市	1	1	11	0	0	0	0	
"	2	3	26	0	3	0	0	
舞鶴市	1	0	1	0	0	0	0	
"	2	0	1	0	0	0	0	かみのけ病散見
	平均値	0.8	10.0	0.0	0.7	0.0	0.0	
	前年値	3.3	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	2.3	0.4	0.0	0.5	1.7	0.0	
発生ほ場率	元年値(%)	50.0	100.0	0.0	16.7	0.0	0.0	
	前年値(%)	50.0	100.0	0.0	16.7	0.0	0.0	
	平年値(%)	43.3	23.3	0.0	16.7	10.0	0.0	

丹後地域		炭疽病 (病葉数)	輪斑病 (病葉数)	灰色かび病 (病葉数・枝数)	新梢枯死症 (枯死枝数)	もち病 (病葉数)	網もち病 (病葉数)	備 考
調査日	10月16日							
京丹後市	1	0	5	0	0	0	0	調査外に新梢枯死症。かみのけ病散見。
"	2	0	0	0	0	0	0	
"	3	0	0	0	0	0	0	調査外に新梢枯死症。
"	4	0	0	0	0	0	0	
	平均値	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
	前年値	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	12.1	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	
発生ほ場率	元年値(%)	0.0	25.0	0.0	50.0	0.0	0.0	
	前年値(%)	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値(%)	45.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	

令和元年 チャの虫害発生状況（No. 1）

山城地域	カンザワハダニ				チャノホソガ					チャノコカクモンハマキ					備考
	寄生葉率	成虫数	幼虫数	合計	寄生葉率	卵数	潜行数	葉緑数	合計	巻葉数	綴葉数	幼虫数	蛹数	合計	
調査日	(%)	100葉当たり	100葉当たり	100葉当たり	(%)	100芽当たり	100芽当たり	100芽当たり	100芽当たり	m ² 当たり	m ² 当たり	m ² 当たり	m ² 当たり	m ² 当たり	
宇治市 1	2.0	2	0	2	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
” 2	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
” 3	2.0	2	0	2	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
” 4	10.0	20	62	82	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
” 5	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
” 6	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
城陽市 1	2.0	2	0	2	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
” 2	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宇治田原町 1	2.0	2	0	2	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	
” 2	0.0	0	0	0	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	
” 3	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	22	7	2	0	2	
” 4	2.0	0	2	2	0.0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	
京田辺市 1	4.0	4	0	4	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
” 2	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
木津川市 1	0.0	0	0	0	—	—	—	—	—	1	0	0	0	0	
” 2	0.0	0	0	0	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	
和束町 1	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	
” 2	0.0	0	0	0	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	
” 3	0.0	0	0	0	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	
” 4	0.0	0	0	0	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	
” 5	6.0	0	30	30	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	
” 6	2.0	2	0	2	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	
平均値	1.5	1.5	4.3	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.3	0.1	0.0	0.1	
前年値	0.1	0.1	0.0	0.1	0.6	0.0	0.2	0.3	0.5	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	
平年値	1.1	2.8	2.6	5.4	8.1	0.3	4.2	6.3	10.7	6.3	0.6	0.01	0.0	0.01	
発生ほ場率	元年値 (%)	40.9			18.2					4.5					
	前年値 (%)	4.5			11.1					9.1					
	平年値 (%)	13.6			45.1					15.7					

丹波地域	カンザワハダニ				チャノホソガ					チャノコカクモンハマキ					備考
	寄生葉率	成虫数	幼虫数	合計	寄生葉率	卵数	潜行数	葉緑数	合計	巻葉数	綴葉数	幼虫数	蛹数	合計	
調査日	(%)	100葉当たり	100葉当たり	100葉当たり	(%)	100芽当たり	100芽当たり	100芽当たり	100芽当たり	m ² 当たり	m ² 当たり	m ² 当たり	m ² 当たり	m ² 当たり	
福知山市 1	0.0	0	0	0	30.0	0	30	12	42	1	4	8	2	10	
” 2	2.0	0	32	32	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	
綾部市 1	3.0	2	3	5	52.0	0	52	14	66	3	4	2	0	2	
” 2	0.0	0	0	0	44.0	0	46	34	80	0	0	11	0	11	
舞鶴市 1	4.0	4	0	4	14.0	0	6	10	16	20	2	1	0	1	
” 2	0.0	0	0	0	6.0	0	2	4	6	1	0	0	0	0	
平均値	1.5	1.0	5.8	6.8	29.2	0.0	27.2	14.8	42.0	4.2	1.7	3.7	0.3	4.0	
前年値	0.3	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.2	0.0	0.0	0.2	
平年値	1.4	2.2	2.3	4.5	15.0	0.4	23.3	9.8	33.4	2.5	1.5	0.2	0.0	0.2	
発生ほ場率	元年値 (%)	50.0			100.0					66.7					
	前年値 (%)	16.7			66.7					16.7					
	平年値 (%)	25.0			55.0					28.3					

丹後地域	カンザワハダニ				チャノホソガ					チャノコカクモンハマキ					備考
	寄生葉率	成虫数	幼虫数	合計	寄生葉率	卵数	潜行数	葉緑数	合計	巻葉数	綴葉数	幼虫数	蛹数	合計	
調査日	(%)	100葉当たり	100葉当たり	100葉当たり	(%)	100芽当たり	100芽当たり	100芽当たり	100芽当たり	m ² 当たり	m ² 当たり	m ² 当たり	m ² 当たり	m ² 当たり	
京丹後市 1	0.0	0	0	0	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	
” 2	4.0	2	18	20	6.0	0	6	0	6	3	0	0	0	0	
” 3	2.0	2	0	2	8.0	0	4	4	8	4	0	0	0	0	
” 4	4.0	2	40	42	—	—	—	—	—	4	0	0	0	0	
平均値	2.5	1.5	14.5	16.0	7.0	0.0	5.0	2.0	7.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
前年値	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
平年値	0.4	0.4	0.6	1.0	5.1	5.3	2.8	2.5	10.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
発生ほ場率	元年値 (%)	75.0			75.0					0.0					
	前年値 (%)	0.0			100.0					0.0					
	平年値 (%)	12.5			40.0					0.0					

令和元年 チャの虫害発生状況 (No. 2)

山城地域		チャノキイロアザミウマ		チャノミドリヒメヨコバイ		コミカンアブラムシ		ツマグロアオカスミカメ		クワシロカイガラムシ	チャトゲコナジラミ				
		被害・寄生芽率 (%)	虫数 100芽当たり	被害・寄生芽率 (%)	虫数 100芽当たり	寄生芽率 (%)	虫数 100芽当たり	被害芽率 (%)	被害葉数 m ² 当たり	寄生株率 (%)	寄生葉率 (%)	発生程度別葉数			発生量指数
調査日	10月18日	(%)		(%)		(%)		(%)		(%)		0	1	2	
宇治市	1	20.0	20	0.0	0	0.0	0	0.0	0	5.0	0.0	50	0	0	0
"	2	2.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	50	0	0	0
"	3	68.0	250	0.0	0	0.0	0	0.0	0	30.0	8.0	46	4	0	4
"	4	2.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	80.0	16.0	42	7	1	9
"	5	30.0	2	14.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	10.0	45	5	0	5
"	6	94.0	2	4.0	4.0	0.0	0	0.0	0	0.0	6.0	47	2	1	4
城陽市	1	6.0	0	10.0	12	0.0	0	0.0	0	0.0	10.0	45	5	0	5
"	2	12.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	50	0	0	0
宇治田原町	1	-	-	-	-	-	-	-	0	5.0	4.0	48	2	0	2
"	2	-	-	-	-	-	-	-	0	0.0	0.0	50	0	0	0
"	3	14.0	10	20.0	18	10.0	50	0.0	0	55.0	8.0	46	4	0	4
"	4	4.0	2	18.0	22	0.0	0	0.0	0	5.0	24.0	38	12	0	12
京田辺市	1	16.0	0	100.0	0	2.0	2	0.0	0	75.0	66.0	17	17	16	49
"	2	12.0	2	0.0	0	2.0	24	0.0	0	0.0	70.0	15	28	7	42
木津川市	1	-	-	-	-	-	-	-	1	5.0	2.0	49	1	0	1
"	2	-	-	-	-	-	-	-	0	70.0	4.0	48	2	0	2
和束町	1	42.0	4	0.0	0	0.0	0	0.0	5	60.0	0.0	50	0	0	0
"	2	-	-	-	-	-	-	-	0	0.0	2.0	49	1	0	1
"	3	-	-	-	-	-	-	-	0	65.0	8.0	46	4	0	4
"	4	-	-	-	-	-	-	-	0	40.0	4.0	48	2	0	2
"	5	-	-	-	-	-	-	-	0	35.0	4.0	48	2	0	2
"	6	-	-	-	-	-	-	-	0	10.0	6.0	47	3	0	3
	平均値	24.8	22.8	12.8	4.3	1.1	5.8	0.0	0.3	24.5	11.5				6.9
	前年値	20.8	10.2	12.0	13.0	4.1	49.6	1.4	0.3	7.5	14.1				7.6
	平年値	25.3	62.0	7.2	10.2	0.9	8.0	1.5	0.7	20.5					
発生ほ場率	元年値 (%)	100.0		46.2		23.1		9.1		36.4	22.7				
	前年値 (%)	100.0		66.7		83.3		45.5		31.8	13.6				
	平年値 (%)	88.3		45.6		26.4		28.9		62.2	67.2				

丹波地域		チャノキイロアザミウマ		チャノミドリヒメヨコバイ		コミカンアブラムシ		ツマグロアオカスミカメ		クワシロカイガラムシ	チャトゲコナジラミ				
		被害・寄生芽率 (%)	虫数 100芽当たり	被害・寄生芽率 (%)	虫数 100芽当たり	寄生芽率 (%)	虫数 100芽当たり	被害芽率 (%)	被害葉数 m ² 当たり	寄生株率 (%)	寄生葉率 (%)	発生程度別葉数			発生量指数
調査日	10月15、17日	(%)		(%)		(%)		(%)		(%)		0	1	2	
福知山市	1	8.0	0	14.0	14	12.0	54	8.0	0	15.0	2.0	49	1	0	1
"	2	-	-	-	-	-	-	-	6	45.0	0.0	50	0	0	0
綾部市	1	12.0	2	40.0	24	6.0	42	0.0	4	15.0	0.0	50	0	0	0
"	2	4.0	8	12.0	16	2.0	4	0.0	0	15.0	0.0	50	0	0	0
舞鶴市	1	30.0	6	0.0	0	4.0	6	0.0	5	10.0	8.0	46	4	0	4
"	2	6.0	0	40.0	58	6.0	20	0.0	2	30.0	6.0	47	3	0	3
	平均値	12.0	3.2	21.2	22.4	6.0	25.2	1.6	2.8	21.7	2.7				1.3
	前年値	3.6	0.4	10.8	22.0	6.0	38.4	9.2	4.5	4.2	12.0				6.0
	平年値	13.5	7.4	11.8	14.6	3.8	21.3	4.6	6.4	26.0					
発生ほ場率	元年値 (%)	100.0		83.3		100.0		83.3		100.0	50.0				
	前年値 (%)	40.0		60.0		60.0		83.3		33.3	66.7				
	平年値 (%)	73.2		62.7		57.7		68.3		75.0	50.8				

丹後地域		チャノキイロアザミウマ		チャノミドリヒメヨコバイ		コミカンアブラムシ		ツマグロアオカスミカメ		クワシロカイガラムシ	チャトゲコナジラミ				
		被害・寄生芽率 (%)	虫数 100芽当たり	被害・寄生芽率 (%)	虫数 100芽当たり	寄生芽率 (%)	虫数 100芽当たり	被害芽率 (%)	被害葉数 m ² 当たり	寄生株率 (%)	寄生葉率 (%)	発生程度別葉数			発生量指数
調査日	10月16日	(%)		(%)		(%)		(%)		(%)		0	1	2	
京丹後市	1	-	-	-	-	-	-	-	2	15.0	28.0	36	13	1	15
"	2	4.0	2	4.0	4	2.0	12	4.0	1	35.0	26.0	37	12	1	14
"	3	12.0	0	16.0	12	0.0	0	2.0	2	0.0	62.0	19	23	8	39
"	4	-	-	-	-	-	-	-	0	0.0	12.0	44	5	1	7
	平均値	8.0	1.0	10.0	8.0	1.0	6.0	3.0	1.3	12.5	32.0				18.8
	前年値	2.0	0.0	10.0	12.0	14.0	50.0	0.0	0.5	20.0	68.5				50.5
	平年値	20.3	1.8	3.7	2.7	4.5	50.0	8.0	10.0	21.0					
発生ほ場率	元年値 (%)	100.0		100.0		50.0		100.0		50.0	100.0				
	前年値 (%)	100.0		100.0		100.0		50.0		100.0	100.0				
	平年値 (%)	91.7		57.4		39.8		62.5		75.0	97.5				

※ チャトゲコナジラミの発生程度 0:寄生がみられない 1:1~9匹/葉 2:10匹以上/葉

発生量指数 = (N1+2×N2) / 100 × 100

チャノホソガ誘殺数(フェロモントラップ)

調査場所:宇治市(茶業研究所)

誘殺数: 平年並

誘殺盛期: 平年並

月・半旬	H31-R01	平年	H30	H29	H28	H27	H26	H25	H24	H23	H22	H21
4・1	6.7	108.0	59.3	2.0	84.0	335.8	46.0	456.0	21.0	1.0	54.0	21.0
2	73.0	100.7	33.0	160.0	50.3	132.0	57.0	339.0	117.0	28.0	17.0	64.0
3	43.0	150.1	26.4	134.7	50.8	38.0	8.0	214.0	651.0	18.0	107.0	253.0
4	101.0	173.7	21.6	207.1	32.0	82.0	88.0	339.0	860.0	27.0	14.0	66.0
5	59.0	147.9	11.0	75.3	54.0	84.7	93.0	65.0	1024.0	27.0	5.0	40.0
6	13.0	59.5	8.7	62.0	17.0	27.3	95.0	50.0	279.0	26.0	10.0	20.0
5・1	11.3	45.0	8.5	34.0	11.3	2.0	35.0	35.0	231.0	35.0	22.0	36.0
2	1.5	32.2	5.0	28.0	5.8	2.0	27.0	34.0	116.0	63.0	24.0	17.0
3	3.3	13.0	2.8	8.6	2.0	0.0	22.0	36.0	27.0	13.0	14.0	5.0
4	0.0	3.9	4.0	1.4	11.4	2.0	0.0	7.0	5.0	4.0	2.0	2.0
5	4.7	32.6	52.0	3.8	125.6	111.0	0.0	0.0	11.0	1.0	3.0	19.0
6	89.3	238.0	208.5	183.3	205.5	234.0	112.0	521.0	446.0	0.0	13.0	457.0
6・1	255.0	802.0	162.3	366.8	224.8	152.0	706.0	1680.0	3195.0	212.0	222.0	1099.0
2	245.0	960.9	124.4	326.5	242.7	97.0	408.0	1232.0	5562.0	568.0	357.0	691.0
3	181.8	911.2	77.7	224.9	173.0	21.0	218.0	886.0	6475.0	450.0	247.0	339.0
4	192.7	416.3	59.8	134.8	79.0	25.7	127.0	239.0	2619.0	646.0	152.0	81.0
5	27.0	145.8	26.9	111.2	41.7	3.3	92.0	72.0	704.0	300.0	51.0	56.0
6	26.0	76.4	45.7	36.8	93.3	57.0	44.0	48.0	248.0	90.0	40.0	61.0
7・1	30.0	153.8	123.7	57.3	365.0	418.0	34.0	31.0	58.0	78.0	28.0	345.0
2	181.0	350.7	140.6	85.1	373.3	424.0	60.0	118.0	916.0	168.0	240.0	982.0
3	135.0	651.2	68.4	148.6	540.7	1090.0	133.0	89.0	2263.0	621.0	343.0	1215.0
4	146.7	779.3	38.0	107.7	491.7	999.5	251.0	298.0	4137.0	442.0	546.0	482.0
5	52.3	361.5	17.5	263.3	311.3	360.8	100.0	246.0	1190.0	275.0	762.0	89.0
6	53.0	169.7	19.5	71.5	157.7	138.7	41.0	30.0	699.0	188.0	264.0	88.0
8・1	45.0	123.2	28.0	148.5	171.3	213.0	25.0	28.0	215.0	66.0	203.0	134.0
2	67.3	172.2	10.0	105.0	206.0	239.0	99.0	34.0	274.0	75.0	330.0	350.0
3	75.7	193.7	6.7	71.5	353.0	116.3	85.0	41.0	652.0	84.0	311.0	216.0
4	79.0	143.1	6.7	79.0	153.0	50.7	35.0	53.0	638.0	90.0	209.0	117.0
5	38.5	214.3	2.8	105.7	143.0	37.5	27.0	28.0	1089.0	64.0	603.0	43.0
6	39.5	175.3	3.8	128.8	58.3	28.5	33.0	40.0	649.0	50.0	590.0	172.0
9・1	22.0	107.1	0.0	80.8	79.7	29.0	89.0	16.0	104.0	105.0	218.0	349.0
2	23.0	131.9	4.0	57.3	50.4	90.0	183.0	40.0	128.0	139.0	121.0	506.0
3	168.5	156.9	13.3	75.6	64.6	203.0	133.0	36.0	536.0	152.0	173.0	182.0
4	250.5	175.0	15.4	142.3	49.4	51.0	119.0	96.0	535.0	516.0	148.0	78.0
5	96.0	217.6	6.9	70.1	46.4	48.0	120.0	136.0	959.0	413.0	276.0	101.0
6	141.0	233.1	4.6	13.6	25.2	32.0	140.0	206.0	919.0	260.0	257.0	469.0
10・1	102.7	128.3	7.8	17.2	9.5	11.0	92.0	195.0	198.0	136.0	211.0	405.0
2	87.3	69.5	3.0	55.0	19.1	7.5	110.0	98.0	67.0	55.0	45.0	235.0
3	50.0	33.6	5.2	54.1	29.0	2.5	83.0	30.0	23.0	39.0	37.0	33.0
4	18.8	0.8	28.1	28.4	1.0	53.0	4.0	14.0	14.0	27.0	14.0	18.0
5	16.7	2.3	12.3	24.0	6.7	48.0	6.0	10.0	21.0	17.0	17.0	20.0
6	13.4	1.6	12.8	13.0	2.7	21.0	18.0	2.0	18.0	18.0	28.0	17.0
9月4半旬～ 10月3半旬計	727.5	857.1	42.9	352.3	178.6	152.0	664.0	761.0	2701.0	1424.0	974.0	1321.0
4～10月計	3217.3	9207.0	1468.2	4092.4	5267.2	6007.2	4292.0	8170.0	38866.0	6596.0	7338.0	9973.0

チャノホソガ誘殺数(フェロモントラップ)半旬別推定値

調査場所:綾部市(京都府立農業大学校)

誘殺数: 平年並

誘殺盛期: 平年比遅い

月・半旬	H31-R01	平年	H30	H29	H28	H27	H26	H25	H24	H23	H22	H21
4・1	16.6	61.2	-	-	-	53.9	-	-	0.0	3.3	240.7	8.3
2	31.1	174.7	296.8	-	-	395.2	-	172.9	48.7	16.4	236.4	56.5
3	54.3	412.3	358.9	660.7	1321.4	907.1	282.4	101.4	243.6	5.6	187.0	54.9
4	100.7	444.1	227.3	962.9	1113.2	627.9	774.3	57.3	640.1	3.1	0.7	34.3
5	57.4	238.2	25.0	460.0	0.4	453.9	802.9	22.9	573.9	3.6	7.6	31.4
6	22.9	114.7	5.0	238.4	0.4	336.5	184.2	2.9	325.7	32.1	6.7	15.1
5・1	0.0	50.0	8.3	73.0	3.2	331.1	27.8	1.7	26.4	21.4	2.9	4.3
2	0.0	41.1	3.7	2.1	5.0	365.5	1.4	1.1	15.7	12.3	0.0	4.3
3	0.0	43.7	1.4	1.0	3.6	417.1	0.6	0.7	6.9	4.3	0.9	0.9
4	0.0	12.8	7.1	0.7	2.3	110.0	0.0	3.3	0.0	3.1	1.1	0.0
5	0.0	61.9	31.4	0.6	233.0	347.1	0.0	3.3	0.0	3.1	0.0	0.0
6	0.0	273.7	471.3	429.7	1391.1	416.6	0.0	4.0	19.3	4.6	0.0	0.0
6・1	30.6	304.6	1113.0	529.5	434.3	486.6	164.6	3.3	238.4	5.0	71.1	0.0
2	76.4	490.0	1151.4	500.0	434.3	695.7	263.4	196.4	1063.6	91.3	114.3	389.4
3	562.1	504.2	539.6	500.0	471.9	961.4	220.0	153.4	976.7	148.6	97.1	973.6
4	272.9	574.7	386.7	859.3	622.1	1060.0	176.6	124.7	993.6	202.1	219.4	1102.5
5	80.0	515.9	386.7	1115.1	240.4	1007.4	123.4	124.7	1051.4	262.1	166.6	689.9
6	9.2	260.5	386.7	1065.3	111.3	534.3	60.0	93.3	135.7	123.4	41.4	48.5
7・1	36.7	211.5	687.0	183.6	60.7	341.1	362.1	72.3	318.1	37.9	3.6	48.5
2	85.6	346.8	709.7	278.4	633.6	545.7	191.1	72.3	439.6	32.1	84.6	480.5
3	148.6	358.8	139.3	242.4	783.1	925.0	63.6	142.1	439.6	105.9	149.4	567.1
4	150.7	378.7	495.3	152.9	729.3	1077.9	9.3	56.9	413.6	123.4	192.9	535.0
5	109.8	235.8	359.4	75.7	115.0	684.0	35.0	19.1	301.1	122.1	292.9	353.7
6	49.5	178.6	26.6	45.1	114.3	375.4	137.1	114.9	149.9	70.3	253.7	498.2
8・1	0.0	91.5	22.1	18.9	77.1	95.7	182.6	13.1	38.6	18.6	98.3	350.3
2	0.0	66.9	6.7	19.3	54.4	77.1	164.3	8.7	46.0	48.0	71.4	172.9
3	0.0	60.5	6.6	38.6	48.6	124.9	36.6	2.1	36.4	107.1	102.3	101.4
4	3.0	86.4	12.1	50.6	154.9	156.8	4.6	26.4	19.3	127.9	133.7	177.7
5	15.0	92.9	15.7	56.7	129.9	156.8	4.6	16.6	24.3	135.1	169.3	219.7
6	27.3	177.5	10.9	59.1	63.2	276.4	18.9	15.3	197.1	182.6	730.3	221.3
9・1	15.0	112.6	8.5	132.5	52.7	193.6	6.6	22.8	170.0	176.4	221.1	142.0
2	12.7	66.6	12.7	70.5	33.6	173.3	2.8	40.7	73.6	55.7	86.6	116.2
3	35.0	70.2	13.4	67.6	44.5	229.3	0.6	61.9	68.1	103.3	30.0	83.4
4	139.1	123.6	15.8	117.9	80.0	619.6	32.8	71.1	47.5	196.1	11.4	43.5
5	169.2	155.4	15.0	108.1	115.0	705.2	28.8	77.1	17.2	440.7	5.4	41.5
6	11.9	141.1	11.8	83.4	108.6	687.2	28.9	55.0	19.3	381.9	1.4	33.6
10・1	11.9	95.0	5.7	50.0	92.9	351.1	61.4	67.9	37.0	249.4	1.4	33.6
2	21.6	59.8	3.8	122.1	47.1	125.4	81.4	87.1	43.1	72.9	7.7	7.5
3	28.1	51.8	1.7	117.0	35.7	107.3	82.1	20.8	45.7	87.1	5.6	14.5
4	37.5	1.4	98.3	24.0	39.3	75.7	47.0	47.0	18.6	49.4	0.0	21.0
5	23.4	0.6	37.1	10.7	65.0	35.0	32.7	22.0	25.9	0.0	5.0	5.0
6	20.1	0.0	36.3	1.7	49.3	32.9	32.9	-	19.4	38.6	0.0	2.4
9月4半旬～ 10月3半旬計	381.8	626.7	53.8	598.5	479.3	2595.8	315.4	379.0	209.8	1428.1	32.9	174.2
4～10月計	2384.9	7817.9	7982.1	9660.4	9998.5	17689.7	4760.4	2211.2	9364.8	3938.8	4046.9	7675.4

チャノホソガ誘殺数(フェロモントラップ) 半月別推定値



調査場所:京丹後市大宮町(口大野田地)

誘殺数:例年比多い

誘殺盛期:例年並

月・半月	H31・R01	例年値	H30	H29	H28	H27	H26	H25参考値	H24参考値	H23参考値	H22参考値	H21参考値
4・1	1.4	84.9	110.0	20.0	151.0	58.6	—	1.3	0.0	0.0	1.7	0.0
2	3.6	87.2	50.0	100.0	165.0	33.7	—	0.0	0.0	0.0	2.7	0.7
3	5.0	151.7	84.9	444.6	119.0	110.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6
4	16.6	92.5	66.4	126.4	155.0	111.1	3.4	0.3	0.0	0.0	0.7	0.7
5	24.4	69.0	25.7	102.9	107.9	104.6	3.7	0.7	0.0	0.0	0.3	0.0
6	25.0	45.3	1.4	81.3	46.7	94.3	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5・1	10.1	11.6	1.9	49.1	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	5.3	6.9	1.7	29.7	2.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
3	3.6	0.3	0.0	0.0	0.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
4	0.7	0.8	1.7	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
5	0.7	4.9	3.3	1.9	10.6	8.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
6	8.6	159.9	68.0	11.1	66.9	642.6	10.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
6・1	20.0	257.0	158.9	135.0	236.2	732.7	22.1	0.0	0.7	0.0	0.0	0.1
2	166.4	462.7	253.9	1043.6	341.7	635.0	39.3	0.0	1.2	0.0	0.0	0.7
3	181.8	511.1	429.9	1227.9	342.9	522.9	31.9	0.0	1.1	0.0	2.9	1.3
4	202.4	304.6	479.3	549.0	213.1	256.7	25.1	0.0	0.0	1.9	1.6	0.9
5	179.9	137.1	98.6	380.1	122.7	66.1	17.9	0.0	0.0	1.1	0.6	0.0
6	62.1	97.4	54.4	381.4	35.7	13.6	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7・1	40.4	52.1	41.6	25.0	145.0	22.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
2	46.3	77.5	107.9	45.1	169.0	19.1	46.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1
3	497.2	119.1	104.4	55.7	162.0	57.1	216.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
4	610.6	127.2	77.6	43.3	70.0	283.4	161.5	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1
5	617.9	85.1	38.6	40.7	45.3	218.6	82.3	0.0	0.0	1.7	0.3	0.0
6	545.1	41.4	6.9	28.1	49.0	102.6	20.6	0.8	1.4	1.3	0.3	0.0
8・1	135.4	30.8	4.0	17.0	80.7	20.0	32.1	0.2	0.6	0.0	0.7	0.0
2	61.1	107.9	2.4	25.0	447.9	12.6	51.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
3	60.3	97.0	0.6	17.9	394.1	12.1	60.4	0.0	0.0	0.6	0.8	0.0
4	22.6	63.5	0.1	26.9	231.3	14.3	45.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
5	12.9	25.0	0.0	33.6	40.7	12.9	37.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	29.7	20.2	0.1	43.7	14.6	23.1	19.5	0.0	0.1	0.0	0.0	1.1
9・1	31.9	21.8	0.7	55.7	17.3	24.5	11.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.9
2	28.1	18.8	1.3	32.6	24.1	18.2	17.9	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
3	44.7	31.5	0.9	23.3	32.6	22.7	77.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
4	72.1	40.4	0.0	47.9	32.9	32.5	88.6	0.0	0.0	0.7	0.0	0.3
5	194.3	64.3	2.9	97.6	92.9	38.4	89.9	0.0	0.0	0.7	0.0	0.3
6	218.7	55.7	4.6	78.3	83.0	46.4	66.4	0.0	0.4	0.6	0.0	1.4
10・1	180.4	26.2	4.6	30.7	38.7	18.4	38.4	0.0	0.6	0.0	0.0	4.3
2	98.6	20.9	0.0	55.7	5.0	19.5	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
3	68.6	16.5	5.1	36.0	1.0	26.9	13.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3
4		7.9	5.6	20.9	1.7	7.9	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
5		6.2	4.3	12.9	4.3	7.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6		2.9	1.7	6.9	0.0	4.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9月4半月～ 10月3半月計	832.7	224.0	17.2	346.2	253.5	182.1	321.2	0.0	1.0	2.0	0.0	7.6
4～10月計	4534.5	3644.7	2305.9	5584.5	4310.0	4457.0	1394.2	3.3	6.9	9.9	18.2	21.9

注:例年値は過去5年間の平均値。平成26年からフェロモントラップの設置場所を変更(丹後農研→口大野田地、色ぬり部分は参考値)



チャノコカクモンハマキ誘殺数(フェロモントラップ)

調査場所:宇治市(茶業研究所)

誘殺数: 平年比やや少ない

誘殺盛期: 平年比早い

月・半旬	H31-R01	平年	H30	H29	H28	H27	H26	H25	H24	H23	H22	H21
4・1	0.0	2.2	1.0	0.0	17.0	0	0	3	0	0	0	1
2	0.0	7.5	3.0	3.0	44.3	1	0	10	0	0	0	14
3	1.0	46.6	14.6	4.0	97.8	2	0	18	1	6	0	323
4	19.7	92.7	68.4	32.0	245.0	3	3	124	1	22	5	424
5	98.3	146.0	287.5	92.0	512.0	20	1	158	2	21	13	354
6	67.0	212.9	433.8	177.0	301.0	150	38	460	20	338	60	151
5・1	173.0	425.3	660.9	366.0	412.5	327	118	720	65	750	250	584
2	215.3	499.6	742.2	642.7	384.5	279	306	1143	95	771	305	328
3	370.8	463.7	740.6	519.9	112.5	185	532	1410	98	647	34	358
4	199.5	265.2	241.0	237.4	39.7	105	44	1370	87	315	73	140
5	37.5	115.7	68.0	90.0	8.8	37	51	521	186	113	52	30
6	22.0	32.7	18.8	9.0	0.0	8	32	112	100	17	16	14
6・1	2.0	5.0	2.1	0.0	3.3	0	0	14	15	8	6	1
2	0.0	2.7	0.2	1.0	3.7	3	0	1	2	6	6	4
3	0.0	20.9	52.0	20.3	40.0	22	8	24	2	3	2	36
4	28.7	43.4	73.0	42.8	33.0	50	5	127	18	19	9	57
5	19.5	62.6	71.4	100.2	47.2	42	21	81	55	115	11	82
6	27.2	71.8	169.3	104.8	10.8	63	41	58	40	94	100	37
7・1	50.3	115.6	197.1	92.0	12.0	93	48	498	27	18	141	30
2	31.0	62.8	68.1	27.4	7.0	19	71	300	71	10	28	26
3	38.4	31.0	15.2	5.9	4.0	10	46	124	38	23	32	12
4	17.9	8.0	2.0	0.8	5.0	4	11	30	14	0	7	6
5	14.7	6.3	1.5	0.0	10.0	7	5	17	3	8	10	1
6	15.0	35.3	6.9	21.3	13.3	66	0	144	8	17	67	9
8・1	16.0	56.3	3.2	31.4	5.7	65	16	232	29	12	155	14
2	12.7	36.9	10.4	33.3	2.0	45	26	130	14	11	75	22
3	9.3	32.4	1.3	24.0	0.0	13	50	103	16	5	90	22
4	7.0	13.2	8.7	5.2	0.0	1	23	27	12	0	53	2
5	2.5	5.3	3.0	2.8	1.0	2	14	5	8	4	11	3
6	6.2	3.8	3.0	1.0	3.0	12	2	1	5	0	9	2
9・1	3.3	9.8	4.0	1.0	9.0	37	4	5	2	7	21	8
2	7.0	12.7	9.0	9.8	14.2	34	2	13	2	6	32	5
3	12.5	42.1	9.5	54.3	14.8	26	6	28	23	27	211	21
4	19.5	54.6	10.8	73.3	42.6	110	7	37	22	20	178	45
5	11.0	69.9	4.9	64.5	28.0	151	9	47	36	12	283	64
6	19.0	101.4	21.6	37.2	6.4	226	15	96	15	20	490	87
10・1	24.3	101.4	13.2	10.2	3.0	137	89	118	13	10	510	111
2	7.7	116.3	31.0	61.8	6.7	72	43	111	100	0	683	54
3	56.0	56.2	23.2	46.3	7.3	63	25	48	17	10	296	26
4		29.2	7.5	17.3	10.0	20	9	11	20	7	168	22
5		21.2	5.3	5.1	5.3	3	21	13	18	2	124	15
6		12.8	4.3	1.3	0.8	11	4	6	31	13	42	14
9月4半旬～ 10月3半旬計	137.5	499.8	104.7	293.3	94.0	759.0	188.0	457.0	203.0	72.0	2440.0	387.0
4～10月計	1662.8	3550.8	4112.5	3069.3	2524.2	2523.4	1746.0	8498.0	1331.0	3487.0	4658.0	3559.0

チャノコカクモンハマキ誘殺数(フェロモントラップ)半旬別推定値

調査場所:綾部市(京都府立農業大学校)

誘殺数: 平年比やや少ない

誘殺盛期: 平年並

月・半旬	H31-R01	平年	H30	H29	H28	H27	H26	H25	H24	H23	H22	H21
4・1	0.6	0.1	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.7	0.0
2	0.4	0.7	2.9	-	-	0.3	-	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0
3	0.0	12.5	14.4	6.0	78.4	0.7	0.6	12.9	0.0	0.0	10.6	0.9
4	27.9	29.4	86.3	15.0	88.3	30.0	2.9	23.6	0.0	1.4	44.3	2.1
5	69.4	48.7	203.6	22.1	38.5	73.3	47.0	40.3	19.7	3.6	24.3	15.0
6	100.2	73.8	241.4	12.7	38.5	84.0	80.5	78.6	49.3	89.3	39.3	24.0
5・1	112.5	106.0	389.6	34.7	64.1	11.7	86.1	116.3	87.1	158.7	69.3	42.7
2	105.5	163.7	236.0	147.9	81.3	7.3	385.0	125.1	194.3	256.1	108.6	93.6
3	74.8	181.9	157.3	213.0	55.0	0.7	423.5	124.3	242.7	460.7	85.4	56.4
4	35.7	110.2	37.9	143.6	26.7	1.0	301.0	4.3	150.7	346.4	56.0	34.6
5	5.7	39.1	11.6	15.0	6.6	7.5	78.8	4.3	54.7	197.0	0.0	15.7
6	3.4	9.1	4.0	6.0	1.7	9.0	26.5	5.1	21.0	16.6	1.4	0.0
6・1	0.9	4.7	1.9	0.3	15.0	10.5	6.0	4.3	3.6	4.3	0.6	0.0
2	0.0	5.8	9.3	1.4	15.0	15.0	14.1	1.4	0.7	1.4	0.0	0.0
3	17.1	46.9	52.7	1.4	14.7	267.9	59.3	62.2	6.4	4.1	0.0	0.0
4	50.0	50.4	63.6	24.3	13.6	109.3	19.9	102.7	94.1	9.3	16.6	50.6
5	71.9	97.5	63.6	84.7	3.9	123.1	8.6	102.7	223.6	240.0	47.3	77.1
6	123.3	150.5	63.6	108.7	0.9	601.4	6.4	88.8	217.9	213.4	87.1	116.9
7・1	115.5	112.4	52.9	43.6	0.0	312.3	141.4	79.6	131.5	168.3	77.1	116.9
2	81.9	57.0	36.6	15.6	2.1	154.6	71.1	79.6	73.9	58.6	52.3	25.7
3	34.3	20.0	0.7	5.4	4.7	26.4	20.4	22.1	73.9	14.6	29.9	2.2
4	5.7	6.8	7.0	0.7	7.4	6.4	5.0	8.9	22.2	2.7	6.4	1.3
5	22.8	8.1	13.4	7.1	11.4	15.4	1.6	5.7	9.9	1.4	7.6	7.6
6	47.5	36.4	24.9	37.1	60.4	44.9	23.6	34.3	12.3	12.9	53.6	60.2
8・1	45.0	39.7	20.7	42.9	53.5	69.3	31.9	3.1	7.9	18.7	93.3	55.3
2	21.3	36.3	43.6	42.9	39.0	32.9	5.0	8.2	2.7	15.6	140.7	32.1
3	18.8	36.3	33.6	31.4	8.6	16.6	67.3	15.7	1.7	7.9	137.9	42.1
4	12.9	26.4	10.0	16.4	8.6	5.7	82.9	22.1	2.1	5.0	91.1	20.3
5	4.4	17.9	7.9	6.9	10.2	5.7	82.9	10.6	15.7	9.7	22.1	7.1
6	5.1	44.9	8.3	10.3	15.2	16.1	324.9	3.3	37.1	12.3	6.0	15.0
9・1	27.4	60.6	31.9	11.7	12.7	48.9	251.9	19.3	50.3	5.0	46.7	127.1
2	49.8	93.3	70.0	54.8	56.6	83.3	185.0	86.4	67.9	47.9	152.3	128.8
3	77.5	127.3	57.3	121.1	92.6	130.7	91.9	240.7	118.1	50.4	295.0	75.0
4	119.3	149.1	36.8	342.9	102.9	138.7	141.0	177.3	122.5	55.7	352.1	21.5
5	119.8	128.3	82.5	300.6	86.4	129.1	257.2	24.3	113.0	70.0	199.6	19.9
6	10.4	110.5	59.7	252.9	60.7	111.7	377.7	14.4	48.6	72.3	93.3	13.6
10・1	10.4	127.3	21.8	197.1	45.3	110.7	582.9	18.1	121.7	86.6	75.0	13.6
2	22.5	95.1	12.0	114.3	52.1	109.6	351.4	23.6	124.6	107.1	41.3	15.0
3	30.6	72.2	5.0	110.0	37.9	94.3	209.9	60.0	101.4	51.4	26.9	25.3
4		35.0	3.6	88.0	24.0	34.3	84.3	29.1	7.9	25.7	17.9	34.8
5		14.0	2.7	11.4	8.6	41.1	7.9	13.7	15.6	8.6	19.3	10.7
6		9.6	1.7	4.5	0.0	29.6	5.4	-	17.1	10.3	13.4	4.3
9月4半旬～ 10月3半旬計	313.0	682.5	217.8	1317.8	385.3	694.1	1920.1	317.7	631.8	443.1	788.2	108.9
4～10月計	1682.2	2595.2	2286.3	2706.4	1343.1	3121.0	4950.7	1897.0	2665.4	2921.0	2643.9	1405.0

チャノコカクモンハマキ誘殺数(フェロモントラップ)半旬別推定値

調査場所:京丹後市大宮町(口大野団地)

誘殺数:例年比やや多い

誘殺盛期:例年比早い

月・半旬	H31・R01	例年値	H30	H29	H28	H27	H26	H25参考値	H24参考値	H23参考値	H22参考値	H21参考値
4・1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	—	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0
2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.7	0.0	—	0.0	0.6	1.0	1.0	0.4
3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	1.1	1.3	1.4	1.4	2.1
4	0.9	0.4	0.0	0.0	1.4	0.6	0.0	1.4	—	2.9	2.9	1.0
5	1.1	0.9	0.0	0.0	1.4	1.9	1.1	1.4	—	1.1	1.1	2.4
6	0.0	1.4	0.0	0.0	0.6	3.6	2.9	6.4	—	18.0	18.0	5.0
5・1	4.6	1.5	0.4	1.3	1.5	2.9	1.4	9.4	7.8	30.7	30.7	21.4
2	6.0	1.3	0.7	2.4	0.5	1.6	1.4	13.1	11.4	20.8	20.8	25.3
3	6.4	1.1	0.7	3.1	0.0	0.7	1.1	20.0	14.3	22.2	22.2	25.1
4	0.0	0.6	0.1	2.1	0.1	0.7	0.0	10.3	9.7	34.3	34.3	14.3
5	0.0	0.4	0.3	1.1	0.6	0.1	0.0	6.4	6.3	7.1	7.1	2.9
6	0.0	0.3	0.7	0.0	0.3	0.0	0.4	4.9	2.6	5.1	5.1	1.7
6・1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.9	0.3	2.3	2.3	2.6
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	1.4	1.4	1.4
3	0.0	0.5	0.6	0.0	0.0	0.7	1.1	1.7	0.1	1.4	1.4	0.9
4	3.0	1.6	1.4	0.6	0.6	2.0	3.4	4.3	0.7	6.1	6.1	2.4
5	4.9	2.5	0.0	1.0	2.1	3.0	6.4	14.3	6.4	18.3	18.3	5.0
6	4.3	3.0	0.0	1.4	4.3	3.6	5.7	12.6	12.4	54.3	54.3	7.1
7・1	1.4	3.0	0.0	2.9	4.3	2.7	4.9	14.4	19.3	65.7	65.7	8.9
2	0.4	1.9	0.0	2.4	1.7	1.4	3.9	26.4	14.3	52.9	52.9	11.9
3	0.0	0.9	0.0	1.9	0.0	0.6	1.8	32.5	12.1	29.3	29.3	19.3
4	0.0	0.3	0.0	0.9	0.0	0.0	0.7	18.9	9.1	7.9	7.9	7.3
5	0.0	0.3	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	10.7	2.9	7.4	7.4	4.0
6	6.0	0.5	0.0	0.9	0.0	1.6	0.0	26.3	27.7	19.0	19.0	6.4
8・1	3.3	0.8	0.0	0.3	0.0	0.7	2.9	24.3	34.9	36.7	36.7	14.3
2	1.7	1.2	0.0	3.0	0.7	0.1	2.0	23.1	35.7	43.0	43.0	13.1
3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.3	0.0	2.0	21.4	18.6	12.7	12.7	14.9
4	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	17.1	14.0	9.0	9.0	17.9
5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	17.1	10.0	8.6	8.6	5.7
6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	18.3	7.7	7.4	7.4	9.1
9・1	0.8	0.7	0.0	0.7	1.1	0.0	1.9	11.4	10.0	4.4	4.4	8.3
2	13.4	1.0	0.0	0.3	0.9	0.0	3.6	23.6	13.4	4.9	4.9	7.9
3	18.7	1.6	0.0	0.0	0.3	0.0	7.9	54.4	25.7	10.0	10.0	10.7
4	22.1	1.3	0.0	0.0	1.4	0.0	4.9	82.6	42.9	38.0	38.0	33.4
5	5.0	1.7	0.0	2.3	2.6	0.1	3.6	112.9	45.7	45.6	45.6	45.3
6	4.0	2.5	0.0	3.1	2.4	0.7	6.4	84.9	48.7	42.0	42.0	32.1
10・1	2.9	3.3	0.0	3.6	2.0	0.7	10.4	55.9	44.9	36.4	36.4	60.8
2	2.1	3.9	0.0	6.4	2.8	0.8	9.4	22.9	21.4	37.9	37.9	37.0
3	2.1	2.3	0.0	3.0	1.5	0.7	6.4	10.7	18.6	31.0	31.0	25.3
4		0.3	0.0	0.6	0.3	0.0	0.7	33.9	15.0	27.3	27.3	19.3
5		0.4	0.0	0.0	0.7	0.0	1.1	40.0	10.7	30.8	30.8	4.3
6		0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.4	21.4	17.1	17.1	5.1
9月4半旬～ 10月3半旬計	38.2	15.0	0.0	18.4	12.7	3.0	41.1	369.9	222.2	230.9	230.9	233.9
4～10月計	115.1	45.6	4.9	46.0	37.9	32.1	106.9	897.9	598.6	854.0	854.0	543.3

注:例年値は過去5年間の平均値。平成26年からフェロモントラップの設置場所を変更(丹後農研→口大野団地、色ぬり部分は参考値)

