

## チヤ

### 病害虫発生状況

#### 1 病害の平年比較

	炭疽病	輪斑病	灰色かび病	新梢枯死症	もち病	網もち病
山城	少 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)
丹波	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)
丹後	やや多 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)

#### 2 害虫（No. 1）の平年比較

カンザワハダニ	調査	チャノホソガ		チャノコカクモンハマキ		
		フェロモントラップ		調査	フェロモントラップ	
		誘殺数	誘殺時期		誘殺数	誘殺時期
山城	少	並	少	やや早	やや多	やや少
丹波	並	並	少	遅	並	やや少
丹後	やや多	並	並	並	やや多	並

#### 3 害虫（No. 2）の平年（例年）比較

	チャノキイロ アザミウマ	チャノミドリヒメ ヨコバイ	コミカン ア布拉ムシ	ツマグロ アオカスミカメ	クワシロ カイガラムシ	チャトゲ コナジラミ
山城	並	やや多	やや多	並	並	(やや少)
丹波	やや少	並	並 (発生を認めず)	多	並	(やや少)
丹後	やや少	多	やや多	並	少 (発生を認めず)	(並)

#### 4 その他

病害虫名	調査項目	程度				
		無	少	中	多	甚
炭疽病	病葉数／m <sup>2</sup>	0	≤50	≤200	≤500	500 <
輪斑病	病葉数／m <sup>2</sup>	0	≤50	≤200	≤500	500 <
もち病	病葉数／m <sup>2</sup>	0	≤50	≤300	≤1000	1000 <
網もち病	病葉数／m <sup>2</sup>	0	≤50	≤300	≤1000	1000 <
カンザワハダニ	寄生葉率(%)	0	≤10	≤30	≤70	70 <
チャノホソガ	巻葉数／m <sup>2</sup>	0	≤30	≤100	≤250	250 <
チャノコカクモンハマキ	幼虫数／m <sup>2</sup>	0	≤5	≤15	≤35	35 <
チャノミドリヒメヨコバイ	被害芽率(%)	0	≤5	≤15	≤30	30 <
ツマグロアオカスミカメ	被害芽数／m <sup>2</sup>	0	≤25	≤80	≤160	160 <
クワシロカイガラムシ	寄生株率(%)	0	≤20	≤25	≤70	70 <

## チャ病害虫発生状況平年比較（病害）

炭疽病 7月

地域	平年比	項目＼年次	平年比	R06	平年	R05	R04	R03	R02	R01	H30	H29	H28	H27	H26
山城	少	病葉数	少	0.0	0.8	0.8	0.3	2.6	2.4	0.2	0.6	0.1	0.3	0.3	0.4
		発生ほ場率(%)	少	0.0	23.9	21.4	16.7	58.3	57.1	14.3	28.6	5.3	17.6	10.0	10.0
丹波	並	病葉数	やや多	15.5	6.8	2.3	0.7	1.0	9.8	6.0	10.2	30.2	4.0	2.0	1.5
		発生ほ場率(%)	並	66.7	59.3	25.0	50.0	20.0	100.0	75.0	60.0	80.0	66.7	50.0	66.7
丹後	やや多	病葉数	多	4.8	1.3	0.7	1.0	0.8	0.5	5.7	1.7	0.3	1.0	0.8	0.3
		発生ほ場率(%)	やや多	50.0	36.7	33.3	50.0	25.0	25.0	66.7	33.3	33.3	50.0	25.0	25.0

輪斑病 7月

地域	平年比	項目＼年次	平年比	R06	平年	R05	R04	R03	R02	R01	H30	H29	H28	H27	H26
山城	並	病葉数	並	0.0	0.3	0.4	0.0	0.2	0.0	2.4	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
		発生ほ場率(%)	並	0.0	4.6	7.1	0.0	8.3	0.0	14.3	0.0	5.3	5.9	0.0	5.0
丹波	並	病葉数	並	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
		発生ほ場率(%)	並	0.0	8.3	25.0	0.0	0.0	16.7	25.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0
丹後	並	病葉数	並	0.0	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
		発生ほ場率(%)	並	0.0	5.8	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0

灰色かび病 7月

新梢枯死症 7月

もち病 7月

網もち病 7月

## チヤ病害虫発生状況平年比較（害虫N○1）

### カンザワハダニ

7月

地域	平年比	項目＼年次	平年比	R06	平年	R05	R04	R03	R02	R01	H30	H29	H28	H27	H26
山城	少	寄生葉率(%)	少	0.3	2.2	1.7	2.5	1.6	3.0	1.9	0.7	2.5	0.1	2.3	5.5
		成虫数	少	0.1	3.2	2.0	2.5	2.5	8.1	1.6	0.6	5.0	0.1	3.5	6.2
		幼虫数	並	0.4	1.1	0.8	2.0	0.2	0.0	0.8	0.2	0.7	0.0	2.3	4.4
		合計	やや少	0.5	4.3	2.8	4.5	2.7	8.1	2.4	0.8	5.7	0.1	5.8	10.5
		発生ほ場率(%)	少	13.6	35.7	22.2	30.0	20.0	72.7	57.1	23.8	45.0	10.0	35.0	40.9
丹波	並	寄生葉率(%)	並	0.7	1.2	0.3	0.0	0.0	2.3	0.3	2.0	5.3	0.7	0.7	0.3
		成虫数	並	1.0	2.0	0.7	0.0	0.0	2.3	0.7	5.2	8.3	0.7	1.3	0.3
		幼虫数	並	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	3.3	2.5	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		合計	並	1.0	2.8	0.7	0.0	0.0	5.7	3.2	5.2	11.0	0.7	1.3	0.3
		発生ほ場率(%)	やや少	16.7	27.3	33.3	0.0	0.0	66.7	16.7	40.0	66.7	16.7	16.7	16.7
丹後	やや多	寄生葉率(%)	やや多	2.5	1.3	0.0	3.5	0.5	5.0	0.5	0.7	0.5	0.7	0.0	1.5
		成虫数	やや多	3.0	1.6	0.0	3.0	2.0	5.0	1.5	0.7	0.5	0.7	0.0	2.5
		幼虫数	やや多	15.0	3.9	0.0	1.0	1.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	33.5
		合計	やや多	18.0	5.4	0.0	4.0	3.5	5.0	4.0	0.7	0.5	0.7	0.0	36.0
		発生ほ場率(%)	並	25.0	31.7	0.0	50.0	25.0	25.0	50.0	33.3	25.0	33.3	0.0	75.0

### チヤノホソガ

7月

地域	平年比	項目＼年次	平年比	R06	平年	R05	R04	R03	R02	R01	H30	H29	H28	H27	H26
山城	並	寄生芽率(%)	並	1.3	1.5	0.0	2.3	0.0	0.0	1.5	3.5	0.3	0.0	5.5	1.7
		卵数	並	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.8	0.0	0.0	4.0	0.1
		潜行数	やや多	1.1	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.2	2.3	0.1	0.0	2.5	1.0
		葉緑数	並	0.4	0.5	0.0	1.8	0.0	0.0	0.4	0.2	0.1	0.0	1.5	0.6
		合計	並	1.5	2.0	0.0	2.5	0.0	0.0	4.0	3.3	0.3	0.0	8.0	1.7
		巻葉数	並	0.0	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	3.0	0.1
丹波	並	寄生芽率(%)	やや少	0.3	3.7	10.7	0.0	3.2	7.0	0.0	0.7	0.0	9.2	4.5	1.5
		卵数	並	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.7	0.0	8.4	3.5	0.0
		潜行数	並	0.0	2.1	8.0	0.0	1.2	5.0	0.0	0.0	0.0	3.6	1.5	1.5
		葉緑数	並	0.3	1.3	4.7	0.0	4.4	2.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.5	0.0
		合計	並	0.3	4.8	12.7	0.0	5.6	8.5	0.0	0.4	0.0	13.6	5.5	1.5
		巻葉数	並	0.0	0.3	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.7	0.0	0.2
丹後	並	寄生芽率(%)	並	16.7	29.4	100.0	0.0	25.0	18.8	0.0	66.7	0.0	16.7	33.3	33.3
		寄生芽率(%)	やや少	1.0	10.0	14.7	0.5	4.0	2.5	0.0	2.7	18.7	40.0	9.0	7.5
		卵数	並	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	2.7	26.0	8.0	1.0
		潜行数	やや少	1.0	4.7	2.7	0.5	2.0	1.5	0.0	0.0	6.7	22.0	4.0	7.5
		葉緑数	やや少	0.0	3.5	12.0	0.5	2.0	1.5	0.0	0.0	16.0	2.0	0.0	1.0
		合計	やや少	1.0	12.0	14.7	1.0	4.0	3.0	0.0	7.0	25.3	50.0	6.0	9.5
丹後	並	寄生芽率(%)	並	50.0	62.5	66.7	25.0	100.0	50.0	0.0	66.7	66.7	50.0	100.0	100.0

### チヤノコカクモンハマキ

7月

地域	平年比	項目＼年次	平年比	R06	平年	R05	R04	R03	R02	R01	H30	H29	H28	H27	H26
山城	やや多	綴葉数	やや多	1.5	0.5	3.9	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.5	0.0	0.0
		幼虫数	やや多	0.6	0.2	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0	0.1
		蛹数	並	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		合計	やや多	0.6	0.2	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0	0.1
		発生ほ場率(%)	多	62.5	12.5	42.9	16.7	16.7	9.5	4.8	6.3	5.3	17.6	0.0	5.0
丹波	並	綴葉数	並	1.0	3.8	0.7	7.0	2.2	1.2	8.8	0.6	0.2	7.3	5.3	5.0
		幼虫数	並	0.8	1.5	0.3	0.8	0.2	3.7	1.8	0.6	0.2	3.8	1.7	2.0
		蛹数	並	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
		合計	並	0.8	1.7	0.3	0.8	0.2	4.8	1.8	1.2	0.2	3.8	1.7	2.0
		発生ほ場率(%)	並	33.3	40.8	66.7	20.0	8.3	14.3	75.0	20.0	20.0	50.0	50.0	83.3
丹後	やや多	綴葉数	やや多	0.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5
		幼虫数	並	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	2.5
		蛹数	並	0.0	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
		合計	並	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	2.5
		発生ほ場率(%)	やや多	25.0	8.3	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	25.0

## チャ病害虫発生状況平年比較(害虫No2)

### チャノキイロアザミウマ

7月

地域	平年比	項目 \ 年次	平年比	R06	平年	R05	R04	R03	R02	R01	H30	H29	H28	H27	H26
山城	並	寄生・被害芽率(%)	やや少	15.1	26.6	20.3	27.2	13.2	9.5	26.5	14.6	37.7	54.4	24.7	38.3
		虫数	やや少	17.4	51.1	25.3	15.1	5.5	42.1	38.9	129.9	40.4	98.7	32.3	82.4
		発生ほ場率(%)	並	93.8	93.6	100.0	91.7	100.0	68.8	100.0	93.8	100.0	90.9	90.9	100.0
丹波	やや少	寄生・被害芽率(%)	やや少	1.3	6.5	1.3	1.2	2.0	0.5	1.5	7.3	17.0	2.8	10.0	21.0
		虫数	少	0.3	2.8	0.7	5.2	1.4	1.5	1.0	4.0	8.0	0.8	3.5	1.5
		発生ほ場率(%)	並	50.0	56.5	33.3	60.0	40.0	25.0	25.0	66.7	100.0	40.0	75.0	100.0
丹後	やや少	寄生・被害芽率(%)	並	16.0	17.3	8.7	27.0	0.0	10.0	34.0	16.0	54.7	10.0	10.5	2.0
		虫数	少	0.0	24.9	0.7	198.0	0.0	1.0	9.0	8.7	8.0	10.0	13.5	0.5
		発生ほ場率(%)	並	75.0	80.0	100.0	100.0	0.0	75.0	100.0	100.0	100.0	100.0	75.0	50.0

### チャノミドリヒメヨコバイ

7月

地域	平年比	項目 \ 年次	平年比	R06	平年	R05	R04	R03	R02	R01	H30	H29	H28	H27	H26
山城	やや多	寄生・被害芽率(%)	やや多	10.8	6.6	5.0	0.2	1.3	2.8	11.6	4.2	4.4	12.2	8.2	15.7
		虫数	並	5.9	8.5	6.6	0.3	1.5	14.6	24.2	1.3	1.0	15.6	6.0	13.7
		発生ほ場率(%)	やや多	81.3	55.7	85.7	25.0	41.7	37.5	90.9	18.8	57.1	63.6	58.3	78.6
丹波	並	寄生・被害芽率(%)	並	3.3	6.4	0.0	0.8	3.2	0.0	7.5	0.0	5.0	0.0	8.0	39.0
		虫数	やや少	0.7	17.1	0.0	42.4	3.6	9.5	7.5	0.0	3.0	0.0	12.0	93.0
		発生ほ場率(%)	並	66.7	49.0	0.0	80.0	60.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	50.0	100.0
丹後	多	寄生・被害芽率(%)	多	36.0	5.7	4.7	0.0	6.0	2.5	13.5	10.0	20.0	0.0	0.0	0.0
		虫数	やや多	25.0	9.5	4.0	15.0	8.0	14.5	27.0	0.0	26.7	0.0	0.0	0.0
		発生ほ場率(%)	並	100.0	58.3	100.0	100.0	100.0	50.0	100.0	33.3	100.0	0.0	0.0	0.0

### コミカンアプラムシ

7月

地域	平年比	項目 \ 年次	平年比	R06	平年	R05	R04	R03	R02	R01	H30	H29	H28	H27	H26	
山城	やや多	寄生芽率(%)	やや多	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	
		虫数	やや多	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	1.9	0.2	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	
		発生ほ場率(%)	並	12.5	8.4	0.0	0.0	16.7	25.0	9.1	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	
丹波	並	寄生芽率(%)	並	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.3	0.0	0.4	0.0	0.0	
		虫数	並	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	4.0	0.0	3.2	0.0	0.0	
		発生ほ場率(%)	並	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	33.3	0.0	20.0	0.0	0.0	
丹後	やや多	寄生芽率(%)	やや多	1.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.5	1.0
		虫数	やや多	4.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.5	7.5	
		発生ほ場率(%)	やや多	50.0	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	25.0	50.0	

### ツマグロアオカスミカメ

7月

地域	平年比	項目 \ 年次	平年比	R06	平年	R05	R04	R03	R02	R01	H30	H29	H28	H27	H26
山城	並	被害芽率(%)	並	0.4	2.3	0.4	0.3	4.8	2.4	13.3	0.0	0.3	0.0	1.6	0.0
		被害葉数	並	1.8	3.8	0.7	0.8	9.3	7.1	5.5	0.0	2.6	2.5	2.2	7.3
		発生ほ場率(%)	並	43.8	38.6	28.6	25.0	50.0	31.3	72.7	0.0	26.3	27.3	65.0	60.0
丹波	多	被害芽率(%)	並	7.0	6.7	14.0	11.6	2.4	2.5	8.0	10.0	8.0	0.8	2.0	7.5
		被害葉数	多	16.2	4.2	1.8	2.0	8.6	4.8	11.8	5.3	2.0	0.0	1.0	4.3
		発生ほ場率(%)	多	100.0	50.8	33.3	40.0	40.0	50.0	100.0	75.0	50.0	20.0	50.0	50.0
丹後	並	被害芽率(%)	並	5.0	12.9	8.0	0.0	0.0	6.0	52.0	2.7	10.7	6.0	11.5	32.0
		被害葉数	並	8.8	13.8	1.0	2.0	0.0	18.5	30.3	7.0	11.0	0.0	10.5	57.3
		発生ほ場率(%)	並	100.0	66.7	66.7	50.0	0.0	100.0	100.0	33.3	66.7	50.0	100.0	100.0

### クワシロカイガラムシ

7月

地域	平年比	項目 \ 年次	平年比	R06	平年	R05	R04	R03	R02	R01	H30	H29	H28	H27	H26
山城	並	寄生株率(%)	並	4.8	9.0	1.1	3.8	2.5	1.4	18.1	3.3	16.3	10.3	13.6	19.3
		発生ほ場率(%)	並	31.8	41.2	16.7	40.0	25.0	13.6	66.7	33.3	42.1	55.6	52.4	66.7
		寄生株率(%)	やや少	1.7	7.9	0.0	15.0	0.8	24.2	2.7	0.0	10.8	7.5	15.0	3.3
丹波	並	発生ほ場率(%)	並	33.3	43.3	0.0	50.0	16.7	100.0	66.7	0.0	50.0	66.7	50.0	33.3
		寄生株率(%)	少	0.0	20.7	15.0	10.0	26.3	2.5	27.5	21.7	48.3	21.7	0.0	33.8
		発生ほ場率(%)	少	0.0	60.0	50.0	50.0	75.0	50.0	50.0	100.0	50.0	0.0	75.0	

## チャトゲコナジラミ

7月

地域	例年比	項目 \ 年次	例年比	R06	平年	R05	R04	R03	R02	R01	H30	H29	H28	H27	H26
山城	(やや少)	寄生葉率(%)	(少)	8.3	34.2	22.3	14.5	15.6	42.6	30.4	38.1	36.3	49.7	44.6	47.7
		発生量指數	(少)	4.3	20.5	12.6	7.7	9.6	27.5	16.7	23.7	24.7	34.3	30.3	17.9
		発生ほ場率(%)	(やや少)	68.2	76.6	72.2	75.0	70.0	100.0	14.3	85.7	100.0	95.2	85.7	68.2
丹波	(やや少)	寄生葉率(%)	(やや少)	11.3	29.0	11.0	1.0	7.3	21.3	32.0	32.0	30.3	39.3	63.7	52.5
		発生量指數	(やや少)	5.8	18.6	5.7	0.5	3.7	11.7	19.0	24.3	15.8	27.3	45.3	32.8
		発生ほ場率(%)	(やや少)	66.7	76.7	83.3	33.3	66.7	100.0	100.0	66.7	66.7	83.3	100.0	66.7
丹後	(並)	寄生葉率(%)	(やや少)	15.0	42.4	35.5	7.5	11.0	48.5	59.0	58.0	16.5	39.0	55.0	93.8
		発生量指數	(やや少)	9.3	28.4	21.0	3.8	6.5	30.0	37.3	38.8	8.3	25.0	33.8	80.0
		発生ほ場率(%)	(並)	100.0	90.0	100.0	25.0	100.0	100.0	100.0	100.0	75.0	100.0	100.0	100.0

※ H26年以前は参考値

※( )内の評価は例年比

## 令和6年 チヤの病害発生状況(m<sup>2</sup>当たり)

山城地域	炭疽病 (病葉数)	輪斑病 (病葉数)	灰色かび病 (病葉数・枝数)	新梢枯死症 (枯死枝数)	もち病 (病葉数)	網もち病 (病葉数)	備考
調査日 7/16							
宇治市1	0	0	0	0	0	0	
宇治市2	0	0	0	0	0	0	
宇治市3	0	0	0	0	0	0	
宇治市4	0	0	0	0	0	0	
宇治市5	0	0	0	0	0	0	
宇治市6	0	0	0	0	0	0	
城陽市1	0	0	0	0	0	0	
城陽市2	0	0	0	0	0	0	
宇治田原町1	0	0	0	0	0	0	
宇治田原町2	-	-	-	-	-	-	摘採後新芽無し
宇治田原町3	0	0	0	0	0	0	
宇治田原町4	0	0	0	0	0	0	
京田辺市1	0	0	0	0	0	0	
京田辺市2	0	0	0	0	0	0	ツル多い 焼け多い
木津川市1	0	0	0	0	0	0	
木津川市2	-	-	-	-	-	-	刈取後新芽無し
和束町1	-	-	-	-	-	-	刈取後新芽無し
和束町2	-	-	-	-	-	-	摘採後新芽無し
和束町3	0	0	0	0	0	0	
和束町4	-	-	-	-	-	-	刈り落とし後新芽無し
和束町5	-	-	-	-	-	-	摘採後新芽無し
和束町6	0	0	0	0	0	0	
平均値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
前年値	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
平年値	0.8	0.3	0.0	0.01	1.8	0.0	
発生率	本年値 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
発生率	前年値 (%)	21.4	7.1	0.0	0.0	0.0	
発生率	平年値 (%)	23.9	4.6	0.0	0.5	5.2	0.0

丹波地域	炭疽病 (病葉数)	輪斑病 (病葉数)	灰色かび病 (病葉数・枝数)	新梢枯死症 (枯死枝数)	もち病 (病葉数)	網もち病 (病葉数)	備考
調査日 7/16,17							
福知山市1	0	0	0	0	0	0	
福知山市2	0	0	0	0	0	0	
綾部市1	3	0	0	0	0	0	
綾部市2	82	0	0	0	0	0	
舞鶴市1	6	0	0	0	0	0	
舞鶴市2	2	0	0	0	0	0	
平均値	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
前年値	2.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
平年値	6.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
発生率	本年値 (%)	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
発生率	前年値 (%)	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	
発生率	平年値 (%)	59.3	8.3	0.0	0.0	0.0	

丹後地域	炭疽病 (病葉数)	輪斑病 (病葉数)	灰色かび病 (病葉数・枝数)	新梢枯死症 (枯死枝数)	もち病 (病葉数)	網もち病 (病葉数)	備考
調査日 7/16							
京丹後市1	0	0	0	0	0	0	
京丹後市2	12	0	0	0	0	0	
京丹後市3	0	0	0	0	0	0	
京丹後市4	7	0	0	0	0	0	
平均値	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
前年値	0.7	0.7	0.0	0.0	0.7	0.0	
平年値	1.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	
発生率	本年値 (%)	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
発生率	前年値 (%)	33.3	33.3	0.0	0.0	33.3	0.0
発生率	例年値 (%)	36.7	5.8	0.0	0.0	3.3	0.0

令和6年 チヤの虫害発生状況（No.1）

山城地域	カンザワハダニ				チャノホソガ						チャコカクモンハマキ				備考
	寄生葉率 (%)	成虫数 100葉当たり	幼虫数 100葉当たり	合計 100葉当たり	寄生芽率 (%)	卵数 100芽当たり	潜行数 100芽当たり	葉緑数 100芽当たり	合計 100芽当たり	巻葉数 m <sup>2</sup> 当たり	綴葉数 m <sup>2</sup> 当たり	幼虫数 m <sup>2</sup> 当たり	蛹数 m <sup>2</sup> 当たり	合計 m <sup>2</sup> 当たり	
調査日 7/16															
宇治市1	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
宇治市2	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
宇治市3	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宇治市4	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宇治市5	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宇治市6	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
城陽市1	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
城陽市2	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	
宇治田原町1	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	
宇治田原町2	0.0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宇治田原町3	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	11	5	0	5	
宇治田原町4	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
京田辺市1	2.0	0	4	4	0.0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	
京田辺市2	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
木津川市1	0.0	0	0	0	18.0	0	18	4	22	0	0	0	0	0	
木津川市2	2.0	2	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
和束町1	0.0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
和束町2	2.0	0	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
和束町3	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	
和束町4	0.0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
和束町5	0.0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
和束町6	0.0	0	0	0	2.0	0	0	2	2	0	2	1	0	1	
平均値	0.3	0.1	0.4	0.5	1.3	0.0	1.1	0.4	1.5	0.0	1.5	0.6	0.0	0.6	
前年値	1.7	2.0	0.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.9	1.4	0.0	1.4	
平年値	2.2	3.2	1.1	4.3	1.5	0.8	0.7	0.5	2.0	0.4	0.5	0.2	0.0	0.2	
発生ほ場率	本年値 (%)	13.6				12.5						62.5			
	前年値 (%)	22.2				7.1						42.9			
	平年値 (%)	35.7				22.1						12.5			

丹波地域	カンザワハダニ				チャノホソガ						チャコカクモンハマキ				備考
	寄生葉率 (%)	成虫数 100葉当たり	幼虫数 100葉当たり	合計 100葉当たり	寄生芽率 (%)	卵数 100芽当たり	潜行数 100芽当たり	葉緑数 100芽当たり	合計 100芽当たり	巻葉数 m <sup>2</sup> 当たり	綴葉数 m <sup>2</sup> 当たり	幼虫数 m <sup>2</sup> 当たり	蛹数 m <sup>2</sup> 当たり	合計 m <sup>2</sup> 当たり	
調査日 7/16,17															
福知山市1	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福知山市2	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	
綾部市1	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
綾部市2	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
舞鶴市1	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
舞鶴市2	4.0	6	0	6	2.0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	
平均値	0.7	1.0	0.0	1.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	1.0	0.8	0.0	0.8	
前年値	0.3	0.7	0.0	0.7	10.7	0.0	8.0	4.7	12.7	0.0	0.7	0.3	0.0	0.3	
平年値	1.2	2.0	0.9	2.8	3.7	1.4	2.1	1.3	4.8	0.3	3.8	1.5	0.1	1.7	
発生ほ場率	本年値 (%)	16.7				16.7						33.3			
	前年値 (%)	33.3				100.0						66.7			
	平年値 (%)	27.3				29.4						40.8			

丹後地域	カンザワハダニ				チャノホソガ						チャコカクモンハマキ				備考
	寄生葉率 (%)	成虫数 100葉当たり	幼虫数 100葉当たり	合計 100葉当たり	寄生芽率 (%)	卵数 100芽当たり	潜行数 100芽当たり	葉緑数 100芽当たり	合計 100芽当たり	巻葉数 m <sup>2</sup> 当たり	綴葉数 m <sup>2</sup> 当たり	幼虫数 m <sup>2</sup> 当たり	蛹数 m <sup>2</sup> 当たり	合計 m <sup>2</sup> 当たり	
調査日 7/16															
京丹後市1	10.0	12	60	72	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
京丹後市2	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
京丹後市3	0.0	0	0	0	2.0	0	2	0	2	3	0	0	0	0	
京丹後市4	0.0	0	0	0	2.0	0	2	0	2	3	0	0	0	0	
平均値	2.5	3.0	15.0	18.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	
前年値	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	0.0	2.7	12.0	14.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
平年値	1.3	1.6	3.9	5.4	10.0	4.2	4.7	3.5	12.0	1.8	0.7	0.3	0.0	0.3	
発生ほ場率	本年値 (%)	25.0				50.0						25.0			
	前年値 (%)	0.0				66.7						0.0			
	例年値 (%)	31.7				62.5						8.3			

令和6年 チヤの虫害発生状況 (N o 2)

山城地域	チャノキヨロアザミウマ		チャノミドリヒメヨコバイ		コミカンアラムシ		ツマグロアオカスミカメ		クワシロ カイガラムシ		チャトゲコナジラミ					
	寄生・被害芽率 (%)	虫数 100芽当たり	寄生・被害芽率 (%)	虫数 100芽当たり	寄生芽率 (%)	虫数 100芽当たり	被害芽率 (%)	被害葉数 m <sup>2</sup> 当たり	寄生株率 (%)	寄生葉率 (%)	発生程度別葉数	0	1	2	発生量 指數	
調査日 7/16																
宇治市1	36.0	114	6.0	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	50	0	0	0	0	
宇治市2	52.0	76	2.0	2	0.0	0	0.0	6	0.0	0.0	50	0	0	0	0	
宇治市3	22.0	30	20.0	28	0.0	0	0.0	5	10.0	0.0	50	0	0	0	0	
宇治市4	14.0	16	12.0	10	0.0	0	0.0	3	0.0	4.0	48	2	0	2		
宇治市5	8.0	0	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	50	0	0	0	0	
宇治市6	16.0	0	2.0	0	0.0	0	2.0	1	0.0	0.0	50	0	0	0	0	
城陽市1	8.0	0	2.0	2	0.0	0	4.0	8	5.0	0.0	50	0	0	0	0	
城陽市2	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.0	2.0	49	1	0	1		
宇治田原町1	4.0	4	8.0	14	2.0	2	0.0	0	45.0	14.0	43	7	0	7		
宇治田原町2	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	26.0	37	10	3	16		
宇治田原町3	6.0	6	2.0	2	2.0	2	0.0	3	0.0	6.0	47	3	0	3		
宇治田原町4	30.0	20	4.0	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	50	0	0	0		
京田辺市1	0.0	0	100.0	8	0.0	0	0.0	0	0.0	4.0	48	2	0	2		
京田辺市2	18.0	8	6.0	10	0.0	0	0.0	0	0.0	4.0	48	2	0	2		
木津川市1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	10.0	22.0	39	11	0	11		
木津川市2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	24.0	38	12	0	12		
和束町1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	16.0	42	8	0	8		
和束町2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	6.0	47	3	0	3		
和束町3	14.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4.0	48	2	0	2		
和束町4	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	12.0	44	6	0	6		
和束町5	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	8.0	46	4	0	4		
和束町6	8.0	4	6.0	10	0.0	0	0.0	0	0.0	30.0	35	15	0	15		
平均値	15.1	17.4	10.8	5.9	0.3	0.3	0.4	1.8	4.8	8.3					4.3	
前年値	20.3	25.3	5.0	6.6	0.0	0.0	0.4	0.7	1.1	22.3					12.6	
平年値	26.6	51.1	6.6	8.5	0.1	0.4	2.3	3.8	9.0	34.2					20.5	
発生ほ場率	本年値 (%)	93.8		81.3		12.5		43.8	31.8	68.2						
	前年値 (%)	100.0		85.7		0.0		28.6	16.7	72.2						
	平年値 (%)	93.6		55.7		8.4		38.6	41.2	76.6						

丹波地域	チャノキヨロアザミウマ		チャノミドリヒメヨコバイ		コミカンアラムシ		ツマグロアオカスミカメ		クワシロ カイガラムシ		チャトゲコナジラミ					
	寄生・被害芽率 (%)	虫数 100芽当たり	寄生・被害芽率 (%)	虫数 100芽当たり	寄生芽率 (%)	虫数 100芽当たり	被害芽率 (%)	被害葉数 m <sup>2</sup> 当たり	寄生株率 (%)	寄生葉率 (%)	発生程度別葉数	0	1	2	発生量 指數	
調査日 7/16.17																
福知山市1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	2.0	1	6.0	50.0	25	25	0	25		
福知山市2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.0	8.0	46	3	1	5		
綾部市1	0.0	0	4.0	4	0.0	0	0.0	7	0.0	4.0	48	2	0	2		
綾部市2	0.0	0	14.0	0	0.0	0	12.0	0	0.0	0.0	50	0	0	0		
舞鶴市1	2.0	2	2.0	0	0.0	0	22.0	51	0.0	6.0	47	3	0	3		
舞鶴市2	2.0	0	0.0	0	0.0	0	6.0	34	4.0	0.0	50	0	0	0		
平均値	1.3	0.3	3.3	0.7	0.0	0.0	7.0	16.2	1.7	11.3					5.8	
前年値	1.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	1.8	0.0	11.0					5.7	
平年値	6.5	2.8	6.4	17.1	0.3	1.6	6.7	4.2	7.9	29.0					18.6	
発生ほ場率	本年値 (%)	50.0		66.7		0.0		100.0	33.3	66.7						
	前年値 (%)	33.3		0.0		0.0		33.3	0.0	83.3						
	平年値 (%)	56.5		49.0		7.8		50.8	43.3	76.7						

丹後地域	チャノキヨロアザミウマ		チャノミドリヒメヨコバイ		コミカンアラムシ		ツマグロアオカスミカメ		クワシロ カイガラムシ		チャトゲコナジラミ					
	寄生・被害芽率 (%)	虫数 100芽当たり	寄生・被害芽率 (%)	虫数 100芽当たり	寄生芽率 (%)	虫数 100芽当たり	被害芽率 (%)	被害葉数 m <sup>2</sup> 当たり	寄生株率 (%)	寄生葉率 (%)	発生程度別葉数	0	1	2	発生量 指數	
調査日 7/16																
京丹後市1	20.0	0	2.0	2	2.0	2	2.0	3	0.0	10.0	45	5	0	5		
京丹後市2	40.0	0	20.0	14	0.0	0	18.0	29	0.0	22.0	39	7	4	15		
京丹後市3	0.0	0	22.0	34	2.0	14	0.0	1	0.0	6.0	47	2	1	4		
京丹後市4	4.0	0	100.0	50	0.0	0	0.0	2	0.0	22.0	39	9	2	13		
平均値	16.0	0.0	36.0	25.0	1.0	4.0	5.0	8.8	0.0	15.0					9.3	
前年値	8.7	0.7	4.7	4.0	0.0	0.0	8.0	1.0	15.0	35.5					21.0	
平年値	17.3	24.9	5.7	9.5	0.6	2.0	12.9	13.8	20.7	42.4					28.4	
発生ほ場率	本年値 (%)	75.0		100.0		50.0		100.0	0.0	100.0						
	前年値 (%)	100.0		100.0		0.0		66.7	50.0	100.0						
	例年値	80.0		58.3		17.5		66.7	60.0	90.0						

※ チヤトゲコナジラミの発生程度 0:寄生がみられない 1:1~9匹／葉 2:10匹以上／葉

発生量指數 = (N1 + 2 × N2) / 100 × 100

## チャノコカクモンハマキ誘殺数(フェロモントラップ)

調査場所:宇治市(茶業研究所)

誘殺数:平年比やや少ない

誘殺盛期:平年比やや早い

月・半期	R06	平年	R05	R04	R03	R02	H31・R01	H30	H29	H28	H27	H26
4・1	0.3	8.9	2.0	0.0	69.0	0.0	0.0	1.0	0.0	17.0	0.0	0.0
	2	1.0	16.8	10.0	7.0	93.5	6.0	0.0	3.0	3.0	44.3	1.0
	3	14.0	49.4	16.3	47.0	300.5	10.5	1.0	14.6	4.0	97.8	2.0
	4	34.5	80.6	22.7	57.7	328.0	26.5	19.7	68.4	32.0	245.0	3.0
	5	82.5	183.4	37.0	161.6	604.0	20.7	98.3	287.5	92.0	512.0	19.7
	6	74.2	184.7	19.5	158.8	418.4	83.3	67.0	433.8	177.0	301.0	150.3
5・1	65.8	281.7	61.5	112.3	357.3	228.5	173.0	660.9	366.0	412.5	327.0	118.0
	2	42.8	326.1	65.0	58.1	492.4	75.8	215.3	742.2	642.7	384.5	279.0
	3	28.8	308.8	26.4	80.7	472.0	47.8	370.8	740.6	519.9	112.5	185.0
	4	6.0	103.1	24.1	49.0	57.3	34.0	199.5	241.0	237.4	39.7	105.0
	5	0.5	33.8	3.3	24.3	11.7	6.0	37.5	68.0	90.0	8.8	37.0
	6	1.0	10.3	1.3	5.7	1.5	5.0	22.0	18.8	9.0	0.0	7.7
6・1	0.0	1.7	1.0	0.0	8.5	0.0	2.0	2.1	0.0	3.3	0.3	0.0
	2	3.0	5.5	1.0	0.0	43.3	3.0	0.0	0.2	1.0	3.7	3.0
	3	6.5	33.4	2.0	8.7	127.7	53.2	0.0	52.0	20.3	40.0	22.0
	4	12.5	48.3	11.0	22.1	126.0	91.1	28.7	73.0	42.8	33.0	50.3
	5	51.0	53.3	42.5	58.5	59.0	71.5	19.5	71.4	100.2	47.2	21.0
	6	48.0	63.1	48.5	35.1	36.3	95.2	27.2	169.3	104.8	10.8	63.0
7・1	21.2	63.8	42.5	17.7	38.7	47.0	50.3	197.1	92.0	12.0	92.7	48.0
	2	5.5	30.7	14.0	9.0	31.8	28.0	31.0	68.1	27.4	7.0	19.3
	3	4.3	14.1	7.1	1.0	9.0	4.5	38.4	15.2	5.9	4.0	10.0
	4	6.5	3.0	1.7	15.2	4.8	17.9	2.0	0.8	5.0	3.8	11.0
	5	10.2	2.4	5.8	40.0	15.6	14.7	1.5	0.0	10.0	7.3	5.0
	6	23.2	0.0	11.5	93.8	4.2	15.0	6.9	21.3	13.3	66.0	0.0
8・1	27.3	4.6	9.0	65.9	56.0	16.0	3.2	31.4	5.7	65.0	16.0	
	2	23.3	7.4	2.0	25.7	68.8	12.7	10.4	33.3	2.0	45.0	26.0
	3	14.0	0.0	2.0	7.2	33.5	9.3	1.3	24.0	0.0	12.7	50.0
	4	5.4	0.7	3.5	3.8	0.8	7.0	8.7	5.2	0.0	1.3	23.0
	5	3.2	0.3	1.5	4.7	1.0	2.5	3.0	2.8	1.0	1.5	14.0
	6	4.9	1.5	1.0	16.0	4.0	6.2	3.0	1.0	3.0	11.5	2.0
9・1	10.6	0.5	3.0	15.8	28.3	3.3	4.0	1.0	9.0	37.3	4.0	
	2	13.8	0.0	4.3	18.8	39.2	7.0	9.0	9.8	14.2	33.7	2.0
	3	26.1	1.0	10.1	14.9	111.5	12.5	9.5	54.3	14.8	26.0	6.0
	4	58.6	2.0	25.5	75.7	219.2	19.5	10.8	73.3	42.6	110.3	7.0
	5	60.0	11.6	26.8	51.5	241.8	11.0	4.9	64.5	28.0	150.7	9.0
	6	47.9	15.2	5.4	40.6	92.3	19.0	21.6	37.2	6.4	226.0	15.0
10・1	43.9	15.3	3.3	23.7	119.7	24.3	13.2	10.2	3.0	137.0	89.0	
	2	28.6	13.3	5.1	14.0	31.8	7.7	31.0	61.8	6.7	72.0	43.0
	3	27.5	4.7	9.4	12.0	28.2	56.0	23.2	46.3	7.3	63.0	25.0
	4	11.7	5.8	12.0	9.3	3.0	22.7	7.5	17.3	10.0	20.0	9.0
	5	9.3	4.9	2.3	2.2	18.0	26.3	5.3	5.1	5.3	3.0	21.0
	6	11.1	8.3	—	2.5	11.0	56.0	4.3	1.3	0.8	11.3	4.0
6月4半旬~7月3半旬計	142.5	273.2	165.6	143.4	300.8	337.3	195.1	594.1	373.1	114.0	277.0	232.0
4~10月計	503.4	2368.4	561.2	1059.5	4239.2	2070.3	1767.8	4112.5	3069.3	2524.2	2523.4	1746.0

## チャノコカクモンハマキ誘殺数(フェロモントラップ)半旬別推定値

調査場所:綾部市(京都府立農業大学校)

誘殺数:平年比やや少ない




誘殺盛期:平年並

月・半期	R06	例年及び平年	R05	R04	R03	R02	H31・R01	H30	H29	H28	H27	H26
4・1	2.1	3.8	9.5	0.1	8.8	—	0.6	—	—	—	0.0	—
	2	2.1	7.5	30.5	0.7	6.6	11.1	0.4	2.9	—	0.3	—
	3	15.0	30.5	144.7	9.3	26.2	24.9	0.0	14.4	6.0	78.4	0.7
	4	30.3	61.9	237.3	34.3	52.0	45.0	27.9	86.3	15.0	88.3	30.0
	5	52.7	84.4	62.5	68.6	135.0	123.6	69.4	203.6	22.1	38.5	73.3
	6	50.0	102.1	63.2	115.7	112.7	172.1	100.2	241.4	12.7	38.5	84.0
5・1	60.9	128.8	106.7	171.9	106.0	204.4	112.5	389.6	34.7	64.1	11.7	86.1
	2	43.1	153.6	135.6	192.6	104.3	138.0	105.5	238.0	147.9	81.3	7.3
	3	12.5	120.1	67.1	125.7	62.9	21.3	74.8	157.3	213.0	55.0	0.7
	4	5.2	64.9	28.1	27.4	32.4	14.8	35.7	37.9	143.6	26.7	301.0
	5	3.9	29.2	5.0	145.7	10.6	5.0	5.7	11.6	15.0	6.6	78.8
	6	3.4	43.6	19.7	360.4	5.1	0.0	3.4	4.0	6.0	1.7	9.0
6・1	0.0	5.6	18.6	2.1	0.7	0.0	0.9	1.9	0.3	15.0	10.5	6.0
	2	8.6	23.0	47.7	2.7	40.1	84.6	0.0	9.3	1.4	15.0	14.1
	3	27.0	83.1	104.9	39.7	61.6	211.4	17.1	52.7	1.4	267.9	59.3
	4	51.9	76.5	255.7	95.0	42.1	91.4	50.0	63.6	24.3	13.6	109.3
	5	102.1	93.5	276.3	133.6	43.9	125.3	71.9	63.6	84.7	3.9	123.1
	6	26.7	134.7	194.3	7.7	30.4	141.4	47.5	24.9	37.1	60.4	44.9
7・1	16.1	91.0	63.6	57.7	29.3	93.6	115.5	52.9	43.6	0.0	312.3	141.4
	2	28.6	62.0	9.3	160.0	45.7	43.3	81.9	36.6	15.6	2.1	154.6
	3	2.1	28.7	5.9	114.3	46.6	—	34.3	0.7	5.4	4.7	26.4
	4	15.9	3.9	62.9	43.9	—	5.7	7.0	0.7	7.4	6.4	5.0
	5	19.1	5.0	2.9	30.7	80.7	22.8	13.4	7.1	11.4	15.4	1.6
	6	42.2	3.9	7.7	30.4	141.4	47.5	24.9	37.1	60.4	44.9	23.6
8・1	44.8	9.3	5.9	50.9	118.4	45.0	20.7	42.9	53.5	69.3	31.9	
	2	35.2	13.4	5.7	57.0	91.3	21.3	43.6	42.9	39.0	32.9	5.0
	3	25.1	12.9	5.7	10.7	45.6	18.8	33.6	31.4	8.6	16.6	67.3
	4	17.6	6.0	2.9	10.7	19.7	12.9	10.0	16.4	8.6	5.7	82.9
	5	15.1	4.9	1.1	14.4	12.9	4.4	7.9	6.9	10.2	5.7	82.9
	6	45.4	13.4	3.4	28.1	29.1	5.1	8.3	10.3	15.2	16.1	324.9
9・1	55.8	38.6	8.6	40.7	85.7	27.4	31.9	11.7	12.7	48.9	251.9	
	2	86.6	50.0	42.1	172.7	101.4	49.8	70.0	54.8	56.6	83.3	185.0
	3	92.2	54.0	37.9	146.9	111.9	77.5	57.3	121.1	92.6	130.7	91.9
	4	119.1	55.7	35.3	58.6	160.0	119.3	36.8	342.9	102.9	138.7	141.0
	5	143.7	55.0	36.4	235.0	135.2	119.8	82.5	300.6	86.4	129.1	257.2
	6	117.9	45.1	21.6	136.9	101.9	10.4	59.7	252.9	60.7	111.7	377.7
10・1	120.2	39.6	17.2	68.9	107.9	10.4	21.8	197.1	45.3	110.7	582.9	
	2	85.7	43.6	16.3	58.6	76.4	22.5	12.0	114.3	52.1	109.6	351.4
	3	65.0	38.4	25.9	43.7	54.6	30.6	5.0	110.0	37.9	94.3	209.9
	4	35.9	38.9	25.9	25.7	21.6	12.5	3.6	88.0	24.0	34.3	84.3
	5	16.8	41.4	21.3	4.3	21.8	7.1	2.7	11.4	8.6	41.1	

## チャノコカクモンハマキ誘殺数(フェロモントラップ)半旬別推定値

調査場所:京丹後市大宮町(口大野団地)

月・半旬	誘殺数: 年比やや多い										誘殺盛期: 年並		
	R06	平年	R05	R04	R03	R02	H31・R01	H30	H29	H28	H27	H26	
4・1	0.0	0.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-
	2	0.0	0.7	2.6	0.0	2.1	0.3	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	-
	3	2.9	1.2	5.0	0.0	2.6	1.4	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
	4	13.1	3.0	9.4	0.0	3.6	8.3	0.9	0.0	1.4	0.6	0.0	0.0
	5	20.0	4.4	13.6	5.0	6.4	8.0	1.1	0.0	1.4	1.9	1.1	1.1
	6	20.0	4.7	20.0	2.6	9.3	5.0	0.0	0.0	0.6	3.6	2.9	2.9
5・1	35.4	6.9	24.5	2.7	2.5	17.9	4.6	0.4	1.3	1.5	2.9	1.4	1.4
	2	27.6	6.9	22.1	8.0	5.1	10.6	6.0	0.7	2.4	0.5	1.6	1.4
	3	10.0	3.7	5.0	5.2	4.6	4.6	0.7	3.1	0.0	0.7	1.1	1.1
	4	4.3	1.4	1.6	2.6	2.1	2.9	0.0	0.1	2.1	0.1	0.7	0.0
	5	1.7	0.7	0.4	0.0	0.7	2.1	0.0	0.3	1.1	0.6	0.1	0.0
	6	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.7	0.0	0.3	0.0	0.4
6・1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
	2	1.4	1.0	6.4	0.0	1.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	6.1	5.0	19.1	0.0	2.9	17.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.7	1.1
	4	15.9	11.1	52.9	2.1	5.7	22.3	3.0	1.4	0.6	0.6	2.0	3.4
	5	42.1	16.8	86.0	3.4	12.1	24.7	4.9	0.0	1.0	2.1	3.0	6.4
	6	19.9	15.4	74.9	3.6	13.6	20.7	4.3	0.0	1.4	4.3	3.6	5.7
7・1	9.7	8.9	45.7	0.8	2.1	13.9	1.4	0.0	2.9	4.3	2.7	4.9	4.9
	2	2.9	2.4	4.3	0.8	2.1	7.3	0.4	0.0	2.4	1.7	1.4	3.9
	3		2.1	0.9	3.4	0.2	1.3	0.0	0.0	1.9	0.0	0.6	1.8
	4		0.8	2.7	0.0	1.6	1.4	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.7
	5		1.9	2.1	0.7	9.0	2.7	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0
	6		6.8	30.4	3.1	7.7	6.0	6.0	0.0	0.9	0.0	1.6	0.0
8・1	4.8		22.7	2.1	1.9	7.9	3.3	0.0	0.3	0.0	0.7	2.9	2.9
	2	3.4	14.5	0.0	0.7	6.4	1.7	0.0	3.0	0.7	0.1	2.0	2.0
	3	1.1	1.3	0.0	1.9	5.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	2.0
	4	0.6	0.5	0.0	1.6	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
	5	0.2	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
	6	1.6	7.8	0.0	4.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
9・1		1.4	3.2	1.1	0.7	3.6	0.8	0.0	0.7	1.1	0.0	0.0	1.9
	2	3.2	3.4	2.0	1.1	4.4	13.4	0.0	0.3	0.9	0.0	0.0	3.6
	3	5.9	7.9	2.9	5.0	12.1	18.7	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	7.9
	4	8.2	16.4	3.6	8.0	14.3	22.1	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	4.9
	5	7.3	18.1	4.9	11.3	14.0	5.0	0.0	2.3	2.6	0.1	0.1	3.6
	6	5.8	14.3	4.1	11.0	7.1	4.0	0.0	3.1	2.4	0.7	0.7	6.4
10・1		3.9	7.9	1.4	6.4	7.1	2.9	0.0	3.6	2.0	0.7	10.4	10.4
	2	4.7	6.4	2.9	10.4	6.3	2.1	0.0	6.4	2.8	0.8	9.4	9.4
	3	3.4	4.7	2.4	8.5	5.0	2.1	0.0	3.0	1.5	0.7	6.4	6.4
	4	1.2	2.9	1.7	3.3	0.0	0.9	0.0	0.6	0.3	0.0	0.0	0.7
	5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	1.1
	6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.6	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
6月4半旬～7月3半旬計	92.6	55.3	267.2	10.9	36.9	88.9	14.0	1.4	10.2	13.0	13.3	26.1	
4～10月計	235.1	162.2	565.5	69.9	175.8	277.8	120.0	4.9	46.0	37.9	32.1	106.9	



## チャノホソガ誘殺数(フェロモントラップ)

調査場所:宇治市(茶業研究所)

月・半旬	R06	平年	誘殺数: 年比少ない 誘殺盛期: 年比やや早い									
			R05	R04	R03	R02	H31・R01	H30	H29	H28	H27	H26
4・1	42.5	157.7	592.5	30.3	165.8	254.3	6.7	59.3	2.0	84.0	335.8	46.0
	2	59.5	151.6	579.5	261.5	59.8	110.0	73.0	33.0	160.0	50.3	132.0
	3	47.5	82.9	224.7	226.5	73.8	3.5	43.0	26.4	134.7	50.8	38.0
	4	59.3	89.5	163.3	42.7	41.8	115.5	101.0	21.6	207.1	32.0	82.0
	5	41.8	48.3	15.0	57.8	11.2	22.0	59.0	11.0	75.3	54.0	84.7
	6	15.0	31.0	18.5	35.5	11.1	22.0	13.0	8.7	62.0	17.0	27.3
5・1	3.0	25.4	54.5	14.8	10.5	72.5	11.3	8.5	34.0	11.3	2.0	35.0
	2	1.0	11.8	15.0	6.3	9.9	17.3	1.5	5.0	28.0	5.8	2.0
	3	1.0	5.8	3.4	3.0	10.4	2.3	3.3	2.8	8.6	2.0	0.0
	4	2.0	8.8	9.1	2.2	57.5	0.0	0.0	4.0	1.4	11.4	2.0
	5	106.5	65.3	63.8	11.8	207.5	73.0	4.7	52.0	3.8	125.6	0.0
	6	313.5	241.2	604.8	139.0	308.3	327.1	89.3	208.5	183.3	205.5	234.0
6・1	350.0	378.8	582.0	245.0	350.3	743.3	255.0	162.3	366.8	224.8	152.0	706.0
	2	337.0	307.0	437.8	443.0	345.5	400.0	245.0	124.4	326.5	242.7	97.0
	3	125.5	201.8	249.3	445.0	154.3	272.6	181.8	77.7	224.9	173.0	21.0
	4	107.5	108.1	103.5	124.3	95.3	138.7	192.7	59.8	134.8	79.0	25.7
	5	73.0	75.2	199.5	91.5	92.5	66.3	27.0	26.9	111.2	41.7	3.3
	6	46.5	92.4	311.4	53.9	207.7	48.4	26.0	45.7	36.8	93.3	57.0
7・1	67.3	214.8	297.1	55.6	635.3	132.0	30.0	123.7	57.3	365.0	418.0	34.0
	2	72.5	231.7	265.8	78.3	592.6	116.0	181.0	140.6	85.1	373.3	424.0
	3	44.4	320.6	209.4	50.5	456.0	374.5	135.0	68.4	148.6	540.7	1090.0
	4	304.3	146.0	37.3	314.5	511.0	146.7	38.0	107.7	491.7	999.5	251.0
	5	181.1	51.2	72.7	260.7	321.5	52.3	17.5	263.3	311.3	360.8	100.0
	6	132.8	104.3	52.0	321.4	369.0	53.0	19.5	71.5	157.7	138.7	41.0
8・1	146.8	31.6	92.0	289.4	424.0	45.0	28.0	148.5	171.3	213.0	25.0	-
	2	124.4	14.4	105.0	177.3	220.5	67.3	10.0	105.0	206.0	239.0	99.0
	3	105.3	4.0	45.0	85.5	209.8	75.7	6.7	71.5	353.0	116.3	85.0
	4	64.9	3.7	28.0	38.8	175.3	79.0	6.7	79.0	153.0	50.7	35.0
	5	43.1	1.3	29.0	8.7	37.0	38.5	2.8	105.7	143.0	37.5	27.0
	6	47.3	4.5	54.5	60.0	62.5	39.5	3.8	128.8	58.3	28.5	33.0
9・1	65.2	3.5	182.3	120.0	45.3	22.0	0.0	80.8	79.7	29.0	89.0	-
	2	105.5	3.0	318.0	290.0	36.2	23.0	4.0	57.3	50.4	90.0	183.0
	3	109.3	12.0	340.6	59.5	22.5	168.5	13.3	75.6	64.6	203.0	133.0
	4	125.1	15.0	220.5	372.3	15.8	250.5	15.4	142.3	49.4	51.0	119.0
	5	80.5	50.8	201.8	132.5	32.2	96.0	6.9	70.1	46.4	48.0	120.0
	6	67.1	54.0	112.4	99.0	49.0	141.0	4.6	13.6	25.2	32.0	140.0
10・1	57.8	18.3	117.7	98.7	103.0	102.7	7.8	17.2	9.5	11.0	92.0	-
	2	64.5	24.2	172.1	60.5	106.6	87.3	3.0	55.0	19.1	7.5	110.0
	3	61.8	20.8	222.0	27.5	123.4	50.0	5.2	54.1	29.0	2.5	83.0
	4	35.4	18.0	163.5	17.0	14.0	30.0	0.8	28.1	28.4	1.0	53.0
	5	38.8	9.3	184.8	6.0	62.3	32.0	2.3	12.3	24.0	6.7	48.0
	6	25.5	8.2	148.5	19.5	20.7	7.0	1.6	12.8	13.0	2.7	21.0
6月4半旬~7月3半旬計	411.2	1042.8	1386.7	454.1	2079.4	875.9	591.7	465.1	573.8	1493.0	2018.0	490.0
4~10月計	1916.3	4835.9	5598.0	5318.2	6755.9	6273.5	3286.3	1468.2	4092.4	5267.2	6007.2	4292.0

## チャノホソガ誘殺数(フェロモントラップ)半旬別推定値

調査場所:綾部市(京都府立農業大学校)

月・半旬	R06	平年及び例年	誘殺数: 年比少ない 誘殺盛期: 年比遅い									
			R05	R04	R03	R02	H31・R01	H30	H29	H28	H27	H26
4・1	11.3	53.5	95.5	85.3	16.3	-	16.6	-	-	-	53.9	-
	2	22.9	209.7	94.5	112.1	11.3	526.6	31.1	296.8	-	395.2	-
	3	4.4	417.8	65.7	145.9	9.5	371.6	54.3	358.9	660.7	1321.4	282.4
	4	11.3	444.3	54.6	185.7	8.2	387.9	100.7	227.3	962.9	1113.2	627.9
	5	18.8	214.2	25.6	232.9	3.6	80.7	57.4	25.0	460.0	0.4	453.9
	6	7.1	84.7	5.8	8.6	6.4	38.7	22.9	5.0	238.4	0.4	336.5
5・1	3.7	47.9	1.8	17.6	5.1	10.6	0.0	8.3	73.0	3.2	331.1	27.8
	2	1.7	41.2	2.5	23.4	2.1	6.0	0.0	3.7	2.1	5.0	365.5
	3	0.0	50.2	44.3	22.9	10.7	0.0	0.0	1.4	1.0	3.6	417.1
	4	0.0	17.2	19.4	26.3	5.6	0.6	0.0	7.1	0.7	2.3	110.0
	5	25.3	74.5	52.4	-	5.0	1.4	0.0	31.4	0.6	233.0	347.1
	6	79.4	336.6	-	300.9	19.7	0.0	0.0	471.3	429.7	1391.1	416.6
6・1	114.3	349.9	301.4	204.3	226.4	8.6	30.6	1113.0	529.5	434.3	486.6	164.6
	2	345.0	399.0	348.1	54.6	261.6	204.7	76.4	1151.4	500.0	434.3	695.7
	3	249.0	455.4	401.6	110.9	290.9	495.7	562.1	539.6	500.0	471.9	961.4
	4	179.3	526.2	490.7	251.4	314.3	827.9	272.9	386.7	859.3	622.1	1060.0
	5	156.4	410.2	333.6	114.3	110.3	590.9	80.0	386.7	1115.1	240.4	1007.4
	6	47.9	305.9	416.3	62.0	66.1	348.1	9.2	386.7	1065.3	11.3	534.3
7・1	48.4	239.5	599.3	38.6	76.4	9.3	36.7	687.0	183.6	60.7	341.1	362.1
	2	90.0	410.8	702.1	84.3	307.9	569.3	85.6	709.7	278.4	633.6	545.7
	3	87.9	398.8	851.7	64.9	370.9	-	148.6	139.3	242.4	783.1	925.0
	4	428.4	795.7	42.0	402.7	-	150.7	495.3	152.9	729.3	1077.9	9.3
	5	263.0	172.9	15.0	362.1	700.7	109.8	359.4	75.7	115.0	684.0	35.0
	6	166.0	189.6	19.7	143.1	559.1	49.5	26.6	45.1	114.3	375.4	137.1
8・1		105.5	99.3	3.9	269.6	286.1	0.0	22.1	18.9	77.1	95.7	182.6
	2		95.2	49.7	60.4	327.6	192.5	0.0	6.7	19.3	54.4	77.1
	3		55.8	0.0	150.0	29.3	123.8	0.0	6.6	38.6	48.6	124.9
	4		72.4	7.4	0.0	72.1	262.5	3.0	12.1	50.6	154.9	156.8
	5		79.1	6.1	37.7	66.6	302.1	15.0	15.7	56.7	129.9	156.8
	6		62.0	1.6	57.1	51.4	27.3	10.9	59.1	63.2	276.4	18.9
9・1		50.7	0.7	17.1	46.4	34.3	15.0	8.5	132.5	52.7	193.6	6.6
	2		42.9	3.6	32.9	44.7	42.2	12.7	12.7	70.5	33.6	173.3
	3		53.2	4.9	26.0	63.4	47.5	35.0	13.4	67.6	44.5	229.3
	4		114.5	5.7	25.7	92.1	16.3	139.1	15.8	117.9	80.0	619.6
	5		140.1	12.9	42.9	190.7	13.4	169.2	15.0	108.1	115.0	705.2
	6		116.5	17.6	54.9	151.7	8.8	11.8	83.4	108.6	687.2	

## チャノホソガ誘殺数(フェロモントラップ)半旬別推定値

調査場所:京丹後市大宮町(口大野団地)

月・半旬	R06	平年	誘殺数: 年平均										誘殺盛期: 年平均	
			R05	R04	R03	R02	H31-R01	H30	H29	H28	H27	H26		
4・1	13.4	65.3	80.7	9.3	18.6	131.0	1.4	110.0	20.0	151.0	58.6	-		
	28.6	57.7	31.6	109.3	1.4	0.7	3.6	50.0	100.0	165.0	33.7	-		
	11.4	109.2	68.6	141.1	7.0	3.6	5.0	84.9	444.6	119.0	110.0	0.0		
	5.0	81.7	119.6	151.4	8.7	9.3	16.6	66.4	126.4	155.0	111.1	3.4		
	0.7	78.1	27.9	327.9	0.7	7.6	24.4	25.7	102.9	107.9	104.6	3.7		
	37.8	6.2	131.1	8.1	2.9	25.0	1.4	81.3	46.7	94.3	2.9			
5・1	0.1	13.0	2.5	1.5	2.5	29.3	10.1	1.9	49.1	6.9	0.0	0.0		
	0.0	7.4	2.9	4.5	0.5	12.2	5.3	1.7	29.7	2.6	0.4	0.0		
	0.0	1.4	0.0	4.4	0.8	1.4	3.6	0.0	0.0	0.9	0.6	0.0		
	0.0	1.3	0.0	2.6	1.2	2.1	0.7	1.7	0.0	2.1	0.0	0.0		
	13.7	27.0	199.7	0.0	0.0	0.0	0.7	3.3	1.9	10.6	8.7	0.0		
	107.7	114.4	701.5	54.9	3.4	0.6	8.6	68.0	11.1	66.9	642.6	10.7		
6・1	223.6	230.1	1010.8	224.6	11.4	44.1	20.0	158.9	135.0	236.2	732.7	22.1		
	480.0	488.8	1666.7	281.9	47.0	109.3	166.4	253.9	1043.6	341.7	635.0	39.3		
	322.3	467.3	834.1	300.7	97.1	324.3	181.8	429.9	1227.9	342.9	522.9	31.9		
	179.7	337.8	519.3	423.6	19.3	296.4	202.4	479.3	549.0	213.1	256.7	25.1		
	30.0	185.1	203.9	232.0	21.0	242.4	179.9	98.6	380.1	122.7	66.1	17.9		
	22.0	137.6	343.0	102.3	21.4	100.7	62.1	54.4	381.4	35.7	13.6	2.1		
7・1	87.1	133.5	670.0	94.2	18.6	33.3	40.4	41.6	25.0	145.0	22.0	27.0		
	187.9	210.5	980.0	145.8	90.0	99.9	46.3	107.9	45.1	169.0	19.1	46.4		
	259.3	294.7	1004.4	126.2	182.7	225.0	497.2	104.4	55.7	162.0	57.1	216.2		
	369.6	891.0	110.0	359.8	794.3	610.6	77.6	43.3	70.0	283.4	161.5			
	231.7	372.1	39.3	231.2	468.1	617.9	38.6	40.7	45.3	218.6	82.3			
	151.8	106.6	38.0	171.9	268.9	545.1	6.9	28.1	49.0	102.6	20.6			
8・1		70.3	26.1	53.5	74.7	170.7	135.4	4.0	17.0	80.7	20.0	32.1		
		98.4	19.1	145.2	7.9	78.7	61.1	2.4	25.0	447.9	12.6	51.4		
		96.5	6.9	141.5	24.4	126.5	60.3	0.6	17.9	394.1	12.1	60.4		
		93.2	2.8	56.4	42.1	363.1	22.6	0.1	26.9	231.3	14.3	45.0		
		95.9	0.0	12.1	56.5	611.4	12.9	0.0	33.6	40.7	12.9	37.7		
		49.0	10.6	3.4	45.5	244.3	29.7	0.1	43.7	14.6	23.1	19.5		
9・1		25.3	6.4	1.1	65.0	24.3	31.9	0.7	55.7	17.3	24.5	11.0		
		38.9	1.3	61.3	138.0	24.7	28.1	1.3	32.6	24.1	18.2	17.9		
		55.7	3.0	152.1	178.6	10.0	44.7	0.9	23.3	32.6	22.7	77.9		
		60.7	6.4	112.1	200.4	13.4	72.1	0.0	47.9	32.9	32.5	88.6		
		85.4	13.9	83.9	181.6	16.1	194.3	2.9	97.6	92.9	38.4	89.9		
		77.3	11.4	59.9	144.4	17.9	218.7	4.6	78.3	83.0	46.4	66.4		
10・1		51.2	5.0	52.1	85.0	13.3	180.4	4.6	30.7	38.7	18.4	38.4		
		26.3	5.0	18.6	17.0	10.4	98.6	0.0	55.7	5.0	19.5	24.3		
		19.2	5.0	29.7	0.0	7.9	68.6	5.1	36.0	1.0	26.9	13.6		
		13.5	4.4	36.4	0.7	2.1	36.4	5.6	20.9	1.7	7.9	3.6		
		9.6	2.1	33.6	3.6	2.6	13.3	4.3	12.9	4.3	7.3	2.3		
		8.4	0.4	38.1	-	4.3	7.7	1.7	6.9	0.0	4.9	1.1		
6月4半旬～7月3半旬計	766.0	1299.2	3720.6	1124.1	353.0	997.7	1028.3	886.2	1436.3	847.5	434.6	334.7		
4～10月計	1973.2	4807.5	9972.9	4147.6	2589.7	4949.1	4591.9	2305.9	5584.5	4310.0	4457.0	1394.2		

