

ダイコン

病害虫発生状況

- 1 黒斑細菌病 発生を認めなかった（平年並）。
- 2 白さび病 発生を認めなかった（平年並）。
- 3 アブラムシ類 平年比やや少なかった。
- 4 コナガ 発生を認めなかった（平年並）。
- 5 ハスモンヨトウ 発生を認めなかった（平年並）。
- 6 ハイマダラノメイガ 平年並であった。
- 7 その他の病害虫 ダイコンサルハムシ成虫（木津川市 1：0.4頭/10株・寄生株率4.0%）を認めた。

ダイコン調査結果（25株調査：害虫個体数は10株換算）

調査日：令和2年9月15、16日

調査場所	黒斑細菌病	白さび病	アブラムシ類			コナガ		ハスモンヨトウ			ハイマダラノメイガ		
	発病株率 (%)	発病株率 (%)	有翅虫数 (／10株)	無翅虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	幼虫・蛹 (／10株)	寄生株率 (%)	卵塊数 (／10株)	幼虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	幼虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	
木津川市 1	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	
木津川市 2	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	
木津川市 3	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.40	4.0	
京丹後市久美浜町	0.0	0.0	0.40	0.00	4.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	
京丹後市弥栄町	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	
平均	2年	0.0	0.0	0.08	0.00	0.8	0.00	0.0	0.00	0.0	0.08	0.8	
	平年比	並	並	並	並	やや少	並	並	並	並	並	並	
	平年	0.0	0.0	0.17	0.49	3.0	0.01	0.1	0.00	0.02	0.2	0.35	2.9
	元年	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	2.10	17.0
	30年	0.0	0.0	0.07	0.07	1.3	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
	29年	0.0	0.0	0.40	3.60	5.6	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
	28年	0.0	0.0	0.30	0.00	3.2	0.00	0.0	0.00	0.10	0.8	0.00	0.0
	27年	0.0	0.0	0.20	0.10	3.0	0.00	0.0	0.00	0.10	1.0	0.00	0.0
	26年	0.0	0.0	0.30	0.00	2.7	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
	25年	0.0	0.0	0.30	0.50	8.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.30	1.3
24年	0.0	0.0	0.10	0.00	1.3	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.30	2.7	
23年	0.0	0.0	0.00	0.50	4.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.30	2.7	
22年	0.0	0.0	0.00	0.10	1.3	0.10	1.3	0.00	0.00	0.0	0.50	5.3	
発生 ほ場率 (%)	2年	0.0	0.0	20.0			0.0		0.0			20.0	
	平年比	並	並	やや少			並		並			並	
	平年	0.0	0.0	35.5			6.7		7.8			26.7	
	元年	0.0	0.0	0.0			0.0		0.0			100.0	
	30年	0.0	0.0	16.7			0.0		0.0			0.0	
	29年	0.0	0.0	60.0			0.0		20.0			0.0	
	28年	0.0	0.0	20.0			0.0		25.0			0.0	
	27年	0.0	0.0	25.0			0.0		0.0			0.0	
	26年	0.0	0.0	66.7			0.0		0.0			33.3	
	25年	0.0	0.0	66.7			0.0		0.0			33.3	
24年	0.0	0.0	33.3			0.0		0.0			66.7		
23年	0.0	0.0	33.3			33.3		0.0			33.3		
22年	0.0	0.0	33.3			33.3		33.3			0.0		