

ダイコン

病害虫発生状況

- 1 黒斑細菌病発生を認めなかった（平年並）。
- 2 白さび病発生を認めなかった（平年並）。
- 3 アブラムシ類発生を認めなかった（平年比少）。
- 4 コナガ平年比多かった。
- 5 ハスモンヨトウ平年比多かった。
- 6 ハイマダラノメイガ発生を認めなかった（平年並）。
- 7 その他病害虫カブラハバチ及びキスジノミハムシの発生を久美浜町で認めた。

ダイコン調査結果（25株調査：害虫個体数は10株換算）

調査日：令和5年9月13、14日

調査場所	黒斑細菌病	白さび病	アブラムシ類			コナガ		ハスモンヨトウ			ハイマダラノメイガ		
	発病株率 (%)	発病株率 (%)	有翅虫数 (／10株)	無翅虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	幼虫・蛹 (／10株)	寄生株率 (%)	卵塊数 (／10株)	幼虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	幼虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	
木津川市 ①	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	
京丹後市弥栄町	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	
京丹後市久美浜町	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.80	8.0	0.00	0.40	4.0	0.00	0.0	
平均	R5年	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.27	2.7	0.00	0.13	1.3	0.00	0.0
	平年(例年)比	並	並	やや少	並	少	多	多	並	多	多	並	並
	平年(例年)	0.0	0.0	0.19	0.62	3.0	0.03	0.2	0.00	0.02	0.2	0.28	2.2
	R4年	0.0	0.0	0.30	0.40	4.0	0.30	2.0	0.00	0.00	0.0	0.30	3.0
	R3年	0.0	0.0	0.00	1.50	1.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
	R2年	0.0	0.0	0.08	0.00	0.8	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.08	0.8
	R元年	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	2.10	17.0
	H30年	0.0	0.0	0.07	0.07	1.3	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
	H29年	0.0	0.0	0.40	3.60	5.6	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
	H28年	0.0	0.0	0.30	0.00	3.2	0.00	0.0	0.00	0.10	0.8	0.00	0.0
	H27年	0.0	0.0	0.20	0.10	3.0	0.00	0.0	0.00	0.10	1.0	0.00	0.0
H26年	0.0	0.0	0.30	0.00	2.7	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	
H25年	0.0	0.0	0.30	0.50	8.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.30	1.3	
発生 ほ場率 (%)	R5年	0.0	0.0	0.0			33.3		33.3			0.0	
	平年(例年)比	並	並	少			多		多			並	
	平年(例年)	0.0	0.0	32.5			2.5		4.5			23.7	
	R4年	0.0	0.0	25.0			25.0		0.0			50.0	
	R3年	0.0	0.0	25.0			0.0		0.0			0.0	
	R2年	0.0	0.0	20.0			0.0		0.0			20.0	
	R元年	0.0	0.0	0.0			0.0		0.0			100.0	
	H30年	0.0	0.0	16.7			0.0		0.0			0.0	
	H29年	0.0	0.0	60.0			0.0		20.0			0.0	
	H28年	0.0	0.0	20.0			0.0		25.0			0.0	
	H27年	0.0	0.0	25.0			0.0		0.0			0.0	
H26年	0.0	0.0	66.7			0.0		0.0			33.3		
H25年	0.0	0.0	66.7			0.0		0.0			33.3		