

# ダイコン

## 病害虫発生状況

- 1 黒斑細菌病 . . . . . 平年比多かった。
- 2 白さび病 . . . . . 発生を認めなかった（平年並）。
- 3 アブラムシ類 . . . . . 平年並であった。
- 4 コナガ . . . . . 平年比多かった。
- 5 ハスモンヨトウ . . . . . 平年比多かった。
- 6 ハイマダラノメイガ . . . . . 平年比やや多かった。
- 7 その他病害虫 . . . . . 木津川市①でカブラハバチ、キスジノミハムシ、ハモグリバエ、タバココナジラミを認めた。  
 弥栄町でアオムシと白斑病を認め、久美浜町でハイマダラメイガの被害を認めた。

ダイコン調査結果（25株調査：害虫個体数は10株換算）

調査日：令和6年9月12、17、18日

調査場所	黒斑細菌病	白さび病	アブラムシ類			コナガ		ハスモンヨトウ			ハイマダラノメイガ		
	発病株率 (%)	発病株率 (%)	有翅虫数 (✓10株)	無翅虫数 (✓10株)	寄生株率 (%)	幼虫・蛹 (✓10株)	寄生株率 (%)	卵塊数 (✓10株)	幼虫数 (✓10株)	寄生株率 (%)	幼虫数 (✓10株)	寄生株率 (%)	
木津川市①	0.0	0.0	0.40	0.40	8.0	0.80	8.0	0.40	2.00	20.0	2.80	20.0	
京丹後市弥栄町	8.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	
京丹後市久美浜町	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	
平均	R6年	2.7	0.0	0.13	0.13	2.7	0.27	2.7	0.13	0.67	6.7	0.93	6.7
	平年比	多	並	並	並	並	やや多	多	多	多	やや多	やや多	
	平年	0.0	0.0	0.16	0.57	2.2	0.06	0.5	0.00	0.03	0.3	0.25	2.1
	R5年	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.27	2.7	0.00	0.13	1.3	0.00	0.0
	R4年	0.0	0.0	0.30	0.40	4.0	0.30	2.0	0.00	0.00	0.0	0.30	3.0
	R3年	0.0	0.0	0.00	1.50	1.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
	R2年	0.0	0.0	0.08	0.00	0.8	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.08	0.8
	R元年	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	2.10	17.0
	H30年	0.0	0.0	0.07	0.07	1.3	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
	H29年	0.0	0.0	0.40	3.60	5.6	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
H28年	0.0	0.0	0.30	0.00	3.2	0.00	0.0	0.00	0.10	0.8	0.00	0.0	
H27年	0.0	0.0	0.20	0.10	3.0	0.00	0.0	0.00	0.10	1.0	0.00	0.0	
H26年	0.0	0.0	0.30	0.00	2.7	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	
発生 ほ場率 (%)	R6年	33.3	0.0	33.3			33.3		33.3			33.3	
	平年比	多	並	やや多			多		多			やや多	
	平年	0.0	0.0	25.8			5.8		7.8			20.3	
	R5年	0.0	0.0	0.0			33.3		33.3			0.0	
	R4年	0.0	0.0	25.0			25.0		0.0			50.0	
	R3年	0.0	0.0	25.0			0.0		0.0			0.0	
	R2年	0.0	0.0	20.0			0.0		0.0			20.0	
	R元年	0.0	0.0	0.0			0.0		0.0			100.0	
	H30年	0.0	0.0	16.7			0.0		0.0			0.0	
	H29年	0.0	0.0	60.0			0.0		20.0			0.0	
H28年	0.0	0.0	20.0			0.0		25.0			0.0		
H27年	0.0	0.0	25.0			0.0		0.0			0.0		
H26年	0.0	0.0	66.7			0.0		0.0			33.3		