

ダイコン

病害虫発生状況

- 1 黒斑細菌病発生を認めなかった（平年並）。
- 2 白さび病平年比多かった。
- 3 モザイク病発生を認めなかった（平年並）。
- 4 アブラムシ類平年並であった。
- 5 コナガ発生を認めなかった（平年並）。
- 6 ハスモンヨトウ発生を認めなかった（平年並）。
- 7 ハイマダラノメイガ発生を認めなかった（平年並）。
- 8 その他の病害虫キスジノミハムシの発生を久美浜町で、シロイチモジヨトウの発生を木津川市②で、タバココナジラミの発生を木津川市①及び②で認めた。

発生程度別基準

調査項目	無	少	中	多	甚
モザイク病 発病株率(%)	0	1～20	21～40	41～70	71以上

ダイコン調査結果（25株調査：害虫個体数は10株換算）

調査日：令和6年10月15、16日

調査場所	黒斑細菌病	白さび病	モザイク病	アブラムシ類			コナガ		ハスモンヨトウ			ハイマダラノメイガ		
	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	有翅虫数 (／10株)	無翅虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	幼虫・蛹数 (／10株)	寄生株率 (%)	卵塊数 (／10株)	幼虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	幼虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	
木津川市 ①	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
木津川市 ②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
京丹後市弥栄町	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
京丹後市久美浜町	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
平均	R6年	0.0	4.0	0.0	0.2	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年比	並	多	並	やや多	やや少	並	並	並	並	並	並	並	
	平年	2.4	0.2	0.0	0.1	3.0	3.5	0.3	1.9	0.0	1.1	1.1	0.2	
	R5年	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	4.0	0.7	6.0	0.0	0.2	2.0	0.4	
	R4年	2.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.0	0.3	3.0	0.0	0.4	4.0	0.0	
	R3年	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6.0	0.0	10.0	1.0	0.2	
	R2年	20.8	0.7	0.0	0.2	0.5	6.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.0	
	R元年	0.0	0.0	0.0	0.1	2.3	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	
	H30年	0.0	0.0	0.0	0.1	16.8	10.9	0.1	0.6	0.0	0.1	1.1	0.3	
	H29年	0.0	1.6	0.0	0.0	7.6	2.4	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
発生 ほ場率 (%)	R6年	0.0	25.0	0.0	25.0			0.0		0.0			0.0	
	平年比	並	多	並	並			並		並			並	
	平年	9.0	3.7	6.7	32.3			15.9		14.6			23.4	
	R5年	0.0	0.0	0.0	50.0			50.0		25.0			50.0	
	R4年	25.0	0.0	25.0	25.0			25.0		25.0			0.0	
	R3年	25.0	0.0	25.0	0.0			50.0		25.0			50.0	
	R2年	0.0	16.7	16.7	33.3			0.0		16.7			0.0	
	R元年	0.0	0.0	0.0	42.9			0.0		0.0			85.7	
	H30年	0.0	0.0	0.0	71.4			14.3		14.3			28.6	
	H29年	0.0	20.0	0.0	40.0			20.0		0.0			0.0	
H28年	40.0	0.0	0.0	20.0			0.0		40.0			20.0		
H27年	0.0	0.0	0.0	20.0			0.0		0.0			0.0		
H26年	0.0	0.0	0.0	20.0			0.0		0.0			0.0		