

ダイコン

病害虫発生状況

- 1 黒斑細菌病発生を認めなかった（平年並）。
- 2 白さび病発生を認めなかった（平年並）。
- 3 アブラムシ類平年比やや少なかった。
- 4 コナガ発生を認めなかった（平年並）。
- 5 ハスモンヨトウ発生を認めなかった（平年並）。
- 6 ハイマダラノメイガ発生を認めなかった（平年並）。
- 7 その他の病害虫ダイコンサルハムシ成虫及び幼虫を認めた（久美浜町：3.6頭/10株・寄生株率20.0%）。
カブラハバチ幼虫を認めた（木津川市①：0.4頭/10株・寄生株率4.0%、久美浜町：0.8頭/10株・寄生株率8.0%）。
キスジノミハムシ成虫を認めた（久美浜町：0.4頭/株・寄生株率4.0%）。

ダイコン調査結果（25株調査：害虫個体数は10株換算）

調査日：令和3年9月16、17日

調査場所	黒斑細菌病	白さび病	アブラムシ類			コナガ		ハスモンヨトウ			ハイマダラノメイガ		
	発病株率 (%)	発病株率 (%)	有翅虫数 (／10株)	無翅虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	幼虫・蛹 (／10株)	寄生株率 (%)	卵塊数 (／10株)	幼虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	幼虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	
木津川市①	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	
木津川市②	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	
京丹後市久美浜町	0.0	0.0	0.00	6.00	4.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	
京丹後市弥栄町	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	
平均	R3年	0.0	0.0	0.00	1.50	1.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
	平年(例年)比	並	並	やや少	やや多	やや少	並	並	並	並	並	並	並
	平年(例年)	0.0	0.0	0.17	0.48	3.0	0.00	0.0	0.00	0.02	0.2	0.31	2.5
	R2年	0.0	0.0	0.08	0.00	0.8	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.08	0.8
	R元年	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	2.10	17.0
	H30年	0.0	0.0	0.07	0.07	1.3	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
	H29年	0.0	0.0	0.40	3.60	5.6	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
	H28年	0.0	0.0	0.30	0.00	3.2	0.00	0.0	0.00	0.10	0.8	0.00	0.0
	H27年	0.0	0.0	0.20	0.10	3.0	0.00	0.0	0.00	0.10	1.0	0.00	0.0
	H26年	0.0	0.0	0.30	0.00	2.7	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
発生 ほ場率 (%)	R3年	0.0	0.0	25.0		0.0		0.0			0.0		
	平年(例年)比	並	並	並		並		並			並		
	平年(例年)	0.0	0.0	34.2		3.3		4.5			28.7		
	R2年	0.0	0.0	20.0		0.0		0.0			20.0		
	R元年	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			100.0		
	H30年	0.0	0.0	16.7		0.0		0.0			0.0		
	H29年	0.0	0.0	60.0		0.0		20.0			0.0		
	H28年	0.0	0.0	20.0		0.0		25.0			0.0		
	H27年	0.0	0.0	25.0		0.0		0.0			0.0		
	H26年	0.0	0.0	66.7		0.0		0.0			33.3		
H25年	0.0	0.0	66.7		0.0		0.0			33.3			
H24年	0.0	0.0	33.3		0.0		0.0			66.7			
H23年	0.0	0.0	33.3		33.3		0.0			33.3			