

黒大豆

病害虫等発生状況

- 1 フタスジヒメハムシ・・・平年並であった。
- 2 チョウ目害虫・・・平年比やや多かった。
- 3 マメシンクイガ・・・被害を認めなかった。

黒大豆巡回調査結果（25株200莢調査）

調査：令和6年10月11、15日（％）

調査結果	フタスジヒメハムシ		チョウ目害虫		マメシンクイガ		備考
	食害莢率	ほ場率	食害莢率	ほ場率	食害莢率	ほ場率	
久美浜町①	0.0		1.0		0.0		
久美浜町②	1.5		0.0		0.0		
夜久野①	0.0		0.5		0.0		
夜久野②	0.5		1.0		0.0		
和知①	9.0		1.0		0.0		
和知②	9.0		1.0		0.0		
丹波①	9.5		1.5		0.0		
丹波②	13.5		1.0		0.0		
R6年	5.4	75.0	0.9	87.5	0.0	0.0	
平年比	並	並	並	多	-	-	
	並		やや多		-		
平年	4.6	85.0	1.1	65.0	-	-	
R5年	1.9	62.5	0.9	50.0	0.0	0.0	
R4年	6.7	87.5	1.1	75.0			
R3年	1.1	87.5	1.4	75.0			
R2年	0.8	75.0	2.6	62.5			
R元年	11.3	87.5	0.9	75.0			
H30年	5.9	100.0	1.0	62.5			
H29年	4.6	75.0	0.4	62.5			
H28年	2.8	100.0	1.0	50.0			
H27年	4.4	75.0	1.0	87.5			
H26年	6.8	100.0	0.4	50.0			