

## 黒大豆

### 病害虫等発生状況

- 1 フタスジヒメハムシ・・・平年並であった。
- 2 チョウ目害虫・・・平年比やや多かった。
- 3 マメシンクイガ・・・被害を認めなかった。

黒大豆巡回調査結果（25株200莢調査）

調査：令和7年10月14、16日 (%)

| 調査結果  | フタスジヒメハムシ |       | チョウ目害虫 |      | マメシンクイガ |     | 備考 |
|-------|-----------|-------|--------|------|---------|-----|----|
|       | 食害莢率      | ほ場率   | 食害莢率   | ほ場率  | 食害莢率    | ほ場率 |    |
| 久美浜町① | 1.0       |       | 0.0    |      | 0.0     |     |    |
| 久美浜町② | 3.0       |       | 3.0    |      | 0.0     |     |    |
| 夜久野町① | 0.5       |       | 0.5    |      | 0.0     |     |    |
| 夜久野町② | 7.5       |       | 1.5    |      | 0.0     |     |    |
| 和知①   | 0.0       |       | 2.5    |      | 0.0     |     |    |
| 和知②   | 4.5       |       | 2.5    |      | 0.0     |     |    |
| 丹波①   | 4.5       |       | 0.5    |      | 0.0     |     |    |
| 丹波②   | 1.0       |       | 0.0    |      | 0.0     |     |    |
| R7年   | 2.8       | 87.5  | 1.3    | 75.0 | 0.0     | 0.0 |    |
| 平年比   | 並         | 並     | やや多    | 並    | -       | -   |    |
|       | 並         |       | やや多    |      | -       |     |    |
| 平年    | 4.5       | 82.5  | 1.1    | 68.8 | -       | -   |    |
| R6年   | 5.4       | 75.0  | 0.9    | 87.5 | 0.0     | 0.0 |    |
| R5年   | 1.9       | 62.5  | 0.9    | 50.0 | 0.0     | 0.0 |    |
| R4年   | 6.7       | 87.5  | 1.1    | 75.0 |         |     |    |
| R3年   | 1.1       | 87.5  | 1.4    | 75.0 |         |     |    |
| R2年   | 0.8       | 75.0  | 2.6    | 62.5 |         |     |    |
| R元年   | 11.3      | 87.5  | 0.9    | 75.0 |         |     |    |
| H30年  | 5.9       | 100.0 | 1.0    | 62.5 |         |     |    |
| H29年  | 4.6       | 75.0  | 0.4    | 62.5 |         |     |    |
| H28年  | 2.8       | 100.0 | 1.0    | 50.0 |         |     |    |
| H27年  | 4.4       | 75.0  | 1.0    | 87.5 |         |     |    |