

エビイモ

病害虫発生状況

- 1

汚斑病

発生を認めなかった。
- 2

モザイク病

発生を認めなかった。
- 3

アブラムシ類

久美浜町で発生を認めた。
- 4

ハスモンヨトウ

京田辺市の調査外で白変葉及び幼虫を認めた。
- 5

ハダニ類

2ほ場とも発生を認めた。
- 6

その他の病害虫

京田辺市でスズメガ類の発生を認めた。

エビイモ調査結果（２５株調査：虫数は１０株換算、アブラムシ類及びハダニ類は中位葉１枚調査）調査日：令和８年７月１４、１５日

調査場所		汚斑病		モザイク病 発病株率 (%)	アブラムシ類			ハスモンヨトウ		ハダニ類		
		発病株率 (%)	発病度		寄生虫数(／10株)			寄生株率 (%)	卵塊・幼虫 数 (／10株)	寄生株率 (%)	虫数 (／10株)	寄生株率 (%)
					有翅	無翅	計					
京田辺市		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.2	72.0
久美浜町		0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	1.2	8.0	0.0	0.0	37.6	12.0
平 均	R 8 年	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	4.0	0.0	0.0	60.4	42.0
	平年比	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	平 年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	R 7 年	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	R 6 年	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	R 5 年	2.0	0.4	16.0	0.00	33.60	33.6	12.0	0.0	0.0	151.8	14.0
	R 4 年											
	R 3 年											
	R 2 年											
	R 元年											
	H 3 0 年											
H 2 9 年												
H 2 8 年												
発 生 ほ場率 (%)	R 8 年	0.0		0.0	50.0			50.0		100.0		
	平年比	—		—	—			—		—		
	平 年	—		—	—			—		—		
	R 7 年	0.0		0.0	0.0			0.0		0.0		
	R 6 年	0.0		0.0	0.0			0.0		0.0		
	R 5 年	50.0		100.0	50.0			0.0		50.0		
	R 4 年											
	R 3 年											
	R 2 年											
	R 元年											
	H 3 0 年											
H 2 9 年												
H 2 8 年												

汚斑病発病程度

発病度＝
$$\frac{6A+4B+2C+D}{6 \times \text{調査葉数}} \times 100$$

- A：病斑面積が４分の３以上である。
- B：病斑面積が２分の１～４分の３である。
- C：病斑面積が４分の１～２分の１である。
- D：病斑面積が４分の１以下である。
- E：病斑が認められない。

ハスモンヨトウ被害程度

(発生程度別基準)					
程度	無	少	中	多	甚
食害面積率（％）	0	1～10	11～25	26～50	51以上