

# 水稻

## 病虫害の発生状況

(1) 穂いもち

発生量は南丹で平年比多く、丹後で平年比やや多い。山城及び中丹では平年並。  
府全体では平年比多い。

(2) 紋枯病

発生量は南丹及び丹後で平年比多く、中丹で平年比やや多い。山城での発生量は平年並。  
府全体では平年比やや多い。

(3) 白葉枯病

発生を認めなかった。

(4) トビイロウンカ

発生を認めなかった（平年並）。  
京丹後市の予察灯調査で、8月下旬に誘殺を認めた。

(5) コブノメイガ

発生を認めなかった（平年並）。

(6) 斑点米カメムシ類

山城及び南丹の一部で発生を認めた。

(7) スクミリンゴガイ

山城及び南丹の一部で発生を認めた。

(8) その他

発病・発生程度別基準

|          |          | 無 | 少     | 中       | 多        | 甚      |
|----------|----------|---|-------|---------|----------|--------|
| 穂いもち     | 被害籾率     | 0 | 1-10  | 11-25   | 26-50    | 51以上   |
| 紋枯病      | 発病度      | 0 | 1-20  | 21-40   | 41-70    | 71以上   |
| 白葉枯病     | 発病度      | 0 | 1-5   | 6-20    | 21-50    | 51以上   |
| トビイロウンカ  | 25株当たり虫数 | 0 | 1-125 | 126-500 | 501-1250 | 1251以上 |
| ニカメイガ    | 被害株率(%)  | 0 | 1-30  | 31-60   | 61-90    | 91以上   |
| コブノメイガ   | 被害葉率(%)  | 0 | 1-5   | 6-15    | 16-45    | 46以上   |
| 斑点米カメムシ類 | すくい取り虫数  | 0 | 1-3   | 4-10    | 11-30    | 31以上   |

表1 穂いもち調査結果（9月第3～4半旬：本田25株見取り調査）

|     | 山城        |          |          | 南丹        |          |          | 中丹        |          |          | 丹後        |          |          | 京都府       |          |          |
|-----|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|     | 確認<br>ほ場率 | 発病<br>株率 | 被害<br>籾率 | 確認<br>ほ場率 | 発病<br>株率 | 被害<br>籾率 | 確認<br>ほ場率 | 発病<br>株率 | 被害<br>籾率 | 確認<br>ほ場率 | 発病<br>株率 | 被害<br>籾率 | 確認<br>ほ場率 | 発病<br>株率 | 被害<br>籾率 |
| 3年  | 33.3      | 2.7      | 0.20     | 100.0     | 90.7     | 21.87    | 50.0      | 4.0      | 0.20     | 100.0     | 4.0      | 0.20     | 58.3      | 25.0     | 5.62     |
| 平年比 | 並         | 並        | (並)      | 多         | 多        | (多)      | 並         | 並        | (並)      | 多         | やや多      | (やや多)    | やや多       | 多        | (多)      |
| 平年  | 31.7      | 3.9      | (0.29)   | 31.9      | 16.1     | (1.72)   | 30.6      | 8.5      | (0.74)   | 10.7      | 5.3      | 0.68     | 28.7      | 7.7      | (0.71)   |
| 2年  | 16.7      | 0.7      | 0.002    | 0.0       | 0.0      | 0.00     | 0.0       | 0.0      | 0.00     | 50.0      | 34.0     | 3.70     | 15.4      | 5.5      | 0.57     |
| 元年  | 16.7      | 0.7      | 0.17     | —         | —        | —        | 0.0       | 0.0      | 0.00     | —         | —        | —        | 14.3      | 0.6      | 0.14     |
| 30年 | 40.0      | 0.8      | 0.12     | 0.0       | 0.0      | 0.00     | 0.0       | 0.0      | 0.00     | 0.0       | 0.0      | 0.00     | 11.8      | 0.2      | 0.04     |
| 29年 | 20.0      | 1.6      | 0.08     | 100.0     | 44.0     | 3.20     | 100.0     | 42.7     | 2.27     | 0.0       | 0.0      | 0.00     | 54.5      | 18.7     | 1.10     |
| 28年 | 80.0      | 12.0     | 0.60     | 33.3      | 26.7     | 1.70     | 100.0     | 10.0     | 0.50     | 0.0       | 0.0      | 0.00     | 63.6      | 12.7     | 0.70     |
| 27年 | 60.0      | 6.0      | 0.30     | 80.0      | 44.0     | 3.70     | 75.0      | 24.0     | 2.43     | 25.0      | 3.0      | 0.35     | 61.1      | 22.7     | 2.00     |
| 26年 | 50.0      | 8.0      | 0.73     | —         | —        | —        | 0.0       | 0.0      | 0.00     | 0.0       | 0.0      | 0.00     | 30.0      | 4.8      | 0.44     |
| 25年 | 33.3      | 9.3      |          | 25.0      | 5.0      |          | —         | —        |          | —         | —        |          | 30.0      | 7.6      |          |
| 24年 | 0.0       | 0.0      |          | 0.0       | 0.0      |          | 0.0       | 0.0      |          | —         | —        |          | 0.0       | 0.0      |          |
| 23年 | 0.0       | 0.0      |          | 16.7      | 9.3      |          | 0.0       | 0.0      |          | 0.0       | 0.0      |          | 6.7       | 3.7      |          |

※詳細は表5参照。（ ）内は例年値。

表2 紋枯病調査結果（9月第3～4半旬：本田25株見取り調査）

|     | 山城        |          |      | 南丹        |          |      | 中丹        |          |      | 丹後        |          |     | 京都府       |          |      |
|-----|-----------|----------|------|-----------|----------|------|-----------|----------|------|-----------|----------|-----|-----------|----------|------|
|     | 確認<br>ほ場率 | 発病<br>株率 | 発病度  | 確認<br>ほ場率 | 発病<br>株率 | 発病度  | 確認<br>ほ場率 | 発病<br>株率 | 発病度  | 確認<br>ほ場率 | 発病<br>株率 | 発病度 | 確認<br>ほ場率 | 発病<br>株率 | 発病度  |
| 3年  | 33.3      | 29.3     | 8.2  | 66.7      | 42.7     | 24.3 | 100.0     | 30.0     | 9.0  | 100.0     | 24.0     | 6.0 | 58.3      | 32.3     | 12.2 |
| 平年比 | 少         | やや多      | 並    | 並         | 多        | 多    | やや多       | やや多      | やや多  | やや多       | 多        | やや多 | やや少       | やや多      | やや多  |
| 平年  | 72.3      | 21.6     | 8.8  | 72.4      | 13.5     | 5.0  | 50.0      | 17.1     | 6.8  | 40.5      | 7.0      | 2.8 | 64.0      | 18.5     | 7.5  |
| 2年  | 50.0      | 28.7     | 8.2  | 100.0     | 38.0     | 16.5 | 0.0       | 0.0      | 0.0  | 0.0       | 0.0      | 0.0 | 38.5      | 19.1     | 6.3  |
| 元年  | 66.7      | 44.0     | 19.0 | —         | —        | —    | 100.0     | 80.0     | 27.0 | —         | —        | —   | 71.4      | 49.1     | 20.1 |
| 30年 | 80.0      | 15.2     | 6.8  | 85.7      | 8.0      | 2.6  | 100.0     | 12.0     | 4.0  | 33.3      | 14.7     | 6.3 | 76.5      | 11.8     | 4.6  |
| 29年 | 60.0      | 20.0     | 7.4  | 100.0     | 8.0      | 4.0  | 33.3      | 29.3     | 16.3 | 100.0     | 22.0     | 6.0 | 72.7      | 20.7     | 8.8  |
| 28年 | 60.0      | 24.0     | 11.0 | 66.7      | 9.3      | 2.7  | 100.0     | 16.0     | 5.5  | 100.0     | 4.0      | 3.0 | 72.7      | 19.6     | 8.7  |
| 27年 | 100.0     | 12.0     | 6.0  | 60.0      | 13.6     | 4.6  | 50.0      | 7.0      | 3.5  | 50.0      | 8.0      | 4.3 | 66.7      | 10.1     | 4.4  |
| 26年 | 83.3      | 28.0     | 11.5 | —         | —        | —    | 66.7      | 9.3      | 5.0  | 0.0       | 0.0      | 0.0 | 70.0      | 19.6     | 8.4  |
| 25年 | 83.3      | 15.3     | 6.3  | 0.0       | 0.0      | 0.0  | —         | —        | —    | —         | —        | —   | 50.0      | 9.2      | 3.8  |
| 24年 | 80.0      | 20.8     | 8.2  | 100.0     | 16.0     | 5.0  | 0.0       | 0.0      | 0.0  | —         | —        | —   | 75.0      | 17.0     | 6.4  |
| 23年 | 60.0      | 8.0      | 3.8  | 66.7      | 14.7     | 4.5  | 0.0       | 0.0      | 0.0  | 0.0       | 0.0      | 0.0 | 46.7      | 8.5      | 3.1  |

※詳細は表5参照。

表3 トビイロウンカ調査結果（9月第3～4半旬：本田25株見取り・払い落とし調査）

|     | 山城    |      |     |     | 南丹    |     |     |      | 中丹    |     |     |     | 丹後    |     |     |     | 京都府   |      |      |      |
|-----|-------|------|-----|-----|-------|-----|-----|------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|------|------|------|
|     | 確認ほ場率 | 長翅   | 短翅  | 幼虫  | 確認ほ場率 | 長翅  | 短翅  | 幼虫   | 確認ほ場率 | 長翅  | 短翅  | 幼虫  | 確認ほ場率 | 長翅  | 短翅  | 幼虫  | 確認ほ場率 | 長翅   | 短翅   | 幼虫   |
| 3年  | 0.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 平年比 | 並     | 並    | 並   | 並   | 並     | 並   | 並   | 並    | 並     | 並   | 並   | 並   | 並     | 並   | 並   | 並   | 並     | 並    | 並    | 並    |
| 平年  | 20.0  | 1.3  | 0.9 | 0.7 | 9.4   | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2  | 0.60 | 0.43 | 0.38 |
| 2年  | 100.0 | 12.0 | 8.8 | 6.2 | 50.0  | 0.5 | 1.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.8  | 5.6  | 4.2  | 2.8  |
| 元年  | 33.3  | 0.2  | 0.0 | 0.3 | —     | —   | —   | —    | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | —     | —   | —   | —   | 28.6  | 0.1  | 0.0  | 0.3  |
| 30年 | 0.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 29年 | 0.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 28年 | 0.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 27年 | 0.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 26年 | 0.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0 | —     | —   | —   | —    | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 25年 | 66.7  | 0.5  | 0.2 | 1.0 | 25.0  | 0.0 | 0.0 | 0.3  | —     | —   | —   | —   | —     | —   | —   | —   | 50.0  | 0.3  | 0.1  | 0.7  |
| 24年 | 0.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | —     | —   | —   | —   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 23年 | 0.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  |

※虫数は、1ほ場当たりの平均値。 詳細は表6参照。

表4 コブノメイガ調査結果（9月第3～4半旬：本田25株見取り調査）

|     | 山城    |      |      | 南丹    |      |      | 中丹    |      |      | 丹後    |      |      | 京都府   |      |      |
|-----|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|
|     | 確認ほ場率 | 被害株率 | 被害葉率 | 確認ほ場率 | 被害株率 | 被害葉率 | 確認ほ場率 | 被害株率 | 被害葉率 | 確認ほ場率 | 被害株率 | 被害葉率 | 確認ほ場率 | 被害株率 | 被害葉率 |
| 3年  | 0.0   | 0.0  | 0.00 | 0.0   | 0.0  | 0.00 | 0.0   | 0.0  | 0.00 | 0.0   | 0.0  | 0.00 | 0.0   | 0.0  | 0.00 |
| 平年比 | 並     | 並    | 並    | 並     | 並    | 並    | 並     | 並    | 並    | 並     | 並    | 並    | 並     | 並    | 並    |
| 平年  | 21.7  | 4.9  | 0.24 | 12.5  | 11.3 | 0.64 | 0.0   | 0.0  | 0.00 | 10.7  | 0.4  | 0.01 | 14.3  | 3.8  | 0.20 |
| 2年  | 50.0  | 33.3 | 1.20 | 100.0 | 90.0 | 5.15 | 0.0   | 0.0  | 0.00 | 50.0  | 2.0  | 0.05 | 53.8  | 29.5 | 1.35 |
| 元年  | 33.3  | 0.7  | 0.06 | —     | —    | —    | 0.0   | 0.0  | 0.00 | —     | —    | —    | 28.6  | 0.6  | 0.05 |
| 30年 | 0.0   | 0.0  | 0.00 | 0.0   | 0.0  | 0.00 | 0.0   | 0.0  | 0.00 | 0.0   | 0.0  | 0.00 | 0.0   | 0.0  | 0.00 |
| 29年 | 0.0   | 0.0  | 0.00 | 0.0   | 0.0  | 0.00 | 0.0   | 0.0  | 0.00 | 0.0   | 0.0  | 0.00 | 0.0   | 0.0  | 0.00 |
| 28年 | 40.0  | 2.4  | 0.08 | 0.0   | 0.0  | 0.00 | 0.0   | 0.0  | 0.00 | 0.0   | 0.0  | 0.00 | 18.2  | 1.1  | 0.03 |
| 27年 | 60.0  | 1.6  | 0.09 | 0.0   | 0.0  | 0.00 | 0.0   | 0.0  | 0.00 | 25.0  | 1.0  | 0.03 | 22.2  | 0.3  | 0.01 |
| 26年 | 0.0   | 0.0  | 0.00 | —     | —    | —    | 0.0   | 0.0  | 0.00 | 0.0   | 0.0  | 0.00 | 0.0   | 0.0  | 0.00 |
| 25年 | 33.3  | 11.3 | 0.93 | 0.0   | 0.0  | 0.00 | —     | —    | —    | —     | —    | —    | 20.0  | 6.8  | 0.56 |
| 24年 | 0.0   | 0.0  | 0.00 | 0.0   | 0.0  | 0.00 | 0.0   | 0.0  | 0.00 | —     | —    | —    | 0.0   | 0.0  | 0.00 |
| 23年 | 0.0   | 0.0  | 0.00 | 0.0   | 0.0  | 0.00 | 0.0   | 0.0  | 0.00 | 0.0   | 0.0  | 0.00 | 0.0   | 0.0  | 0.00 |

※上位2葉調査。 詳細は表6参照。

表5 水稲巡回調査結果 病害（9月第3～4半旬：25株見取り）

調査日：R3.9.14～17

| 地 点    | 穂いもち     |          |        | 紋枯病      |      |     |     |     |         |        | 白葉枯病     |         | その他<br>病害等 |         |
|--------|----------|----------|--------|----------|------|-----|-----|-----|---------|--------|----------|---------|------------|---------|
|        | 発病<br>株率 | 被害<br>割合 | 程<br>度 | 発病<br>株率 | 発病程度 |     |     |     | 発病<br>度 | 程<br>度 | 発病<br>株率 | 発病<br>度 |            |         |
|        |          |          |        |          | A    | B   | C   | D   |         |        |          |         |            |         |
| 京都市 1  | 8.0      | 0.40     | 少      | 24.0     | 0    | 0   | 0   | 6   | 6       | 少      | 0.0      | 0       |            |         |
| 京都市 2  | 0.0      | 0.00     | 無      | 0.0      | 0    | 0   | 0   | 0   | 0       | 無      | 0.0      | 0       |            |         |
| 久御山町   | 0.0      | 0.00     | 無      | 88.0     | 0    | 0   | 5   | 17  | 27      | 中      | 0.0      | 0       |            |         |
| 八幡市    | 0.0      | 0.00     | 無      | 0.0      | 0    | 0   | 0   | 0   | 0       | 無      | 0.0      | 0       |            |         |
| 精華町    | 0.0      | 0.00     | 無      | 0.0      | 0    | 0   | 0   | 0   | 0       | 無      | 0.0      | 0       |            |         |
| 木津川市   | 8.0      | 0.80     | 少      | 64.0     | 0    | 0   | 0   | 16  | 16      | 少      | 0.0      | 0       |            |         |
| 山城平均   | R3       | 2.7      | 0.200  |          | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 6.5     | 8.2    |          | 0.0     | 0.0        | 調査回数:6  |
|        | R2       | 0.7      | 0.002  | 少        | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.2     | 8.2    | 少        | 0.0     | 0.0        | 調査回数:6  |
| 亀岡市 1  | 100.0    | 32.2     | 多      | 100.0    | 8    | 5   | 4   | 8   | 63      | 多      | 0.0      | 0       |            |         |
| 亀岡市 2  |          |          |        |          |      |     |     |     |         |        |          |         | 刈取済        |         |
| 京都市 3  |          |          |        |          |      |     |     |     |         |        |          |         | 刈取済        |         |
| 南丹市 1  |          |          |        |          |      |     |     |     |         |        |          |         | 刈取済        |         |
| 南丹市 2  |          |          |        |          |      |     |     |     |         |        |          |         | 刈取済        |         |
| 南丹市 3  | 100.0    | 26.8     | 多      | 28.0     | 0    | 0   | 3   | 4   | 10      | 少      | 0.0      | 0       |            |         |
| 京丹波町 1 | 72.0     | 6.6      | 少      | 0.0      | 0    | 0   | 0   | 0   | 0       | 無      | 0.0      | 0       |            |         |
| 京丹波町 2 |          |          |        |          |      |     |     |     |         |        |          |         | 刈取済        |         |
| 京丹波町 3 |          |          |        |          |      |     |     |     |         |        |          |         | 刈取済        |         |
| 南丹平均   | R3       | 90.7     | 21.87  | 中        | 42.7 | 2.7 | 1.7 | 2.3 | 4.0     | 24.3   | 中        | 0.0     | 0.0        | 調査回数:3  |
|        | R2       | 0.0      | 0.00   | 無        | 38.0 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 4.0     | 16.5   | 少        | 0.0     | 0.0        | 調査回数:2  |
| 綾部市    |          |          |        |          |      |     |     |     |         |        |          |         | 刈取済        |         |
| 福知山市 1 |          |          |        |          |      |     |     |     |         |        |          |         | 刈取済        |         |
| 福知山市 2 |          |          |        |          |      |     |     |     |         |        |          |         | 刈取済        |         |
| 福知山市 3 |          |          |        |          |      |     |     |     |         |        |          |         | 刈取済        |         |
| 福知山市 4 | 0.0      | 0.0      | 無      | 8.0      | 0    | 0   | 0   | 2   | 2       | 少      | 0.0      | 0       |            |         |
| 舞鶴市    | 8.0      | 0.4      | 少      | 52.0     | 0    | 0   | 3   | 10  | 16      | 少      | 0.0      | 0       |            |         |
| 中丹平均   | R3       | 4.0      | 0.20   | 少        | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 6.0     | 9.0    | 少        | 0.0     | 0.0        | 調査回数:2  |
|        | R2       | 0.0      | 0.00   | 無        | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 0.0    | 無        | 0.0     | 0.0        | 調査回数:3  |
| 宮津市    |          |          |        |          |      |     |     |     |         |        |          |         | 刈取済        |         |
| 与謝野町   |          |          |        |          |      |     |     |     |         |        |          |         | 刈取済        |         |
| 伊根町    |          |          |        |          |      |     |     |     |         |        |          |         | 刈取済        |         |
| 京丹後市 1 |          |          |        |          |      |     |     |     |         |        |          |         | 刈取済        |         |
| 京丹後市 2 |          |          |        |          |      |     |     |     |         |        |          |         | 刈取済        |         |
| 京丹後市 3 | 4.0      | 0.2      | 少      | 24.0     | 0    | 0   | 0   | 6   | 6       | 少      | 0.0      | 0       |            |         |
| 京丹後市 4 |          |          |        |          |      |     |     |     |         |        |          |         | 刈取済        |         |
| 京丹後市 5 |          |          |        |          |      |     |     |     |         |        |          |         | 刈取済        |         |
| 京丹後市 6 |          |          |        |          |      |     |     |     |         |        |          |         | 刈取済        |         |
| 丹後平均   | R3       | 4.0      | 0.20   | 少        | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0     | 6.0    | 少        | 0.0     | 0.0        | 調査回数:1  |
|        | R2       | 34.0     | 3.70   | 少        | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 0.0    | 無        | 0.0     | 0.0        | 調査回数:2  |
| 府平均    | R3       | 25.0     | 5.62   | 少        | 32.3 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 5.8     | 12.2   | 少        | 0.0     | 0.0        | 調査回数:12 |
|        | R2       | 5.5      | 0.57   | 少        | 19.1 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 3.5     | 6.3    | 少        | 0.0     | 0.0        | 調査回数:13 |

表6 水稲巡回調査結果 虫害（9月第3～4半旬：25株見取り・払い落とし調査）

調査日：R3.9.14～17

| 地 点   | トビイロウンカ  |      |      |     |          |      | ニカメイガ    |     |          | コブノメイガ   |          |      | カミソリコガイ        |                | その他<br>害虫等 |          |
|-------|----------|------|------|-----|----------|------|----------|-----|----------|----------|----------|------|----------------|----------------|------------|----------|
|       | 寄生<br>株率 | 成虫   |      | 幼虫  | 合計<br>虫数 | 程度   | 被害<br>株率 | 程度  | 被害<br>差率 | 被害<br>株率 | 被害<br>葉率 | 程度   | 調査<br>株外<br>被害 | 25株<br>卵塊<br>数 |            | 周辺<br>卵塊 |
|       |          | 長翅   | 短翅   |     |          |      |          |     |          |          |          |      |                |                |            |          |
| 京都市1  | 0.0      | 0    | 0    | 0   | 0        | 無    | 0.0      | 無   | 0.0      | 0.0      | 0.00     | 無    |                | 0              |            |          |
| 京都市2  | 0.0      | 0    | 0    | 0   | 0        | 無    | 0.0      | 無   | 0.0      | 0.0      | 0.00     | 無    |                | 0              | ○          |          |
| 久御山町  | 0.0      | 0    | 0    | 0   | 0        | 無    | 0.0      | 無   | 0.0      | 0.0      | 0.00     | 無    |                | 0              | ○          |          |
| 八幡市   | 0.0      | 0    | 0    | 0   | 0        | 無    | 0.0      | 無   | 0.0      | 0.0      | 0.00     | 無    |                | 0              |            |          |
| 精華町   | 0.0      | 0    | 0    | 0   | 0        | 無    | 0.0      | 無   | 0.0      | 0.0      | 0.00     | 無    |                | 0              |            |          |
| 木津川市  | 0.0      | 0    | 0    | 0   | 0        | 無    | 0.0      | 無   | 0.0      | 0.0      | 0.00     | 無    |                | 0              |            |          |
| 山城平均  | R3       | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0      | 0.0  | 無        | 0.0 | 無        | 0.0      | 0.0      | 0.00 | 無              | 0/6            | 0.0        | 2/6      |
|       | R2       | 44.7 | 12.0 | 8.8 | 6.2      | 27.0 | 少        | 0.0 | 無        | 0.0      | 33.3     | 1.20 | 少              | 4/6            | 0.0        | 3/6      |
| 亀岡市1  | 0.0      | 0    | 0    | 0   | 0        | 無    | 0.0      | 無   | 0.0      | 0.0      | 0.00     | 無    |                | 0              | ○          |          |
| 亀岡市2  |          |      |      |     |          |      |          |     |          |          |          |      |                |                |            | 刈取済      |
| 京都市3  |          |      |      |     |          |      |          |     |          |          |          |      |                |                |            | 刈取済      |
| 南丹市1  |          |      |      |     |          |      |          |     |          |          |          |      |                |                |            | 刈取済      |
| 南丹市2  |          |      |      |     |          |      |          |     |          |          |          |      |                |                |            | 刈取済      |
| 南丹市3  | 0.0      | 0    | 0    | 0   | 0        | 無    | 0.0      | 無   | 0.0      | 0.0      | 0.00     | 無    |                | 0              | ○          |          |
| 京丹波町1 | 0.0      | 0    | 0    | 0   | 0        | 無    | 0.0      | 無   | 0.0      | 0.0      | 0.00     | 無    |                | 0              | ※6         |          |
| 京丹波町2 |          |      |      |     |          |      |          |     |          |          |          |      |                |                |            | 刈取済      |
| 京丹波町3 |          |      |      |     |          |      |          |     |          |          |          |      |                |                |            | 刈取済      |
| 南丹平均  | R3       | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0      | 0.0  | 無        | 0.0 | 無        | 0.0      | 0.0      | 0.00 | 無              | 0/3            | 0.0        | 2/3      |
|       | R2       | 4.0  | 0.5  | 1.0 | 0.0      | 1.5  | 少        | 0.0 | 無        | 0.0      | 90.0     | 5.15 | 中              | 2/2            | 0.0        | 0/2      |
| 綾部市   |          |      |      |     |          |      |          |     |          |          |          |      |                |                |            | 刈取済      |
| 福知山市1 |          |      |      |     |          |      |          |     |          |          |          |      |                |                |            | 刈取済      |
| 福知山市2 |          |      |      |     |          |      |          |     |          |          |          |      |                |                |            | 刈取済      |
| 福知山市3 |          |      |      |     |          |      |          |     |          |          |          |      |                |                |            | 刈取済      |
| 福知山市4 | 0.0      | 0    | 0    | 0   | 0        | 無    | 0.0      | 無   | 0.0      | 0.0      | 0.00     | 無    |                | 0              |            |          |
| 舞鶴市   | 0.0      | 0    | 0    | 0   | 0        | 無    | 0.0      | 無   | 0.0      | 0.0      | 0.00     | 無    |                | 0              |            |          |
| 中丹平均  | R3       | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0      | 0.0  | 無        | 0.0 | 無        | 0.0      | 0.0      | 0.00 | 無              | 0/2            | 0.0        | 0/2      |
|       | R2       | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0      | 0.0  | 無        | 0.0 | 無        | 0.0      | 0.0      | 0.00 | 無              | 0/3            | 0.0        | 0/3      |
| 宮津市   |          |      |      |     |          |      |          |     |          |          |          |      |                |                |            | 刈取済      |
| 与謝野町  |          |      |      |     |          |      |          |     |          |          |          |      |                |                |            | 刈取済      |
| 伊根町   |          |      |      |     |          |      |          |     |          |          |          |      |                |                |            | 刈取済      |
| 京丹後市1 |          |      |      |     |          |      |          |     |          |          |          |      |                |                |            | 刈取済      |
| 京丹後市2 |          |      |      |     |          |      |          |     |          |          |          |      |                |                |            | 刈取済      |
| 京丹後市3 | 0.0      | 0    | 0    | 0   | 0        | 無    | 0.0      | 無   | 0.0      | 0.0      | 0.00     | 無    |                | 0              |            |          |
| 京丹後市4 |          |      |      |     |          |      |          |     |          |          |          |      |                |                |            | 刈取済      |
| 京丹後市5 |          |      |      |     |          |      |          |     |          |          |          |      |                |                |            | 刈取済      |
| 京丹後市6 |          |      |      |     |          |      |          |     |          |          |          |      |                |                |            | 刈取済      |
| 丹後平均  | R3       | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0      | 0.0  | 無        | 0.0 | 無        | 0.0      | 0.0      | 0.00 | 無              | 0/1            | 0.0        | 0/1      |
|       | R2       | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0      | 0.0  | 無        | 2.0 | 少        | 0.1      | 2.0      | 0.05 | 少              | 1/2            | 0.0        | 1/2      |
| 府平均   | R3       | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0      | 0.0  | 無        | 0.0 | 無        | 0.0      | 0.0      | 0.00 | 無              | 0/12           | 0.0        | 0/12     |
|       | R2       | 21.2 | 5.6  | 4.2 | 2.8      | 12.7 | 無        | 0.3 | 無        | 0.0      | 29.5     | 1.35 | 少              | 1/13           | 0.0        | 3/13     |

1:ヒメビロウカ、2:セジロウカ、3:ツマグロヨコバイ、4:カモシカ、5:ミナアカムシ、6:イネアブラムシ

注) コブノメイガは上位2葉調査。

表7 水稲巡回調査結果 虫害②（9月第3～4半旬：本田20回振りすくい取り調査）

調査日：R3.9.14～17

| 地 点   | トビウカ |     |     |     | 斑点米カミシ類 |    |     | その他カミシ類 |    | コハネ<br>付コ | サ<br>サ<br>サ | その他                   |
|-------|------|-----|-----|-----|---------|----|-----|---------|----|-----------|-------------|-----------------------|
|       | 成虫   |     | 幼虫  | 計   | 種類      | 虫数 | 程度  | 種類      | 虫数 |           |             |                       |
|       | 長翅   | 短翅  |     |     |         |    |     |         |    |           |             |                       |
| 京都市1  | 0    | 0   | 0   | 0   | ホソハリ    | 1  | 少   |         | 0  | 0         | 1           | 1 A15L24、<br>3 A25L30 |
| 京都市2  | 0    | 0   | 0   | 0   | ミナミアオ   | 2  | 少   |         | 0  | 0         | 0           | 2 A1、3 A14、3 L6       |
| 久御山町  | 0    | 0   | 0   | 0   |         | 0  | 無   |         | 0  | 0         | 0           | 1 L1                  |
| 八幡市   | 0    | 0   | 0   | 0   | アカスジ    | 10 | 中   |         | 0  | 0         | 0           | 3 A10L5               |
| 精華町   | 0    | 0   | 0   | 0   |         | 0  | 無   |         | 0  | 0         | 0           |                       |
| 木津川市  | 0    | 0   | 0   | 0   |         | 0  | 無   |         | 0  | 2         | 3           | 3 L5                  |
| 山城平均  | R3   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0     |    | 2.2 | 少       |    | 0.0       | 0.3         | 0.7                   |
|       | R2   | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5     |    | 2.3 | 少       |    | 0.0       | 0.0         | 0.3                   |
| 亀岡市1  | 0    | 0   | 0   | 0   | イネ、クモヘリ | 2  | 少   |         | 0  | 1         | 0           | 1 A3、4 L3             |
| 亀岡市2  |      |     |     |     |         |    |     |         |    |           |             | 刈取済                   |
| 京都市3  |      |     |     |     |         |    |     |         |    |           |             | 刈取済                   |
| 南丹市1  |      |     |     |     |         |    |     |         |    |           |             | 刈取済                   |
| 南丹市2  |      |     |     |     |         |    |     |         |    |           |             | 刈取済                   |
| 南丹市3  | 0    | 0   | 0   | 0   |         | 0  | 無   |         | 0  | 1         | 0           | 1 L1、2 A1L1           |
| 京丹波町1 | 0    | 0   | 0   | 0   | イネ      | 1  | 少   |         | 0  | 2         | 1           | 1 A1L5、3 A1           |
| 京丹波町2 |      |     |     |     |         |    |     |         |    |           |             | 刈取済                   |
| 京丹波町3 |      |     |     |     |         |    |     |         |    |           |             | 刈取済                   |
| 南丹平均  | R3   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0     |    | 1.0 | 少       |    | 0.0       | 1.3         | 0.3                   |
|       | R2   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0     |    | 0.0 | 無       |    | 0.0       | 1.0         | 1.5                   |
| 綾部市   |      |     |     |     |         |    |     |         |    |           |             | 刈取済                   |
| 福知山市1 |      |     |     |     |         |    |     |         |    |           |             | 刈取済                   |
| 福知山市2 |      |     |     |     |         |    |     |         |    |           |             | 刈取済                   |
| 福知山市3 |      |     |     |     |         |    |     |         |    |           |             | 刈取済                   |
| 福知山市4 | 0    | 0   | 0   | 0   |         | 0  | 無   |         | 0  | 1         | 0           | 1 L1                  |
| 舞鶴市   | 0    | 0   | 0   | 0   |         | 0  | 無   |         | 0  | 4         | 13          | 1 A2、3 A4             |
| 中丹平均  | R3   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0     |    | 0.0 | 無       |    | 0.0       | 2.5         | 6.5                   |
|       | R2   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0     |    | 0.3 | 少       |    | 0.0       | 0.7         | 0.0                   |
| 宮津市   |      |     |     |     |         |    |     |         |    |           |             | 刈取済                   |
| 与謝野町  |      |     |     |     |         |    |     |         |    |           |             | 刈取済                   |
| 伊根町   |      |     |     |     |         |    |     |         |    |           |             | 刈取済                   |
| 京丹後市1 |      |     |     |     |         |    |     |         |    |           |             | 刈取済                   |
| 京丹後市2 |      |     |     |     |         |    |     |         |    |           |             | 刈取済                   |
| 京丹後市3 | 0    | 0   | 0   | 0   |         | 0  | 無   |         | 0  | 0         | 0           | 1 A1L5                |
| 京丹後市4 |      |     |     |     |         |    |     |         |    |           |             | 刈取済                   |
| 京丹後市5 |      |     |     |     |         |    |     |         |    |           |             | 刈取済                   |
| 京丹後市6 |      |     |     |     |         |    |     |         |    |           |             | 刈取済                   |
| 丹後平均  | R3   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0     |    | 0.0 | 無       |    | 0.0       | 0.0         | 0.0                   |
|       | R2   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0     |    | 4.0 | 中       |    | 0.0       | 2.0         | 0.5                   |
| 府平均   | R3   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0     |    | 1.3 | 少       |    | 0.0       | 0.9         | 1.5                   |
|       | R2   | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2     |    | 1.8 | 少       |    | 0.0       | 0.6         | 0.5                   |

1:ヒメトビウカ、2:セジロウカ、3:ツマクロヨコハ、4:コブノメガ

(種名のカミシ、カミカミは略)