

カブ

病害虫発生状況

- 1 ベと病 発生を認めなかった（平年比少）。
- 2 軟腐病 発生を認めなかった（平年並）。
- 3 黒斑病 発生を認めなかった（平年並）。
- 4 白斑病 平年並であった。
- 5 白さび病 発生を認めなかった（平年並）。
- 6 アブラムシ類 平年比やや少なかった。
- 7 コナガ 平年並であった。
- 8 ハモグリバエ類 平年比やや少なかった。
- 9 その他病害虫 発生を認めなかった。

カブ調査結果（25株調査：害虫個体数は10株換算）

調査日：令和4年11月16日

調査場所	ベと病	軟腐病	黒斑病	白斑病	白さび病	アブラムシ類			コナガ		ハモグリバエ類	
	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	有翅虫数 (／10株)	無翅虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	幼虫・蛹数 (／10株)	寄生株率 (%)	被害株率 (%)	
亀岡市①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	8.0	
亀岡市②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	8.0	
京丹後市弥栄町	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
京丹後市久美浜町	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.80	3.20	8.0	0.4	4.0	0.0	
平均	R4年	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.20	0.80	2.0	0.1	1.0	4.0
	平年(例年)比	少	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	平年(例年)	42.4	0.0	1.4	24.2	3.3	0.46	8.19	11.2	0.8	5.4	11.7
	R3年	46.0	0.0	3.0	40.0	0.0	1.90	24.80	34.0	0.0	0.0	3.0
	R2年	46.0	0.0	3.0	40.0	0.0	1.90	24.80	34.0	0.0	0.0	3.0
	R元年	45.3	0.0	6.7	36.0	29.3	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.3
	H30年	64.0	0.0	0.0	34.7	0.0	0.13	0.00	1.3	0.0	0.0	4.0
	H29年	50.0	0.0	0.0	44.0	0.0	0.00	0.20	1.0	2.5	17.0	13.0
	H28年	57.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	12.90	18.0	1.5	13.0	10.0
	H27年	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	3.4	23.0	43.0
	H26年	36.0	0.0	0.8	39.2	3.2	0.00	0.20	1.6	0.1	0.8	21.6
H25年	1.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.30	5.10	14.0	0.0	0.0	13.0	
H24年	29.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.40	13.90	8.0	0.0	0.0	1.0	
発生 ほ場率 (%)	R4年	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0			25.0	50.0	
	平年(例年)比	少	並	並	並	並	やや少			並	やや少	
	平年(例年)	54.3	0.0	12.8	44.7	7.8	54.8			19.5	68.8	
	R3年	50.0	0.0	25.0	50.0	0.0	100.0			0.0	50.0	
	R2年	50.0	0.0	25.0	50.0	0.0	100.0			0.0	50.0	
	R元年	66.7	0.0	33.3	100.0	33.3	0.0			0.0	66.7	
	H30年	66.7	0.0	0.0	66.7	0.0	33.3			0.0	66.7	
	H29年	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	25.0			75.0	75.0	
	H28年	75.0	0.0	0.0	0.0	25.0	100.0			50.0	100.0	
	H27年	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			50.0	100.0	
	H26年	60.0	0.0	20.0	80.0	20.0	40.0			20.0	80.0	
H25年	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	75.0			0.0	75.0		
H24年	50.0	0.0	25.0	25.0	0.0	75.0			0.0	25.0		