

カブ

病害虫発生状況

- 1 ベと病 平年並であった。
- 2 軟腐病 発生を認めなかった（平年並）。
- 3 黒斑病 発生を認めなかった（平年並）。
- 4 白斑病 平年並であった。
- 5 白さび病 発生を認めなかった（平年並）。
- 6 アブラムシ類 平年並であった。
- 7 コナガ 平年並であった。
- 8 ハモグリバエ類 平年比少なかった。
- 9 その他病害虫 オオタバコガの発生を亀岡市①で認めた。

カブ調査結果（25株調査：害虫個体数は10株換算）

調査日：令和5年11月16、17日

調査場所	べと病	軟腐病	黒斑病	白斑病	白さび病	アブラムシ類			コナガ		ハモグリバエ類	
	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	有翅虫数 (／10株)	無翅虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	幼虫・蛹数 (／10株)	寄生株率 (%)	被害株率 (%)	
亀岡市 ①	36.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.00	4.40	16.0	0.0	0.0	0.0	
亀岡市 ②	64.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.00	1.60	8.0	0.0	0.0	0.0	
京丹後市久美浜町	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	18.00	8.0	0.4	4.0	4.0	
平均	R5年	33.3	0.0	0.0	6.7	0.0	0.00	8.00	10.7	0.1	1.3	1.3
	平年(例年)比	やや少	並	並	並	並	並	並	並	並	並	少
	平年(例年)	39.5	0.0	1.3	24.6	3.3	0.44	6.88	10.6	0.8	5.5	12.0
	R4年	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.20	0.80	2.0	0.1	1.0	4.0
	R3年	46.0	0.0	3.0	40.0	0.0	1.90	24.80	34.0	0.0	0.0	3.0
	R2年	46.0	0.0	3.0	40.0	0.0	1.90	24.80	34.0	0.0	0.0	3.0
	R元年	45.3	0.0	6.7	36.0	29.3	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.3
	H30年	64.0	0.0	0.0	34.7	0.0	0.13	0.00	1.3	0.0	0.0	4.0
	H29年	50.0	0.0	0.0	44.0	0.0	0.00	0.20	1.0	2.5	17.0	13.0
	H28年	57.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	12.90	18.0	1.5	13.0	10.0
H27年	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	3.4	23.0	43.0	
H26年	36.0	0.0	0.8	39.2	3.2	0.00	0.20	1.6	0.1	0.8	21.6	
H25年	1.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.30	5.10	14.0	0.0	0.0	13.0	
発生 ほ場率 (%)	R5年	66.7	0.0	0.0	66.7	0.0		100.0		33.3		33.3
	平年(例年)比	やや多	並	並	やや多	並		やや多		並		少
	平年(例年)	49.3	0.0	10.3	44.7	7.8		49.8		22.0		71.3
	R4年	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0		25.0		25.0		50.0
	R3年	50.0	0.0	25.0	50.0	0.0		100.0		0.0		50.0
	R2年	50.0	0.0	25.0	50.0	0.0		100.0		0.0		50.0
	R元年	66.7	0.0	33.3	100.0	33.3		0.0		0.0		66.7
	H30年	66.7	0.0	0.0	66.7	0.0		33.3		0.0		66.7
	H29年	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0		25.0		75.0		75.0
	H28年	75.0	0.0	0.0	0.0	25.0		100.0		50.0		100.0
H27年	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		50.0		100.0	
H26年	60.0	0.0	20.0	80.0	20.0		40.0		20.0		80.0	
H25年	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0		75.0		0.0		75.0	