

カブ

病害虫発生状況

- 1 ベと病 平年並であった。
- 2 軟腐病 発生を認めなかった（平年並）。
- 3 黒斑病 平年比やや多かった。
- 4 白斑病 平年比やや多かった。
- 5 白さび病 発生を認めなかった（平年並）。
- 6 アブラムシ類 平年比やや少なかった。
- 7 コナガ 発生を認めなかった（平年並）。
- 8 ハモグリバエ類 発生を認めなかった（平年比やや少）。
- 9 その他の病害虫 ハスモンヨトウ、オオタバコガ、タバココナジラミの発生を右京区京北①で認め、ダイコンハムシの発生を久美浜町で認めた。

カブ調査結果（25株調査：害虫個体数は10株換算）

調査日：令和6年10月11、12日

調査場所	ベと病	軟腐病	黒斑病	白斑病	白さび病	アブラムシ類			コナガ		ハモグリバエ類	
	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	有翅虫数 (／10株)	無翅虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	幼虫・蛹数 (／10株)	寄生株率 (%)	被害株率 (%)	
京都市右京区京北 ①	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
京都市右京区京北 ②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
亀岡市 ①	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.40	0.00	4.0	0.0	0.0	0.0	
亀岡市 ②	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
京丹後市峰山町	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
京丹後市久美浜町	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
平均	R6年	26.4	0.0	1.6	0.8	0.08	0.00	0.8	0.0	0.0	0.0	
	平年比	並	並	やや多	やや多	並	少	やや少	並	並	並	
	平年	23.8	0.0	0.9	4.4	5.1	0.12	1.53	3.3	0.1	1.0	1.5
	R5年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
	R4年	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.60	1.3	0.0	0.0	0.0
	R3年	0.0	0.0	8.7	0.0	44.7	0.07	2.00	2.0	0.0	0.0	2.0
	R2年	6.7	0.0	0.0	1.3	0.0	0.30	0.20	4.7	0.0	0.0	0.0
	R元年	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.11	6.63	6.3	0.0	0.0	3.4
	H30年	38.4	0.0	0.0	42.4	0.0	0.24	0.32	4.8	0.1	0.8	4.8
	H29年	35.2	0.0	0.0	0.0	5.6	0.00	3.68	1.6	1.0	8.8	2.4
	H28年	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.30	1.70	8.0	0.0	0.0	0.0
H27年	48.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.20	0.20	4.0	0.0	0.0	0.7	
H26年	28.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.00	0.01	0.7	0.0	0.0	2.0	
発生 ほ場率 (%)	R6年	40.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0		0.0		0.0	
	平年比	並	並	多	やや多	並	並		並		やや少	
	平年	31.2	0.0	3.3	7.7	10.3	29.4		6.0		24.3	
	R5年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	
	R4年	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7		0.0		0.0	
	R3年	0.0	0.0	33.3	0.0	66.7	33.3		0.0		33.3	
	R2年	33.3	0.0	0.0	16.7	0.0	50.0		0.0		16.7	
	R元年	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6		0.0		42.9	
	H30年	40.0	0.0	0.0	60.0	0.0	20.0		20.0		40.0	
	H29年	60.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0		40.0		60.0	
	H28年	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0		0.0		0.0	
H27年	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3		0.0		16.7		
H26年	33.3	0.0	0.0	0.0	16.7	16.7		0.0		33.3		