

カブ

病害虫発生状況

- 1 ベと病 平年並であった。
- 2 軟腐病 発生を認めなかった（平年並）。
- 3 黒斑病 発生を認めなかった（平年並）。
- 4 白斑病 発生を認めなかった（平年比やや少）。
- 5 白さび病 発生を認めなかった（平年並）。
- 6 アブラムシ類 平年並であった。
- 7 コナガ 発生を認めなかった（平年比やや少）。
- 8 ハモグリバエ類 平年比やや少なかった。
- 9 その他病害虫 オオタバコガの発生を亀岡市①で認めた。ハスモンヨトウの発生を亀岡市②及び久美浜町で認めた。
ヨトウガ、ダイコンハムシの発生を久美浜町で認めた。

カブ調査結果（25株調査：害虫個体数は10株換算）

調査日：令和6年11月14日

調査場所	ベと病	軟腐病	黒斑病	白斑病	白さび病	アブラムシ類			コナガ		ハモグリバエ類	
	発病株率 (%)	有翅虫数 (／10株)	無翅虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	幼虫・蛹数 (／10株)	寄生株率 (%)	被害株率 (%)					
亀岡市 ①	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.40	4.0	0.0	0.0	0.0	
亀岡市 ②	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.40	4.0	0.0	0.0	8.0	
京丹後市久美浜町	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
平均	R6年	41.3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.27	2.7	0.0	0.0	2.7	
	平年比	並	並	並	やや少	並	並	並	やや少	やや少	やや少	
	平年	38.2	0.0	3.2	20.8	3.6	0.23	4.69	7.0	0.8	5.7	10.6
	R5年	33.3	0.0	0.0	6.7	0.0	0.00	8.00	10.7	0.1	1.3	1.3
	R4年	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.20	0.80	2.0	0.1	1.0	4.0
	R3年	0.0	0.0	22.0	1.0	3.0	0.10	0.00	1.0	0.2	1.0	1.0
	R2年	46.0	0.0	3.0	40.0	0.0	1.90	24.80	34.0	0.0	0.0	3.0
	R元年	45.3	0.0	6.7	36.0	29.3	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.3
	H30年	64.0	0.0	0.0	34.7	0.0	0.13	0.00	1.3	0.0	0.0	4.0
	H29年	50.0	0.0	0.0	44.0	0.0	0.00	0.20	1.0	2.5	17.0	13.0
H28年	57.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	12.90	18.0	1.5	13.0	10.0	
H27年	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	3.4	23.0	43.0	
H26年	36.0	0.0	0.8	39.2	3.2	0.00	0.20	1.6	0.1	0.8	21.6	
発生 ほ場率 (%)	R6年	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0		66.7		0.0	33.3	
	平年比	並	並	並	やや少	並		並		やや少	少	
	平年	48.5	0.0	12.8	46.3	12.8		44.8		27.8	64.7	
	R5年	66.7	0.0	0.0	66.7	0.0		100.0		33.3	33.3	
	R4年	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0		25.0		25.0	50.0	
	R3年	0.0	0.0	50.0	25.0	50.0		25.0		25.0	25.0	
	R2年	50.0	0.0	25.0	50.0	0.0		100.0		0.0	50.0	
	R元年	66.7	0.0	33.3	100.0	33.3		0.0		0.0	66.7	
	H30年	66.7	0.0	0.0	66.7	0.0		33.3		0.0	66.7	
	H29年	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0		25.0		75.0	75.0	
H28年	75.0	0.0	0.0	0.0	25.0		100.0		50.0	100.0		
H27年	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		50.0	100.0		
H26年	60.0	0.0	20.0	80.0	20.0		40.0		20.0	80.0		