

カブ

病害虫発生状況

- 1 ベと病 平年並であった。
 2 軟腐病 発生を認めなかった（平年並）。
 3 黒斑病 発生を認めなかった（平年並）。
 4 白斑病 平年並であった。
 5 白さび病 発生を認めなかった（平年並）。
 6 アブラムシ類 平年比やや多かった。
 7 コナガ 発生を認めなかった（平年並）。
 8 ハモグリバエ類 平年比やや少なかった。
 9 その他病害虫 オオタバコガ、ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウの発生を亀岡市②で認めた。

カブ調査結果（25株調査：害虫個体数は10株換算）

調査日：令和7年11月12、13日

調査場所	べと病	軟腐病	黒斑病	白斑病	白さび病	アブラムシ類			コナガ	ハモグリバエ類
	発病株率 (%)	有翅虫数 (/10株)	無翅虫数 (/10株)	寄生株率 (%)	幼虫・蛹数 (/10株)	寄生株率 (%)				
亀岡市①	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.40	27.60	28.0	0.0	0.0
〃 ②	92.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
京丹後市峰山町	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
京丹後市久美浜町	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	12.0
平均	R7年	48.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.10	6.90	7.0	0.0
	平年比	並	並	並	並	並	やや多	やや多	並	並
	平年	38.7	0.0	3.2	16.8	3.2	0.23	4.70	7.1	0.8
	R6年	41.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.27	2.7	0.0	0.0
	R5年	33.3	0.0	0.0	6.7	0.0	0.00	8.00	10.7	0.1
	R4年	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.20	0.80	2.0	0.1
	R3年	0.0	0.0	22.0	1.0	3.0	0.10	0.00	1.0	1.0
	R2年	46.0	0.0	3.0	40.0	0.0	1.90	24.80	34.0	0.0
	R元年	45.3	0.0	6.7	36.0	29.3	0.00	0.00	0.0	0.0
	H30年	64.0	0.0	0.0	34.7	0.0	0.13	0.00	1.3	0.0
	H29年	50.0	0.0	0.0	44.0	0.0	0.00	0.20	1.0	2.5
	H28年	57.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	12.90	18.0	1.5
	H27年	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	3.4
発生 ほ場率 (%)	R7年	50.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
	平年比	並	並	並	並	並	並	並	並	少
	平年	49.2	0.0	10.8	38.3	10.8	47.5	47.5	25.8	60.0
	R6年	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	66.7	0.0	33.3
	R5年	66.7	0.0	0.0	66.7	0.0	100.0	100.0	33.3	33.3
	R4年	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0	25.0	25.0	50.0
	R3年	0.0	0.0	50.0	25.0	50.0	25.0	25.0	25.0	25.0
	R2年	50.0	0.0	25.0	50.0	0.0	100.0	100.0	0.0	50.0
	R元年	66.7	0.0	33.3	100.0	33.3	0.0	0.0	0.0	66.7
	H30年	66.7	0.0	0.0	66.7	0.0	33.3	33.3	0.0	66.7
	H29年	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	25.0	25.0	75.0	75.0
	H28年	75.0	0.0	0.0	0.0	25.0	100.0	100.0	50.0	100.0
	H27年	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	100.0