

カキ

- ・うどんこ病の発生は、平年比やや多かった。
- ・炭そ病は、発生を認めなかった。
- ・カキクダアザミウマは、発生を認めなかった(平年並)。
- ・カイガラムシ類は、調査では発生を認めなかった(平年並)が調査外で3園とも発生を認めた。
- ・ハダニ類は発生を認めなかった(例年並)。
- ・ハマキムシ類は発生を認めなかった。
- ・カメムシ類は、発生を認めなかった(平年並)。
- ・その他病害虫は、3園とも枝にクワシロカイガラムシの発生を認めた。

発生程度別基準

病害虫名	調査項目	無	少	中	多	甚
うどんこ病、落葉病	発病葉率(%)	0	1~10	11~30	31~50	51以上
炭そ病	発病新梢(果)率(%)	0	1~2	3~5	6~10	11以上
チャノキイロアザミウマ カキクダアザミウマ ハマキムシ類 カメムシ類 カキノヘタムシガ カイガラムシ類	被害葉(果)率(%)	0	1~2	3~5	6~10	11以上
ハダニ類	寄生葉率(%)	0	1~15	16~30	31~45	46以上

カキ巡回調査結果(100葉、50果、50新梢調査)

令和元年6月13日

	うどんこ病		炭そ病		カキクダアザミウマ			カイガラムシ類		ハダニ類		カメムシ類		ハマキムシ類	
	発病葉率(%)	ほ場率(%)	発病新梢率(%)	ほ場率(%)	被害葉率(%)	被害果率(%)	ほ場率(%)	寄生果率(%)	ほ場率(%)	寄生葉率(%)	ほ場率(%)	寄生果率(%)	ほ場率(%)	寄生果率(%)	ほ場率(%)
京都市西京区 1	11.0		0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
” 2	23.0		0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
” 3	44.0		0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
元年	26.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年比	やや多	並	—	—	並	並	並	並	並	例年並	例年並	並	並	—	—
平 年	14.2	100.0	—	—	0.0	0.0	3.3	0.1	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—
30年	4.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29年	7.3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28年	17.7	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27年	11.3	100.0	—	—	0.0	0.0	0.0	0.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—
26年	28.0	100.0	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—
25年	44.3	100.0	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—
24年	7.0	100.0	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—
23年	2.0	100.0	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—
22年	10.0	100.0	—	—	0.3	0.0	33.3	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—
21年	10.3	100.0	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—