カンキツ

・そうか病、かいよう病、黒点病は、発生を認めなかった（平年並）。
・ハダニ類の発生は平年比やや多かった。
　①ではミカンハダニの甚発生を認めた。
・ヤノネカイガラムシは発生を認めなかった（平年並）。
・ミカンハモグリガの発生は平年比多かった。
・②でアブラムシ類の発生を認めた。
・その他の病害虫は発生を認めなかった。

発生程度別基準

	そうか病 かいよう病	黒点病	ミカンハダニ	ヤノネカイガラムシ		ミカンハモグリガ	アブラムシ類
	発病度	発病度	寄生葉率(%)	寄生葉率(%)	寄生果率(%)	寄生葉率(%)	寄生新梢率(%)
無	0	0	0	0	0	0	0
少	1～11	1～18	1～30	1～3	1～5	1～9	1～5
中	12～45	19～45	31～60	4～13	6～20	10～30	6～10
多	46～90	46～72	61～80	14～30	21～50	31～50	11～30
甚	91以上	73以上	81以上	31以上	51以上	51以上	31以上

カンキツ巡回調査結果（１００葉、５０果、５０新梢調査）　　調査日:令和2年7月15日

調査結果	そうか病			かいよう病			黒点病		ハダニ類		ヤノネカイガラムシ			ミカンハモグリガ		アブラムシ類	
	発病度		発生ほ場率（%）	発病度		発生ほ場率（%）	発病度	発生ほ場率（%）	寄生葉率（%）	発生ほ場率（%）	寄生葉率（%）	寄生果率（%）	発生ほ場率（%）	被害葉率（%）	発生ほ場率（%）	寄生新梢率（%）	発生ほ場率（%）
	葉	果実		葉	果実		果実										
宮津市　①	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		84.0		0.0	0.0		0.0		0.0	
〃　②	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		14.0		0.0	0.0		5.0		8.0	
〃　③	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		10.0		0.0	0.0		3.0		0.0	
Ｒ２年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	100.0	0.0	0.0	0.0	2.7	66.7	2.7	0.0
平年比	並	並	並	並	並	並	並	並	やや多	並	並	並	並	多	やや多	－	－
平　年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	63.3	0.0	0.2	3.3	0.7	30.0	－	－
Ｒ元年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	66.7	0.0	0.0	0.0	2.0	33.3	0.0	0.0
Ｈ３０年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.7	100.0	0.0	2.0	33.3	0.3	33.3	1.3	33.3
Ｈ２９年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ｈ２８年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	66.7	0.7	66.7
Ｈ２７年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.3	33.3	－	－
Ｈ２６年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－
Ｈ２５年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	33.3	0.0	0.0	0.0	3.3	100.0	－	－
Ｈ２４年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－
Ｈ２３年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.3	33.3	－	－
Ｈ２２年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－