

カンキツ

- ・そうか病、かいよう病は、発生を認めなかった（平年並）。
- ・ハダニ類は、2園で発生を認めた（平年並）。
- ・ヤノネカイガラムシは、②で発生を認めた（平年並）。
- ・ミカンハモグリガは、③で発生を認めた（平年比やや多い）。
- ・アブラムシ類は、発生を認めなかった。

カンキツ巡回調査結果（100葉、50新梢調査）

調査日：令和2年5月13日

調査結果	そうか病		かいよう病		ハダニ類		ヤノネカイガラムシ		ミカンハモグリガ		アブラムシ類	
	発病度	ほ場率 (%)	発病度	ほ場率 (%)	寄生葉率 (%)	ほ場率 (%)	寄生葉率 (%)	ほ場率 (%)	被害葉率 (%)	ほ場率 (%)	寄生新梢率 (%)	ほ場率 (%)
宮津市 ①	0.0		0.0		2.0		0.0		0.0		0.0	
” ②	0.0		0.0		0.0		1.0		0.0		0.0	
” ③	0.0		0.0		3.0		0.0		5.0		0.0	
R2年	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	66.7	0.3	33.3	1.7	33.3	0.0	0.0
平年比	並	並	並	並	並	並	並	並	やや多	並	-	-
平年	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	60.0	0.6	20.0	0.8	26.7	-	-
R元年	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7	66.7	3.0	66.7	0.0	0.0	4.0	100.0
H30年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	33.3
H29年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H28年	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	33.3	0.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
H27年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	33.3	0.0	0.0	0.3	33.3	-	-
H26年	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	100.0	0.0	0.0	1.7	66.7	-	-
H25年	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	33.3	0.3	33.3	0.3	33.3	-	-
H24年	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	100.0	0.0	0.0	2.7	33.3	-	-
H23年	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	100.0	0.0	0.0	0.7	33.3	-	-
H22年	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	100.0	2.0	66.7	2.0	66.7	-	-

発生程度別基準

	そうか病、かいよう病	ミカンハダニ	ヤノネカイガラムシ	ミカンハモグリガ	アブラムシ類
	発病度	寄生葉率 (%)	寄生葉率 (%)	寄生葉率 (%)	寄生新梢率 (%)
無	0	0	0	0	0
少	1~11	1~30	1~3	1~9	1~5
中	12~45	31~60	4~13	10~30	6~10
多	46~90	61~80	14~30	31~50	11~30
甚	91以上	81以上	31以上	51以上	31以上