

カンキツ

- ・そうか病は、1園で発生を認めた（平年比多い）。
- ・かいはよう病は、発生を認めなかった（平年並）。
- ・ハダニ類は、発生を認めなかった（平年比やや少ない）。
- ・ヤノネカイガラムシは発生を認めなかった（平年並）。
- ・ミカンハモグリガは、2園で発生を認めた（平年並）。
- ・その他の病害虫は、①で葉にミカントゲコナジラミ幼虫の発生を認めた。

カンキツ巡回調査結果（100葉調査）

調査日：令和4年4月13日

調査結果	そうか病		かいはよう病		ハダニ類		ヤノネカイガラムシ		ミカンハモグリガ	
	発病度	発生ほ場率 (%)	発病度	発生ほ場率 (%)	寄生葉率 (%)	発生ほ場率 (%)	寄生葉率 (%)	発生ほ場率 (%)	被害葉率 (%)	発生ほ場率 (%)
宮津市 ①	0.4	/	0.0	/	0.0	/	0.0	/	0.0	/
〃 ②	0.0	/	0.0	/	0.0	/	0.0	/	1.0	/
〃 ③	0.0	/	0.0	/	0.0	/	0.0	/	2.0	/
R4年	0.1	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	66.7
平年比	多	多	並	並	やや少	やや少	並	並	並	並
平年	0.01	3.3	0.0	0.0	2.2	36.7	1.3	28.3	1.7	40.0
R3年	0.1	33.3	0.0	0.0	2.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
R2年	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	33.3	0.3	66.7	0.0	0.0
R元年	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	66.7	0.0	0.0	5.3	66.7
H30年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
H29年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	50.0	3.5	100.0
H28年	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	66.7	9.3	100.0	3.3	100.0
H27年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H26年	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	100.0	0.0	0.0	3.0	66.7
H25年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	33.3
H24年	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	33.3	1.7	66.7	0.7	33.3

発生程度別基準

	そうか病、かいはよう病		ミカンハダニ	ヤノネカイガラムシ	ミカンハモグリガ
	発病度		寄生葉率 (%)	寄生葉率 (%)	寄生葉率 (%)
無	0		0	0	0
少	1～11		1～30	1～3	1～9
中	12～45		31～60	4～13	10～30
多	46～90		61～80	14～30	31～50
甚	91以上		81以上	31以上	51以上