カンキツ

・そうか病は平年比多い発生であった。

・かいよう病、黒点病は、発生を認めなかった（平年並）。

・ハダニ類は平年比やや少ない発生であった。

・ヤノネカイガラムシは発生を認めなかった（平年並）。

・ミカンハモグリガの発生は平年並であった。

・アブラムシ類は発生を認めなかった（例年並）。

・その他の病害虫は、③でアオバハゴロモ、イセリヤカイガラムシの発生を認めた。

発生程度別基準

	そうか病 かいよう病	黒点病	ミカンハダニ	ヤノネカイガラムシ		ミカンハモグリガ	アブラムシ類
	発病度	発病度	寄生葉率(%)	寄生葉率(%)	寄生果率(%)	寄生葉率(%)	寄生新梢率(%)
無	０	０	０	０	０	０	０
少	１～１１	１～１８	１～３０	１～３	１～５	１～９	１～５
中	１２～４５	１９～４５	３１～６０	４～１３	６～２０	１０～３０	６～１０
多	４６～９０	４６～７２	６１～８０	１４～３０	２１～５０	３１～５０	１１～３０
甚	９１以上	７３以上	８１以上	３１以上	５１以上	５１以上	３１以上

カンキツ巡回調査結果（１００葉、５０果、５０新梢調査）　　調査日:令和4年8月18日

調査結果	そうか病			かいよう病			黒点病		ハダニ類		ヤノネカイガラムシ			ミカンハモグリガ		アブラムシ類	
	発病度		発生ほ場率（%）	発病度		発生ほ場率（%）	発病度	発生ほ場率（%）	寄生葉率（%）	発生ほ場率（%）	寄生葉率（%）	寄生果率（%）	発生ほ場率（%）	被害葉率（%）	発生ほ場率（%）	寄生新梢率（%）	発生ほ場率（%）
	葉	果実		葉	果実		果実										
宮津市　①	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		1.0		0.0	0.0		1.0		0.0	
〃　②	0.0	0.4		0.0	0.0		0.0		2.0		0.0	0.0		0.0		0.0	
〃　③	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	
Ｒ４年	0.0	0.1	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.3	33.3	0.0	0.0
平年比（例年比）	並	多	多	並	並	並	並	並	やや少	並	並	並	並	並	並	（並）	（並）
平年（例年）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	56.7	0.0	0.2	3.3	1.1	43.3	(0.8)	(22.2)
Ｒ３年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	100.0	0.0	0.0
Ｒ２年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	100.0	0.0	0.0	0.0	2.7	66.7	2.7	33.3
Ｒ元年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	66.7	0.0	0.0	0.0	2.0	33.3	0.0	0.0
Ｈ３０年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.7	100.0	0.0	2.0	33.3	0.3	33.3	1.3	33.3
Ｈ２９年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ｈ２８年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	66.7	0.7	66.7
Ｈ２７年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.3	33.3	－	－
Ｈ２６年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－
Ｈ２５年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	33.3	0.0	0.0	0.0	3.3	100.0	－	－
Ｈ２４年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－