

カンキツ

- ・そうか病は、発生を認めなかった(平年並)。
- ・かいよう病は、発生を認めなかった(平年並)。
- ・ハダニ類は、発生を認めなかった(平年比やや少ない)。
- ・ヤノネカイガラムシは、発生を認めなかった(平年並)。
- ・ミカンハモグリガは、発生を認めなかった(平年並)。

カンキツ巡回調査結果(100葉調査)

調査日: 令和5年4月19日

調査結果	そうか病		かいよう病		ハダニ類		ヤノネカイガラムシ		ミカンハモグリガ	
	発病度	発生ほ場率(%)	発病度	発生ほ場率(%)	寄生葉率(%)	発生ほ場率(%)	寄生葉率(%)	発生ほ場率(%)	被害葉率(%)	発生ほ場率(%)
宮津市 ①	0.0	/	0.0	/	0.0	/	0.0	/	0.0	/
〃 ②	0.0	/	0.0	/	0.0	/	0.0	/	0.0	/
〃 ③	0.0	/	0.0	/	0.0	/	0.0	/	0.0	/
R5年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年比	並	並	並	並	やや少	やや少	並	並	並	並
平年	0.03	6.7	0.0	0.0	1.6	33.3	1.1	21.7	1.7	43.3
R4年	0.1	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	66.7
R3年	0.1	33.3	0.0	0.0	2.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
R2年	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	33.3	0.3	66.7	0.0	0.0
H31年	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	66.7	0.0	0.0	5.3	66.7
H30年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
H29年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	50.0	3.5	100.0
H28年	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	66.7	9.3	100.0	3.3	100.0
H27年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H26年	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	100.0	0.0	0.0	3.0	66.7
H25年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	33.3

発生程度別基準

	そうか病、かいよう病		ミカンハダニ	ヤノネカイガラムシ	ミカンハモグリガ
	発病度		寄生葉率(%)	寄生葉率(%)	寄生葉率(%)
無	0		0	0	0
少	1~11		1~30	1~3	1~9
中	12~45		31~60	4~13	10~30
多	46~90		61~80	14~30	31~50
甚	91以上		81以上	31以上	51以上