

キャベツ

病害虫発生状況

- 1 ベト病 発生を認めなかった(平年並)。
- 2 黒腐病 発生を認めなかった(平年並)。
- 3 菌核病 発生を認めなかった(平年並)。
- 4 アブラムシ類 年比やや多かった。
- 5 モンシロチョウ 発生を認めなかった(平年並)。
- 6 コナガ 年比やや多かった。
- 7 ハスモンヨトウ 発生を認めなかった(例年並)。
- 8 ヨトウガ 発生を認めなかった(例年並)。
- 9 ウワバ類 発生を認めなかった(平年並)。
- 10 アザミウマ類 年比やや多かった。
- 11 その他の病害虫 南区③でハモグリバエ類の被害を認めた。

発生程度別基準

	調査項目	無	少	中	多	甚
菌核病	発病株率(%)	0	1~10	11~20	21~35	36以上
モンシロチョウ	10株当たり幼虫数	0	1~5	6~20	21~40	41以上
コナガ	10株当たり幼虫・蛹数	0	1~10	11~40	41~100	101以上
ヨトウガ	卵・幼虫の寄生株率(%)	0	1~5	6~15	16~30	31以上
アブラムシ類	発生程度	0	1~12	13~25	26~37	38以上
ハスモンヨトウ	寄生株率(%)	0	1~5	6~15	16~30	31以上

※ アブラムシ類発生程度指数

$$\text{発生程度指数} = (4A + 3B + 2C + 1D) \times 25 / (\text{調査株数})$$

A : 201頭~、B : 51~200頭、C : 11~50頭、D : 1~10頭、E : 寄生なし

キャベツ巡回調査結果 (25株調査:害虫個体数は10株換算)

調査日:令和5年3月22日

調査場所	べと病	黒腐病	菌核病	アブラムシ類				モンシロチョウ		コナガ		ハスモンヨトウ			ヨトウガ			ウワバ類			アザミウマ類			
	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	有翅虫数 (/10株)	無翅虫数 (/10株)	発生程度指數	寄生株率 (%)	幼虫数 (/10株)	寄生株率 (%)	幼虫・蛹数 (/10株)	寄生株率 (%)	卵塊数 (/10株)	幼虫数 (/10株)	寄生株率 (%)	卵塊数 (/10株)	幼虫数 (/10株)	寄生株率 (%)	卵塊数 (/10株)	幼虫数 (/10株)	寄生株率 (%)	卵塊数 (/10株)	幼虫数 (/10株)	寄生株率 (%)	
京都市西京区①	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	1.0	4.0	0.0	0.0	0.4	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
京都市西京区②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
京都市南区①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	
京都市南区②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
京都市南区③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	8.0	
京都市南区④	0.0	0.0	0.0	1.2	5.6	7.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	16.0	
平均	R5年	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.3	4.7	0.0	0.0	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	4.7
	平年比	並	並	並	やや多	やや多	(やや多)	やや多	並	並	やや多	やや多	(並)	(並)	(並)	(並)	(並)	(並)	(並)	並	並	やや多	(やや多)	
	平年	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.8	2.2	0.0	0.0	0.03	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	1.6	2.5
	R4年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	R3年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.0	0.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
	R2年	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	1.2	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	H31年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0
	H30年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	H29年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	H28年	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	2.3	4.7	0.0	0.0	0.1	0.7	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	17.3
発生 ほ場率 (%)	H27年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	H26年	0.0	0.0	0.0	0.3	2.3	—	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	—
	H25年	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	—	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	—
	R5年	0.0	0.0	0.0	33.3				0.0		16.7		0.0			0.0			0.0				66.7	
	平年比	並	並	並	並				並		やや多		(並)			(並)			並				(やや多)	
	平年	0.0	0.0	1.7	29.0				0.0		6.7		0.0			0.0			0.0				19.2	
	R4年	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		25.0		0.0			0.0			0.0				0.0	
	R3年	0.0	0.0	0.0	25.0				0.0		25.0		0.0			0.0			0.0				25.0	
	R2年	0.0	0.0	0.0	40.0				0.0		0.0		0.0			0.0			0.0				0.0	
	H31年	0.0	0.0	0.0	33.3				0.0		0.0		0.0			0.0			0.0				83.3	
	H30年	0.0	0.0	0.0	25.0				0.0		0.0		0.0			0.0			0.0				0.0	
	H29年	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		—			—			0.0				0.0	
	H28年	0.0	0.0	0.0	66.7				0.0		16.7		—			—			0.0				50.0	
	H27年	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		—			—			0.0				0.0	
	H26年	0.0	0.0	0.0	66.7				0.0		0.0		—			—			0.0				16.7	
	H25年	0.0	0.0	16.7	33.3				0.0		0.0		—			—			0.0				16.7	