

キュウリ（露地）

病害虫発生状況

- 1 ベと病 平年並の発生であった。
- 2 うどんこ病 発生を認めなかった（平年並）。
- 3 斑点細菌病 平年比多い発生を認めた。
- 4 褐斑病 発生を認めなかった（例年並）。
- 5 モザイク病 発生を認めなかった（平年並）。
- 6 灰色かび病 発生を認めなかった（例年並）。
- 7 アブラムシ類 平年並の発生を認めた。
- 8 ハダニ類 平年比やや多い発生を認めた。
- 9 ハモグリバエ類 発生を認めなかった（平年並）。
- 10 アザミウマ類 平年比多い発生を認めた（主な発生種はミカンキイロアザミウマ）。
- 11 コナジラミ類 発生を認めなかった（平年並）。
- 12 ワタヘリクロノメイガ 発生を認めなかった。
- 13 その他の病害虫 ウワバ類幼虫（伏見区②）、ワタアブラムシのマミー（伏見区③）

発生程度別基準

調査項目	無	少	中	多	甚
ベと病 発病葉率(%)	0	1~25	26~50	51~75	76以上
うどんこ病 発病葉率(%)	0	1~25	26~50	51~75	76以上
斑点細菌病 発病葉率(%)	0	1~25	26~50	51~75	76以上
褐斑病 発病葉率(%)	0	1~5	6~25	26~50	51以上
モザイク病 発病株率(%)	0	1~20	21~40	41~70	71以上
灰色かび病 発病株率(%)	0	1~2	3~5	6~20	21以上
アブラムシ類 1葉当たり寄生虫数	0	1~10	11~50	51~200	201以上
ハダニ類 寄生葉率(%)	0	1~2	3~10	11~50	51以上
アザミウマ類 1葉当たり寄生虫数	0	1~25	26~50	51~75	76以上
コナジラミ類(成虫) 寄生葉率(%)	0	1~5	6~20	21~50	51以上

キュウリ巡回調査結果（25株の2葉、4果調査）

調査日：令和元年6月12日

調査場所	ベと病		うどんこ病		斑点細菌病		褐斑病		モザイク病	灰色かび病		アブラムシ類		ハダニ類		ハモグリバエ類		アザミウマ類		コナジラミ類		ワタヘリクロノメイガ	
	発病葉率(%)	発病株率(%)	発病葉率(%)	発病株率(%)	発病葉率(%)	発病株率(%)	発病葉率(%)	発病株率(%)	発病株率(%)	発病株率(%)	発病果率(%)	寄生虫数(葉)	寄生葉率(%)	寄生虫数(葉)	寄生葉率(%)	被害葉率(%)	被害株率(%)	寄生虫数(葉)	寄生葉率(%)	成虫数(葉)	寄生葉率(%)	寄生株率(%)	
伏見区①	0.0	0.0	0.0	0.0	86.0	92.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.34	6.0	0.0	0.0	53.64	100.0	0.00	0.0	0.0	
伏見区②	6.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.08	4.0	0.10	10.0	0.0	0.0	1.76	100.0	0.00	0.0	0.0	
伏見区③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.12	12.0	0.0	0.0	3.46	92.0	0.00	0.0	0.0	
伏見区④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.08	6.0	0.0	0.0	7.80	96.0	0.00	0.0	0.0	
平均	元年	1.5	5.0	0.0	0.0	21.5	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	1.0	0.16	8.5	0.0	0.0	16.67	97.0	0.00	0.0	0.0	
	平年比	並	並	並	並	多	多	並	並	並	並	並	並	やや多	多	並	並	多	多	並	並	—	
	平年	3.0	11.0	0.8	3.5	3.0	3.9	1.3	5.0	0.7	—	—	0.02	1.6	0.06	1.4	2.2	10.7	2.57	47.8	0.00	0.0	—
	30年	3.0	19.0	0.0	0.0	24.5	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04	2.0	0.01	1.0	1.5	6.0	8.03	52.0	0.00	0.0	0.0	
	29年	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	25.0	0.0	0.0	0.07	3.5	0.01	1.0	0.0	0.0	3.15	31.0	0.00	0.0	0.0	
	28年	0.0	0.0	1.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	1.5	0.47	6.0	0.0	0.0	2.18	60.5	0.00	0.0	—	
	27年	22.5	33.0	0.0	0.0	5.5	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	1.5	0.01	1.0	3.5	11.0	2.46	57.5	0.00	0.0	—	
	26年	3.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.05	1.5	0.07	3.5	6.0	36.0	1.43	39.5	0.00	0.0	—	
	25年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	—	—	0.00	0.0	0.01	1.3	0.7	5.3	4.51	96.7	0.00	0.0	—
	24年	0.0	0.0	2.0	6.0	0.0	0.0	—	—	0.0	—	—	0.00	0.0	0.00	0.0	7.5	33.0	0.58	24.5	0.00	0.0	—
23年	0.5	26.0	0.5	1.0	0.0	0.0	—	—	0.0	—	—	0.01	0.5	0.00	0.0	2.0	9.0	0.32	18.5	0.00	0.0	—	
22年	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	—	—	0.04	3.5	0.00	0.0	1.0	7.0	0.75	38.5	0.00	0.0	—	
21年	0.0	0.0	4.5	20.0	0.0	0.0	—	—	1.0	—	—	0.02	1.5	0.00	0.0	0.0	0.0	2.32	59.0	0.00	0.0	—	
発生 ほ場率 (%)	元年	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年比	並	並	やや多	並	並	並	—	並	並	—	並	多	並	並	並	並	並	並	並	並	—	
	平年	32.5	22.5	7.5	20.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	0.0	23.3	51.7	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	30年	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	25.0	50.0	50.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	
	29年	25.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	
	28年	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	—	
	27年	75.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0	25.0	75.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	—	
	26年	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	50.0	100.0	0.0	75.0	75.0	0.0	0.0	0.0	
	25年	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	0.0	—	—	0.0	0.0	33.3	66.7	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	
	24年	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	0.0	—	—	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	75.0	75.0	0.0	0.0	0.0	
23年	100.0	25.0	0.0	—	—	—	—	0.0	—	—	25.0	0.0	25.0	0.0	50.0	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0		
22年	25.0	0.0	0.0	—	—	—	—	0.0	—	—	50.0	0.0	50.0	0.0	75.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0		
21年	0.0	75.0	0.0	—	—	—	—	25.0	—	—	75.0	0.0	75.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0		