

キュウリ（施設）

病害虫発生状況

- 1 ベと病・・・・・・例年並の発生であった。
- 2 炭そ病・・・・・・発生を認めなかった（例年並）。
- 3 うどんこ病・・・・・・例年比少ない発生を認めた。
- 4 斑点細菌病・・・・・・発生を認めなかった（例年並）。
- 5 褐斑病・・・・・・例年並の発生を認めた。
- 6 モザイク病・・・・・・発生を認めなかった（例年並）。
- 7 灰色かび病・・・・・・発生を認めなかった。
- 8 アブラムシ類・・・・・・例年比やや多い発生を認めた。
- 9 ハダニ類・・・・・・発生を認めなかった（例年並）。
- 10 ハモグリバエ類・・・・・・例年比やや少ない発生を認めた。
- 11 アザミウマ類・・・・・・例年並の発生であった。
- 12 コナジラミ類・・・・・・例年比やや多い発生を認めた。
- 13 ハスモンヨトウ・・・・・・発生を認めなかった（例年並）。
- 14 ワタヘリクロノメイガ・発生を認めなかった。
- 15 その他の病害虫・・・・・・とくになし

発生程度別基準

	調査項目	無	少	中	多	甚
ベと病	発病葉率(%)	0	1~25	26~50	51~75	76以上
炭そ病	発病葉率(%)	0	1~25	26~50	51~75	76以上
うどんこ病	発病葉率(%)	0	1~25	26~50	51~75	76以上
斑点細菌病	発病葉率(%)	0	1~25	26~50	51~75	76以上
モザイク病	発病株率(%)	0	1~20	21~40	41~70	71以上
アブラムシ類	1葉当たり寄生虫数	0	1~10	11~50	51~200	201以上

キュウリ巡回調査結果（25株の2葉、4果調査）

調査日：平成30年11月15、16日

調査場所	ベと病		炭そ病		うどんこ病		斑点細菌病		褐斑病		モザイク病	灰色かび病		アブラムシ類		ハダニ類		ハモグリバエ類		アザミウマ類		コナジラミ類		ハスモンヨトウ		ワタヘリクロノメイガ	
	発病葉率(%)	発病株率(%)	発病株率(%)	発病葉率(%)	発病株率(%)	寄生虫数(果)	寄生率(%)	寄生虫数(葉)	寄生率(%)	被害率(%)	被害株率(%)	寄生虫数(果)	寄生率(%)	成虫数(葉)	寄生率(%)	寄生株率(%)	被害株率(%)	寄生株率(%)									
向島①	54.0	68.0	0.0	0.0	22.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	2.0	4.0	0.00	0.0	0.06	8.0	0.0	0.0	0.0
久御山①	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	100.0	0.0	0.0	2.0	4.0	0.0	0.0	0.0	1.48	10.0	0.00	0.0	2.0	24.0	0.00	0.0	0.52	20.0	0.0	0.0	0.0	
八幡①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.02	2.0	0.02	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平均	30年	18.0	22.7	0.0	0.0	34.0	60.0	0.0	0.0	0.7	1.3	0.0	0.0	0.49	3.3	0.00	0.0	1.3	9.3	0.01	0.7	0.20	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	例年比	並	並	並	並	少	少	並	並	並	並	—	—	やや多	多	並	並	少	やや少	並	並	やや多	やや多	並	並	—	
	例年	13.2	22.8	0.0	0.0	52.5	83.8	0.2	0.3	4.1	5.7	0.3	—	—	0.08	0.3	0.00	0.0	12.6	35.8	0.03	0.9	0.08	4.8	0.0	0.2	—
	29年	44.0	62.7	0.0	5.3	42.7	64.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.93	22.7	3.3	1.3	3.23	36.0	0.21	10.7	0.0	0.0	0.0	
	28年	3.3	34.7	0.0	0.0	37.3	73.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.00	0.00	0.00	0.0	1.3	16.0	0.00	0.07	6.7	0.0	0.0	0.0	
	27年	32.0	44.0	0.0	0.0	36.7	58.7	1.3	2.7	0.0	0.0	0.0	—	—	0.01	0.7	0.00	0.0	2.0	5.3	0.05	2.0	0.06	6.0	0.0	0.0	
	26年	22.7	25.3	0.0	0.0	78.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.00	0.0	0.00	0.0	26.0	66.7	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	
	25年	3.3	6.7	0.0	0.0	49.3	86.7	0.0	0.0	26.0	34.7	0.0	—	—	0.00	0.0	0.00	0.0	1.3	17.3	0.00	0.0	0.35	14.0	0.0	1.3	
	24年	30.0	42.7	0.0	0.0	40.0	88.0	0.0	0.0	0.7	2.7	0.0	—	—	0.00	0.0	0.00	0.0	8.0	37.3	0.00	0.0	0.03	2.0	0.0	0.0	
	23年	9.3	18.7	0.0	0.0	73.3	96.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	—	—	0.67	1.3	0.00	0.0	10.0	44.0	0.17	5.3	0.03	2.7	0.0	0.0	
	22年	2.0	5.3	0.0	0.0	36.7	77.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.00	0.0	0.00	0.0	5.3	22.7	0.00	0.0	0.09	6.7	0.0	0.0	
21年	2.7	5.3	0.0	0.0	68.7	90.7	0.0	0.0	6.0	8.0	0.0	—	—	0.00	0.0	0.00	0.0	46.7	77.3	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0		
発生 ほ場率 (%)	30年	33.3	—	0.0	—	66.7	—	0.0	—	33.3	—	0.0	—	—	33.3	—	0.0	—	66.7	—	33.3	—	100.0	—	0.0	0.0	0.0
	例年比	少	—	並	—	少	—	並	—	やや多	—	—	—	多	—	並	—	—	やや少	—	やや多	—	多	—	並	—	
	例年	75.0	—	0.0	—	100.0	—	8.3	—	16.7	—	4.2	—	—	4.2	—	0.0	—	91.7	—	8.3	—	33.3	—	0.0	—	
	29年	100.0	—	66.7	—	100.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.0	100.0	—	—	66.7	—	66.7	—	66.7	—	0.0	0.0	
	28年	66.7	—	0.0	—	100.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	—	100.0	—	0.0	—	33.3	—	0.0	0.0	
	27年	100.0	—	0.0	—	100.0	—	66.7	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	—	100.0	—	0.0	—	33.3	—	0.0	0.0	
	26年	33.3	—	0.0	—	100.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	—	66.7	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.0	
	25年	100.0	—	0.0	—	100.0	—	0.0	—	66.7	—	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	—	66.7	—	0.0	—	100.0	—	0.0	0.0	
	24年	66.7	—	0.0	—	100.0	—	0.0	—	33.3	—	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	—	100.0	—	0.0	—	33.3	—	0.0	0.0	
	23年	100.0	—	0.0	—	100.0	—	0.0	—	0.0	—	33.3	—	0.0	33.3	—	0.0	—	100.0	—	66.7	—	33.3	—	0.0	0.0	
	22年	66.7	—	0.0	—	100.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	—	100.0	—	0.0	—	33.3	—	0.0	0.0	
21年	66.7	—	0.0	—	100.0	—	0.0	—	33.3	—	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	—	100.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.0		