

ムギ

- 1 二条大麦では、うどんこ病の発生ほ場率66.7%で、赤かび病は発生を認めなかった。
- 2 小麦では、うどんこ病の発生を認めなかった。
- 3 その他の病害虫は、発生を認めなかった。
- 4 亀岡市①で穂に霜害の発生を認めた。

表1 二条大麦調査結果(令和2年4月15日)

	赤かび病		うどんこ病		
	発病穂率(%)	発病度	病斑面積率(%)	発病茎率(%)	
亀岡市①	0.0	0.0	1.6	100.0	
亀岡市②	0.0	0.0	0.9	56.0	
亀岡市③	0.0	0.0	1.5	88.0	
亀岡市④	0.0	0.0	0.6	44.0	
亀岡市⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	
亀岡市⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	
平均	2年	0.0	0.0	0.8	48.0
	平年比	-	-	-	-
	平均	-	-	-	0.0
	31年	0.0	0.0	0.0	0.0
	30年	0.0	0.0	0.0	0.0
	29年	0.0	0.0	0.0	0.0
	28年	-	-	-	-
	27年	-	-	-	-
	26年	-	-	-	-
	25年	-	-	-	-
確認ほ場率(%)	2年	0.0	-	66.7	-
	平年比	-	-	-	-
	平均	0.0	-	0.0	-
	31年	0.0	-	0.0	-
	30年	0.0	-	0.0	-
	29年	-	-	-	-
	28年	-	-	-	-
	27年	-	-	-	-
	26年	-	-	-	-
	25年	-	-	-	-
24年	-	-	-	-	
23年	-	-	-	0.0	
22年	-	-	-	0.0	

表2 小麦調査結果(令和2年4月14~16日)

	うどんこ病		
	病斑面積率(%)	発病茎率(%)	
福知山市①	0.0	0.0	
福知山市②	0.0	0.0	
福知山市③	0.0	0.0	
福知山市④	0.0	0.0	
福知山市⑤	0.0	0.0	
福知山市⑥	0.0	0.0	
綾部市①	0.0	0.0	
綾部市②	0.0	0.0	
南丹市①	0.0	0.0	
南丹市②	0.0	0.0	
平均	2年	0.0	0.0
	平年比	-	-
	平均	-	0.0
	31年	0.0	0.0
	30年	0.0	0.0
	29年	0.0	0.0
	28年	-	-
	27年	-	-
	26年	-	-
	25年	-	-
確認ほ場率(%)	2年	0.0	0.0
	平年比	-	-
	平均	0.0	0.0
	31年	0.0	0.0
	30年	0.0	0.0
	29年	-	-
	28年	-	-
	27年	-	-
	26年	-	-
	25年	-	-
24年	-	-	
23年	-	0.0	
22年	-	0.0	

(程度別基準)

	程度	無	少	中	多	甚
赤かび病	発病穂率(%)	0	1~40	41~60	61~80	81以上
うどんこ病	病斑面積率(%)	0	1~4	5~8	9~16	17以上