

ムギ

- 1 二条大麦では、うどんこ病及び赤かび病は発生を認めなかった。
- 2 小麦では、うどんこ病の発生を認めなかった。
- 3 小麦で黄斑症状を90%のほ場で認めた。
- 4 その他の病害虫は、発生を認めなかった。

表1 二条大麦調査結果(令和3年4月13日)

		赤かび病		うどんこ病	
		発病穂率 (%)	発病度	病斑面積率 (%)	発病茎率 (%)
亀岡市	①	0.0	0.0	0.0	0.0
	②	0.0	0.0	0.0	0.0
	③	0.0	0.0	0.0	0.0
	④	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑤	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑥	0.0	0.0	0.0	0.0
平均	R3年	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年比	-	-	-	-
	平均	0.0	0.0	0.2	9.6
	R2年	0.0	0.0	0.8	48.0
	R元年	0.0	0.0	0.0	0.0
	H30年	0.0	0.0	0.0	0.0
	H29年	0.0	0.0	0.0	0.0
	H28年	-	-	-	-
	H27年	-	-	-	-
	H26年	-	-	-	-
確認ほ場率 (%)	R3年		0.0		0.0
	平年比		-		-
	平均		0.0		13.3
	R2年		0.0		66.7
	R元年		0.0		0.0
	H30年		0.0		0.0
	H29年		0.0		0.0
	H28年		-		-
	H27年		-		-
	H26年		-		-
H25年		-		-	
H24年		-		-	
H23年		-		0.0	

表2 小麦調査結果(令和3年4月12~14日)

		うどんこ病		黄斑症状	
		病斑面積率 (%)	発病茎率 (%)	斑点面積率 (%)	被害茎率 (%)
福知山市	①	0.0	0.0	1.00	12.0
	②	0.0	0.0	0.00	0.0
	③	0.0	0.0	1.36	100.0
	④	0.0	0.0	1.08	92.0
	⑤	0.0	0.0	0.04	4.0
	⑥	0.0	0.0	0.08	8.0
綾部市	①	0.0	0.0	1.68	100.0
	②	0.0	0.0	1.16	100.0
南丹市	①	0.0	0.0	0.56	24.0
	②	0.0	0.0	0.16	16.0
平均	R3年	0.0	0.0	0.71	45.6
	平年比	-	-	-	-
	平均	0.0	0.0	0.00	0.0
	R2年	0.0	0.0	0.00	0.0
	R元年	0.0	0.0	-	-
	H30年	0.0	0.0	-	-
	H29年	0.0	0.0	-	-
	H28年	-	-	-	-
	H27年	-	-	-	-
	H26年	-	-	-	-
確認ほ場率 (%)	R3年		0.0		90.0
	平年比		-		-
	平均		0.0		0.0
	R2年		0.0		0.0
	R元年		0.0		-
	H30年		0.0		-
	H29年		0.0		-
	H28年		-		-
	H27年		-		-
	H26年		-		-
H25年		-		-	
H24年		-		-	
H23年		-		0.0	

(程度別基準)

	程度	無	少	中	多	甚
赤かび病	発病穂率(%)	0	1~40	41~60	61~80	81以上
うどんこ病	病斑面積率(%)	0	1~4	5~8	9~16	17以上