

ムギ

- 1 赤かび病は二条大麦、小麦において発生を認めなかった(平年並)。
- 2 うどんこ病の発生は、小麦では認めなかった。
- 3 その他の病害虫は、小麦で黄斑症状を80%のほ場で認めた。

表1 二条大麦調査結果(令和4年5月13日) 表2 小麦調査結果(令和4年5月16日)

		赤かび病		うどんこ病		黄斑症状			
		発病穂率(%)	発病度	発病穂率(%)	発病度	病斑面積率(%)	発病茎率(%)	斑点面積率(%)	被害茎率(%)
亀岡市①	②	0.0	0.0	0.0	0.0	29.2	100.0		
	③	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	100.0		
	④	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	96.0		
	⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	100.0		
	⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	綾部市①	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	100.0		
	南丹市①	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	100.0		
平	R4年	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	69.2		
均	平年比	並	並	(並)	(並)	-	-		
	平年	0.1	0.01	0.9	(4.6)	-	-		
	R3年	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	54.8		
	R2年	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	40.8		
	R元年	0.0	0.0	2.0	0.3	-	-		
	H30年	0.7	0.1	0.0	0.0	-	-		
	H29年	0.0	0.0	0.7	0.1	-	-		
	H28年	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-		
	H27年	0.0	0.0	0.4	0.1	-	-		
	H26年	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-		
	H25年	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-		
H24年	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-			
確認ほ場率	R4年		0.0		0.0		80.0		
	平年比		並		(並)		-		
	平年		1.7		8.3		-		
	R3年		0.0		0.0		100.0		
	R2年		0.0		0.0		83.3		
	R元年		0.0		30.0		50.0		
	H30年		16.7		0.0		-		
	H29年		0.0		16.7		0.0		
	H28年		0.0		0.0		0.0		
	H27年		0.0		10.0		-		
	H26年		0.0		0.0		-		
H25年		0.0		0.0		-			
H24年		0.0		0.0		-			

(程度別基準)

	程度	無	少	中	多	甚
赤かび病	発病穂率(%)	0	1~40	41~60	61~80	81以上
うどんこ病	病斑面積率(%)	0	1~4	5~8	9~16	17以上