

ムギ

- 1 二条大麦では、赤かび病及びうどんこ病は発生を認めなかった(例年並)。
- 2 小麦では、うどんこ病の発生を認めなかった(例年並)。
- 3 小麦で黄斑症状を100%のほ場で認めた。
- 4 その他の病害虫は、発生を認めなかった。

表1 二条大麦調査結果(令和5年4月18日)

		赤かび病		うどんこ病	
		発病穂率(%)	発病度	病斑面積率(%)	発病茎率(%)
亀岡市	①	0.0	0.0	0.0	0.0
"	②	0.0	0.0	0.0	0.0
"	③	0.0	0.0	0.0	0.0
"	④	0.0	0.0	0.0	0.0
"	⑤	0.0	0.0	0.0	0.0
"	⑥	0.0	0.0	0.0	0.0
平均	R5年	0.0	0.0	0.0	0.0
	例年比	並	並	並	並
	平均	0.0	0.0	0.1	8.0
	R4年	0.0	0.0	0.0	0.0
	R3年	0.0	0.0	0.0	0.0
	R2年	0.0	0.0	0.8	48.0
	H31年	0.0	0.0	0.0	0.0
	H30年	0.0	0.0	0.0	0.0
	H29年	0.0	0.0	0.0	0.0
	H28年	-	-	-	-
確認ほ場率(%)	R5年		0.0		0.0
	例年比		並		並
	平均		0.0		11.1
	R4年		0.0		0.0
	R3年		0.0		0.0
	R2年		0.0		66.7
	R元年		0.0		0.0
	H30年		0.0		0.0
	H29年		0.0		0.0
	H28年		-		-
H27年		-		-	
H26年		-		-	
H25年		-		-	

表2 小麦調査結果(令和5年4月17~19日)

		うどんこ病		黄斑症状	
		病斑面積率(%)	発病茎率(%)	斑点面積率(%)	被害茎率(%)
福知山市	①	0.0	0.0	0.76	76.0
"	②	0.0	0.0	0.84	84.0
"	③	0.0	0.0	0.96	100.0
"	④	0.0	0.0	1.00	100.0
"	⑤	0.0	0.0	1.84	60.0
"	⑥	0.0	0.0	0.20	24.0
綾部市	①	0.0	0.0	1.00	100.0
"	②	0.0	0.0	0.52	88.0
南丹市	①	0.0	0.0	0.08	92.0
"	②	0.0	0.0	0.28	28.0
平均	R5年	0.0	0.0	0.75	75.2
	例年比	並	並	-	-
	平均	0.0	0.0	2.52	36.4
	R4年	0.0	0.0	6.84	63.6
	R3年	0.0	0.0	0.7	45.6
	R2年	0.0	0.0	0.0	0.0
	H31年	0.0	0.0	-	-
	H30年	0.0	0.0	-	-
	H29年	0.0	0.0	-	-
	H28年	-	-	-	-
確認ほ場率(%)	R4年		0.0		100.0
	例年比		並		-
	平均		0.0		53.3
	R4年		0.0		70.0
	R3年		0.0		90.0
	R2年		0.0		0.0
	R元年		0.0		-
	H30年		0.0		-
	H29年		0.0		-
	H28年		-		-
H27年		-		-	
H26年		-		-	
H25年		-		-	

(程度別基準)

	程度	無	少	中	多	甚
赤かび病 発病穂率(%)		0	1~40	41~60	61~80	81以上
うどんこ病 病斑面積率(%)		0	1~4	5~8	9~16	17以上