

ムギ

病害虫等発生状況

二条大麦

- 1 赤かび病・・・発生を認めなかった（例年並）。
- 2 うどんこ病・・・発生を認めなかった（例年並）。
- 3 その他の病害虫・・・発生を認めなかった。

小麦

- 1 うどんこ病・・・発生を認めなかった（例年並）。
- 2 黄斑症状・・・100%のほ場で認めた。
- 3 その他の病害虫・・・発生を認めなかった。

表1 二条大麦調査結果(調査日:令和6年4月16日)

	赤かび病		うどんこ病		
	発病穂率 (%)	発病度	病斑面積率 (%)	発病莖率 (%)	
亀岡市①	0.0	0.0	0.0	0.0	
" ②	0.0	0.0	0.0	0.0	
" ③	0.0	0.0	0.0	0.0	
" ④	0.0	0.0	0.0	0.0	
" ⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	
" ⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	
平均	R6年	0.0	0.0	0.0	
	例年比	並	並	並	
	平均	0.0	0.0	0.1	6.9
	R5年	0.0	0.0	0.0	0.0
	R4年	0.0	0.0	0.0	0.0
	R3年	0.0	0.0	0.0	0.0
	R2年	0.0	0.0	0.8	48.0
	H31年	0.0	0.0	0.0	0.0
	H30年	0.0	0.0	0.0	0.0
	H29年	0.0	0.0	0.0	0.0
確認ほ場率 (%)	R6年		0.0	0.0	
	例年比		並	並	
	平均		0.0	9.5	
	R5年		0.0	0.0	
	R4年		0.0	0.0	
	R3年		0.0	0.0	
	R2年		0.0	66.7	
	R元年		0.0	0.0	
	H30年		0.0	0.0	
	H29年		0.0	0.0	
H28年		-	-	-	
H27年		-	-	-	
H26年		-	-	-	

表2 小麦調査結果(調査日:令和6年4月16日)

	うどんこ病		黄斑症状		
	病斑面積率 (%)	発病莖率 (%)	斑点面積率 (%)	被害莖率 (%)	
福知山市 ①	0.0	0.0	0.68	68.0	
" ②	0.0	0.0	1.12	64.0	
" ③	0.0	0.0	0.16	16.0	
" ④	0.0	0.0	0.64	64.0	
" ⑤	0.0	0.0	0.20	20.0	
" ⑥	0.0	0.0	0.40	40.0	
綾部市 ①	0.0	0.0	13.20	100.0	
" ②	0.0	0.0	17.20	100.0	
平均	R6年	0.0	0.0	4.20	
	例年比	並	並	-	
	平均	0.0	0.0	2.11	47.1
	R5年	0.0	0.0	0.89	79.0
	R4年	0.0	0.0	6.84	63.6
	R3年	0.0	0.0	0.71	45.6
	R2年	0.0	0.0	0.00	0.0
	H31年	0.0	0.0	-	-
	H30年	0.0	0.0	-	-
	H29年	0.0	0.0	-	-
確認ほ場率 (%)	R6年		0.0	100.0	
	例年比		並	-	
	平均		0.0	65.0	
	R5年		0.0	100.0	
	R4年		0.0	70.0	
	R3年		0.0	90.0	
	R2年		0.0	0.0	
	R元年		0.0	-	
	H30年		0.0	-	
	H29年		0.0	-	
H28年		-	-		
H27年		-	-		
H26年		-	-		

(程度別基準)

	程度	無	少	中	多	甚
赤かび病	発病穂率 (%)	0	1~40	41~60	61~80	81以上
うどんこ病	病斑面積率 (%)	0	1~4	5~8	9~16	17以上