

ナシ

発生程度別基準

(%)

	黒斑病	黒星病	赤星病	うどんこ病	ハダニ類	アブラムシ類	ハマキムシ類	カメモシ類・シンクイムシ類
	発病葉率	発病葉率	発病葉率	発病葉率	寄生葉率	寄生新梢率	被害新梢率	被害果率
無	0	0	0	0	0	0	0	0
少	1~5	1~5	1~5	1~5	1~15	1~5	1~2	1~2
中	6~15	6~15	6~15	6~15	16~30	6~15	3~5	3~5
多	16~30	16~30	16~30	16~30	31~45	16~30	6~10	6~10
甚	31以上	31以上	31以上	31以上	46以上	31以上	11以上	11以上

- ・黒斑病は、平年比やや多かった。
- ・黒星病は、平年並であった。
- ・赤星病は、八幡市1、2で発生を認め、平年比やや多かった。
- ・うどんこ病は、発生を認めなかった(平年並)。
- ・ハダニ類は、発生を認めなかった(平年比少ない)。
- ・アブラムシ類は発生を認めた。
- ・ハマキムシ類は、発生を認めなかった。
- ・カメモシ類は、網野町3で発生を認め、平年比やや多かった。
- ・シンクイムシ類は、発生を認めなかった(平年並)。
- ・その他の病害虫は、八幡市1でヨトウの卵塊を認めた。

ナシ巡回調査結果(100葉、50果、50新梢調査)

(単位: %) 令和元年6月11、14日

調査結果	種類*	黒斑病		黒星病		赤星病		うどんこ病		ハダニ類		アブラムシ類		ハマキムシ類		カメモシ類		シンクイムシ類	
		発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	寄生葉率	ほ場率	寄生新梢率	ほ場率	被害新梢率	ほ場率	被害果率	ほ場率	被害果率	ほ場率
京丹後市久美浜町1	青	1.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-	
〃 2	〃	1.0				0.0		0.0		0.0		24.0		0.0		-		-	
〃 3	〃	8.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-	
京丹後市網野町1	〃	1.0				0.0		0.0		0.0		12.0		0.0		0.0		0.0	
〃 2	〃	10.0				0.0		0.0		0.0		8.0		0.0		0.0		0.0	
〃 3	赤			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.0		0.0	
京丹後市久美浜町4	〃			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
〃 5	〃			14.0		0.0		0.0		0.0		2.0		0.0		-		-	
八幡市1	〃			0.0		9.0		0.0		0.0		2.0		0.0		0.0		0.0	
〃 2	〃			0.0		7.0		0.0		0.0		2.0		0.0		0.0		0.0	
京丹後市久美浜町6	ゴ	(1.0)		(3.0)		0.0		0.0		0.0		2.0		0.0					
元年		4.2	100.0	2.8	20.0	1.5	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	63.6	0.0	0.0	0.3	16.7	0.0	0.0
平年比		やや多	多	並	並	やや多	並	並	並	少	少	-	-	-	-	やや多	やや多	並	並
平年		2.2	50.3	2.2	28.3	0.7	29.8	0.0	1.7	3.5	44.0	-	-	-	-	0.2	4.0	0.0	0.0
30年		4.6	80.0	4.0	40.0	1.7	63.6	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	45.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29年		0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	63.6	13.5	72.7	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0
28年		3.8	40.0	1.8	40.0	0.0	9.1	0.1	9.1	1.2	27.3	4.9	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27年		2.7	50.0	8.2	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	50.0	-	-	-	-	1.6	40.0	0.0	0.0
26年		4.5	66.7	0.2	20.0	0.3	16.7	0.1	8.3	0.4	8.3	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
25年		0.8	20.0	0.0	0.0	1.5	41.7	0.0	0.0	4.9	41.7	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
24年		2.2	80.0	0.0	0.0	1.2	45.5	0.0	0.0	2.2	54.5	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
23年		2.2	100.0	4.0	50.0	1.4	71.4	0.0	0.0	6.9	57.1	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
22年		0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	12.5	0.0	0.0	6.1	62.5	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
21年		1.2	66.7	4.0	33.3	0.6	37.5	0.0	0.0	7.1	75.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0

\*青: 二十世紀、赤: 幸水、豊水等、ゴ: ゴールド二十世紀、黒斑病及び黒星病の発病葉率(数字)は平均値の計算に含めていない。