

ナシ

- ・黒斑病は、平年比やや少なかった。
- ・黒星病は、平年比やや多かった。
- ・赤星病は、平年並であった。
- ・うどんこ病は、平年比やや少なかった。
- ・ハダニ類は、平年並であった。
- ・その他の病害虫：炭疽病の発生ほ場率73%であった。

ナシ巡回調査結果（100葉調査）

（単位：％）

調査日：令和元年9月18、19日

調査ほ場	種類*	黒斑病		黒星病		赤星病		うどんこ病		ハダニ類	
		発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	寄生葉率	ほ場率
京丹後市久美浜町①	青	8.0		0.0		0.0		1.0		0.0	
" ②	青	7.0		42.0		0.0		0.0		6.0	
" ③	青	1.0		0.0		0.0		5.0		7.0	
京丹後市網野町 ①	青	5.0		0.0		0.0		4.0		1.0	
" ②	青	6.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
" ③	赤			5.0		0.0		0.0		0.0	
京丹後市久美浜町④	赤			0.0		0.0		4.0		2.0	
" ⑤	赤			12.0		0.0		0.0		3.0	
八幡市 ①	赤			0.0		2.0		0.0		41.0	
" ②	赤			0.0		0.0		0.0		35.0	
京丹後市久美浜町⑥	ゴ	1.0				1.0		27.0		7.0	
元 年		5.4	100.0	3.4	40.0	0.3		3.7		9.3	
平 年 比		やや少	並	やや多	並	並	並	やや少	並	並	並
平 年		10.9	88.0	1.8	31.2	0.2	12.4	8.3	41.1	8.8	54.7
30年		7.8	60.0	1.8	60.0	0.4	27.3	9.5	45.5	0.0	0.0
29年		13.2	100.0	7.4	40.0	0.0	0.0	11.3	54.5	7.9	54.5
28年		7.8	80.0	4.8	60.0	0.1	9.1	12.0	54.5	5.8	72.7
27年		29.6	100.0	2.4	60.0	0.0	0.0	17.6	36.4	2.0	63.6
26年		8.2	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	50.0	18.4	83.3
25年		20.0	100.0	0.0	0.0	0.3	16.7	8.7	33.3	0.5	16.7
24年		5.6	80.0	0.3	25.0	0.6	45.5	0.9	36.4	2.8	18.2
23年		7.8	60.0	0.0	0.0	0.3	12.5	2.4	25.0	17.9	87.5
22年		5.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	12.5	1.5	50.0
21年		3.8	100.0	1.0	66.7	0.4	12.5	5.8	62.5	31.0	100.0

*青：二十世紀、赤：幸水、豊水等、ゴ：ゴールド二十世紀

発生程度別基準

(%)

	黒斑病	黒星病	赤星病	ハダニ類
	発病葉率	発病葉率	発病葉率	寄生葉率
無	0	0	0	0
少	1～5	1～5	1～5	1～15
中	6～15	6～15	6～15	16～30
多	16～30	16～30	16～30	31～45
甚	31以上	31以上	31以上	46以上