

# 果樹の病害虫

## ナシ

- ・黒斑病は、平年比やや多かった。
- ・黒星病は、平年比やや多かった。
- ・赤星病は、平年並の発生であった。久美浜町①の調査外でも発生を認めた。
- ・うどんこ病は、平年比やや少なかった。
- ・ハダニ類は、平年比やや少なかった。
- ・その他の病害虫：網野町②の調査外でイラガ幼虫の発生を認めた。

ナシ巡回調査結果（100葉調査）

（単位：％）

調査日：令和2年9月15、16日

調査ほ場	種類*	黒斑病		黒星病		赤星病		うどんこ病		ハダニ類	
		発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	寄生葉率	ほ場率
京丹後市久美浜町①	青	4.0				0.0		1.0		2.0	
"    ②	"	7.0				0.0		6.0		0.0	
"    ③	"	17.0				0.0		4.0		0.0	
京丹後市網野町 ①	"	8.0				0.0		0.0		0.0	
"    ②	"	19.0				0.0		2.0		7.0	
"    ③	赤			0.0		0.0		0.0		0.0	
京丹後市久美浜町④	"			0.0		0.0		1.0		0.0	
"    ⑤	"			25.0		0.0		0.0		3.0	
八幡市 ①	"			0.0		0.0		0.0		0.0	
"    ②	"			0.0		0.0		0.0		3.0	
京丹後市久美浜町⑥	ゴ	4.0				1.0		0.0		3.0	
R2年		11.0	100.0	5.0	20.0	0.1	18.2	1.3	45.5	1.6	45.5
平年比		やや多	並	やや多	並	並	やや多	やや少	並	やや少	並
平年		11.0	88.0	2.0	28.5	0.2	12.9	8.1	39.4	6.6	51.9
R元年		5.4	100.0	3.4	40.0	0.3	18.2	3.7	45.5	9.3	72.7
H30年		7.8	60.0	1.8	60.0	0.4	27.3	9.5	45.5	0.0	0.0
H29年		13.2	100.0	7.4	40.0	0.0	0.0	11.3	54.5	7.9	54.5
H28年		7.8	80.0	4.8	60.0	0.1	9.1	12.0	54.5	5.8	72.7
H27年		29.6	100.0	2.4	60.0	0.0	0.0	17.6	36.4	2.0	63.6
H26年		8.2	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	50.0	18.4	83.3
H25年		20.0	100.0	0.0	0.0	0.3	16.7	8.7	33.3	0.5	16.7
H24年		5.6	80.0	0.3	25.0	0.6	45.5	0.9	36.4	2.8	18.2
H23年		7.8	60.0	0.0	0.0	0.3	12.5	2.4	25.0	17.9	87.5
H22年		5.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	12.5	1.5	50.0

\*青：二十世紀、赤：幸水、豊水等、ゴ：ゴールド二十世紀

発生程度別基準

(%)

	黒斑病	黒星病	赤星病	ハダニ類
	発病葉率	発病葉率	発病葉率	寄生葉率
無	0	0	0	0
少	1～5	1～5	1～5	1～15
中	6～15	6～15	6～15	16～30
多	16～30	16～30	16～30	31～45
甚	31以上	31以上	31以上	46以上