

果樹の病害虫

ナシ

発生程度別基準

(%)

	黒斑病	黒星病	赤星病	うどんこ病	ハダニ類	アブラムシ類	ハマキムシ類	カメムシ類 シンクイムシ類 カイガラムシ類
	発病葉率	発病葉率	発病葉率	発病葉率	寄生葉率	寄生新梢率	被害新梢率	被害果率
無	0	0	0	0	0	0	0	0
少	1~5	1~5	1~5	1~5	1~15	1~5	1~2	1~2
中	6~15	6~15	6~15	6~15	16~30	6~15	3~5	3~5
多	16~30	16~30	16~30	16~30	31~45	16~30	6~10	6~10
甚	31以上	31以上	31以上	31以上	46以上	31以上	11以上	11以上

- ・黒斑病は平年比やや多い発生であった。
- ・黒星病は平年比多い発生であった。
- ・赤星病は平年比やや多い発生であった。
- ・うどんこ病は発生を認めなかった(平年比少)。
- ・ハダニ類は平年比やや少ない発生であった。
- ・アブラムシ類は発生を認めなかった(例年並)。
- ・ハマキムシ類は発生を認めなかった(例年並)。
- ・シンクイムシ類は発生を認めなかった(平年並)。
- ・カイガラムシ類は発生を認めなかった。

ナシ巡回調査結果(100葉調査)

調査: 令和5年8月16日

(%)

調査結果	種類*	黒斑病		黒星病		赤星病		うどんこ病		ハダニ類		アブラムシ類		ハマキムシ類		シンクイムシ類		カイガラムシ類		備考
		発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	寄生葉率	ほ場率	寄生新梢率	ほ場率	被害新梢率	ほ場率	被害果率	ほ場率	被害果率	ほ場率	
京丹後市久美浜町①	二十	8.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-		
〃 ②	〃	10.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-		
〃 ③	〃	45.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-		
京丹後市網野町 ①	〃	10.0				1.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-		
〃 ②	〃	8.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-		
〃 ③	赤			2.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-		
京丹後市久美浜町④	〃			1.0		1.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-		
〃 ⑤	〃			61.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-		
八幡市 ③	〃			0.0		1.0		0.0		1.0		0.0		0.0		-		-		調査外で黒星病の発生を認めた。
〃 ④	〃			4.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
京丹後市久美浜町⑥	ゴ	7.0				0.0		0.0		1.0		0.0		0.0		-		-		
R5年		16.2	100.0	13.6	100.0	0.3	27.3	0.0	0.0	0.2	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年比(例年比)		多	並	多	やや多	やや多	やや多	少	少	やや少	やや少	(並)	(並)	(並)	(並)	並	並	-	-	
平年(例年)		7.1	90.3	3.6	36.0	0.2	12.5	2.8	25.8	10.5	58.0	(0.0)	(2.6)	(0.0)	(0.0)	0.0	1.8	-	-	
R4年		15.4	100.0	12.0	20.0	0.1	9.1	0.1	9.1	0.4	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
R3年		5.8	100.0	5.4	80.0	0.1	9.1	0.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
R2年		10.4	100.0	4.4	40.0	0.2	18.2	0.6	45.5	0.4	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
R元年		3.2	80.0	4.2	80.0	0.8	27.3	0.5	18.2	12.5	90.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
H30年		10.8	100.0	4.4	60.0	0.3	27.3	5.7	27.3	15.5	72.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
H29年		5.6	100.0	3.0	20.0	0.0	0.0	1.9	27.3	13.5	54.5	0.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
H28年		5.2	80.0	1.0	20.0	0.2	9.1	2.8	27.3	13.0	100.0	0.2	9.1	0.0	0.0	0.4	18.2	-	-	
H27年		3.0	60.0	1.2	40.0	0.0	0.0	5.1	27.3	22.4	81.8	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	
H26年		8.2	83.3	0.0	0.0	0.2	16.7	7.0	25.0	8.3	50.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	
H25年		3.8	100.0	0.0	0.0	0.2	8.3	4.6	41.7	19.0	75.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	

*二十: 二十世紀、赤: 幸水、豊水等、ゴ: ゴールド二十世紀

*黒斑病の発病葉率及び発生ほ場率は二十世紀のみで算出し、ゴールド二十世紀は含めていない。