

果樹の病害虫

ナシ

- 1 黒斑病・・・平年並であった。
- 2 黒星病・・・平年比やや少なかった。
- 3 赤星病・・・発生を認めなかった(平年比やや少)。
- 4 ハダニ類・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 5 アブラムシ類・・・発生を認めなかった(例年比やや少)。
- 6 ハマキムシ類・・・発生を認めなかった(例年並)。
- 7 カメムシ類・・・被害果を認めなかった(平年並)。
- 8 シンクイムシ類・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 9 カイガラムシ類・・・発生を認めなかった。

発生程度別基準

(%)

| | 黒斑病 | 黒星病 | 赤星病 | ハダニ類 | アブラムシ類 | ハマキムシ類 | カメムシ類 |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| | 発病葉率 | 発病葉率 | 発病葉率 | 寄生葉率 | 寄生新梢率 | 被害新梢率 | 被害果率 |
| 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 少 | 1～5 | 1～5 | 1～5 | 1～15 | 1～5 | 1～2 | 1～2 |
| 中 | 6～15 | 6～15 | 6～15 | 16～30 | 6～15 | 3～5 | 3～5 |
| 多 | 16～30 | 16～30 | 16～30 | 31～45 | 16～30 | 6～10 | 6～10 |
| 甚 | 31以上 | 31以上 | 31以上 | 46以上 | 31以上 | 11以上 | 11以上 |

ナシ巡回調査結果(100葉、50果、50新梢調査)

調査日：令和6年6月18、19日

(%)

| 調査結果 | 種類* | 黒斑病 | | 黒星病 | | 赤星病 | | うどんこ病 | | ハダニ類 | | アブラムシ類 | | ハマキムシ類 | | カメムシ類 | | シンクイムシ類 | | カイガラムシ類 | |
|-----------|-----|------|-------|------|-------|------|------|-------|-----|------|------|--------|--------|--------|-------|-------|------|---------|-----|---------|-----|
| | | 発病葉率 | ほ場率 | 発病葉率 | ほ場率 | 発病葉率 | ほ場率 | 発病葉率 | ほ場率 | 寄生葉率 | ほ場率 | 寄生新梢率 | ほ場率 | 被害新梢率 | ほ場率 | 被害果率 | ほ場率 | 被害果率 | ほ場率 | 被害果率 | ほ場率 |
| 京丹後市久美浜町① | 二十 | 6.0 | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | - | | - | | - | |
| 〃 ② | 〃 | 2.0 | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | - | | - | | - | |
| 〃 ③ | 〃 | 0.0 | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | - | | - | | - | |
| 京丹後市網野町 ① | 〃 | 1.0 | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | - | | - | | - | |
| 〃 ② | 〃 | 4.0 | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | - | | - | | - | |
| 〃 ③ | 赤 | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | - | | - | | - | |
| 京丹後市久美浜町④ | 〃 | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | - | | - | | - | |
| 〃 ⑤ | 〃 | | | 1.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |
| 八幡市 | 〃 | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |
| 京丹後市久美浜町⑥ | ゴ | 0.0 | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | - | | - | | - | |
| R6年 | | 2.6 | 80.0 | 0.3 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 平年比(例年比) | | やや少 | 並 | やや少 | やや少 | 並 | やや少 | 並 | 並 | 並 | 並 | (やや少) | (やや少) | (並) | (並) | 並 | 並 | 並 | 並 | - | - |
| | | 並 | | やや少 | | やや少 | | 並 | | 並 | | (やや少) | | (並) | | 並 | | 並 | | - | |
| 平年(例年) | | 4.5 | 69.7 | 4.4 | 46.0 | 0.6 | 20.1 | 0.0 | 1.7 | 0.8 | 15.9 | (5.4) | (29.7) | (0.0) | (1.1) | 0.3 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| R5年 | | 13.0 | 100.0 | 8.8 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| R4年 | | 4.5 | 100.0 | 5.4 | 40.0 | 1.4 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 10.0 | 0.5 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| R3年 | | 4.4 | 100.0 | 3.2 | 40.0 | 0.7 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| R2年 | | 3.0 | 60.0 | 9.8 | 100.0 | 0.2 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| R元年 | | 4.2 | 100.0 | 2.8 | 20.0 | 1.5 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 63.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| H30年 | | 4.6 | 80.0 | 4.0 | 40.0 | 1.7 | 63.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| H29年 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 63.6 | 13.5 | 72.7 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| H28年 | | 3.8 | 40.0 | 1.8 | 40.0 | 0.0 | 9.1 | 0.1 | 9.1 | 1.2 | 27.3 | 4.9 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| H27年 | | 2.7 | 50.0 | 8.2 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 50.0 | - | - | - | - | 1.6 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| H26年 | | 4.5 | 66.7 | 0.2 | 20.0 | 0.3 | 16.7 | 0.1 | 8.3 | 0.4 | 8.3 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |

*二十：二十世紀、赤：幸水、豊水等、ゴ：ゴールド二十世紀

*黒斑病の発病葉率及び発生ほ場率は二十世紀のみで算出し、ゴールド二十世紀は含めていない。