

果樹の病害虫

ナシ

病害虫等発生状況

- 1 黒斑病・・・平年比やや多かった。
- 2 黒星病・・・平年並であった。
- 3 赤星病・・・平年並であった。
- 4 うどんこ病・・・発生を認めなかった(平年比少)。
- 5 ハダニ類・・・発生を認めなかった(平年比少)。
- 6 アブラムシ類・・・発生を認めなかった(例年並)。
- 7 ハマキムシ類・・・発生を認めなかった(例年並)。
- 8 シンクイムシ類・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 9 カイガラムシ類・・・発生を認めなかった。

発生程度別基準

(96)

	黒斑病	黒星病	赤星病	うどんこ病	ハダニ類	アブラムシ類	ハマキムシ類	カメムシ類 シンクイムシ類 カイガラムシ類
	発病葉率	発病葉率	発病葉率	発病葉率	寄生葉率	寄生新梢率	被害新梢率	被害果率
無	0	0	0	0	0	0	0	0
少	1～5	1～5	1～5	1～5	1～15	1～5	1～2	1～2
中	6～15	6～15	6～15	6～15	16～30	6～15	3～5	3～5
多	16～30	16～30	16～30	16～30	31～45	16～30	6～10	6～10
甚	31以上	31以上	31以上	31以上	46以上	31以上	11以上	11以上

ナシ巡回調査結果(100葉調査)

調査:令和6年8月15、16日

(96)

調査結果	種類*	黒斑病		黒星病		赤星病		うどんこ病		ハダニ類		アブラムシ類		ハマキムシ類		シンクイムシ類		カイガラムシ類		備考
		発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	寄生葉率	ほ場率	寄生新梢率	ほ場率	被害新梢率	ほ場率	被害果率	ほ場率	被害果率	ほ場率	
京丹後市久美浜町①	二十	5.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-		
” ②	”	18.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-		
” ③	”	13.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-		
京丹後市網野町 ①	”	8.0				1.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-		
” ②	”	14.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-		
” ③	赤			4.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-		
京丹後市久美浜町④	”			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-		
” ⑤	”			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-		
八幡市	”			3.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
京丹後市久美浜町⑥	ゴ	2.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-		
R 6年		11.6	100.0	1.8	50.0	0.1	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年比(例年比)		やや多	並	やや少	並	並	並	少	少	少	少	(並)	(並)	(並)	(並)	並	並	-	-	
平年(例年)		8.4	90.3	4.9	44.0	0.2	14.4	2.4	21.6	8.6	52.3	(0.04)	(2.3)	(0.0)	(0.0)	0.04	1.8	-	-	
R 5年		16.2	100.0	13.6	80.0	0.3	27.3	0.0	0.0	0.2	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 4年		15.4	100.0	12.0	20.0	0.1	9.1	0.1	9.1	0.4	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
R 3年		5.8	100.0	5.4	80.0	0.1	9.1	0.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
R 2年		10.4	100.0	4.4	40.0	0.2	18.2	0.6	45.5	0.4	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
R元年		3.2	80.0	4.2	80.0	0.8	27.3	0.5	18.2	12.5	90.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
H30年		10.8	100.0	4.4	60.0	0.3	27.3	5.7	27.3	15.5	72.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
H29年		5.6	100.0	3.0	20.0	0.0	0.0	1.9	27.3	13.5	54.5	0.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
H28年		5.2	80.0	1.0	20.0	0.2	9.1	2.8	27.3	13.0	100.0	0.2	9.1	0.0	0.0	0.4	18.2	-	-	
H27年		3.0	60.0	1.2	40.0	0.0	0.0	5.1	27.3	22.4	81.8	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	
H26年		8.2	83.3	0.0	0.0	0.2	16.7	7.0	25.0	8.3	50.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	

*二十:二十世紀、赤:幸水、豊水等、ゴ:ゴールド二十世紀

*黒斑病の発病葉率及び発生ほ場率は二十世紀のみで算出し、ゴールド二十世紀は含めていない。