

果樹の病害虫

ナシ

病害虫等発生状況

- 1 黒斑病・・・・・・・・・・平年並であった。
- 2 黒星病・・・・・・・・・・平年並であった。
- 3 赤星病・・・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 4 うどんこ病・・・・・・・・発生を認めなかった(平年比少)。
- 5 ハダニ類・・・・・・・・・・平年並であった。
- 6 その他の病害虫・・ハスモンヨトウ卵塊：久美浜町①、②、③、⑤、⑥、網野町①、②
 ハスモンヨトウ幼虫：久美浜町①
 炭疽病：久美浜町③、網野町③

ナシ巡回調査結果(100葉調査)

調査日：令和6年9月12日、17日 (9%)

調査ほ場	種類*	黒斑病		黒星病		赤星病		うどんこ病		ハダニ類	
		発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	寄生葉率	ほ場率
京丹後市久美浜町①	二十	21.0				0.0		0.0		2.0	
" ②	"	15.0				0.0		0.0		1.0	
" ③	"	5.0				0.0		0.0		0.0	
京丹後市網野町 ①	"	20.0				0.0		0.0		0.0	
" ②	"	8.0				0.0		0.0		0.0	
" ③	赤			14.0		0.0		0.0		0.0	
京丹後市久美浜町④	"			0.0		0.0		0.0		1.0	
" ⑤	"			0.0		0.0		0.0		0.0	
八幡市	"			1.0		0.0		0.0		0.0	
京丹後市久美浜町⑥	ゴ	2.0				0.0		0.0		12.0	
R6年		13.8	100.0	3.8	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	40.0
平年比		並	並	並	並	並	並	少	少	並	並
平年		16.4	94.0	5.9	50.0	0.1	9.1	6.6	37.7	4.6	42.9
R5年		24.6	100.0	12.6	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R4年		28.4	100.0	9.6	60.0	0.2	9.1	0.4	27.3	1.3	36.4
R3年		28.2	100.0	11.6	100.0	0.1	9.1	0.5	18.2	0.0	0.0
R2年		11.0	100.0	5.0	20.0	0.1	18.2	1.3	45.5	1.6	45.5
R元年		5.4	100.0	3.4	40.0	0.3	18.2	3.7	45.5	9.3	72.7
H30年		7.8	60.0	1.8	60.0	0.4	27.3	9.5	45.5	0.0	0.0
H29年		13.2	100.0	7.4	40.0	0.0	0.0	11.3	54.5	7.9	54.5
H28年		7.8	80.0	4.8	60.0	0.1	9.1	12.0	54.5	5.8	72.7
H27年		29.6	100.0	2.4	60.0	0.0	0.0	17.6	36.4	2.0	63.6
H26年		8.2	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	50.0	18.4	83.3

*二十：二十世紀、赤：幸水、豊水等、ゴ：ゴールド二十世紀

*黒斑病の発病葉率及び発生ほ場率は二十世紀のみで算出し、ゴールド二十世紀は含めていない。

発生程度別基準 (%)

	黒斑病	黒星病	赤星病	ハダニ類
	発病葉率	発病葉率	発病葉率	寄生葉率
無	0	0	0	0
少	1~5	1~5	1~5	1~15
中	6~15	6~15	6~15	16~30
多	16~30	16~30	16~30	31~45
甚	31以上	31以上	31以上	46以上