

ナス

病害虫発生状況

- 1 うどんこ病 ・ ・ ・ ・ ・ 発生を認めなかった（平年並）。
- 2 褐色円星病 ・ ・ ・ ・ ・ 発生を認めなかった（平年並）。
- 3 すずかび病 ・ ・ ・ ・ ・ 発生を認めなかった（例年並）。
- 4 灰色かび病 ・ ・ ・ ・ ・ 発生を認めなかった（平年並）。
- 5 褐色腐敗病 ・ ・ ・ ・ ・ 発生を認めなかった（平年並）。
- 6 アブラムシ類 ・ ・ ・ ・ ・ 平年比やや少なかった。
- 7 ハダニ類 ・ ・ ・ ・ ・ 平年比多かった。
- 8 ハモグリバエ類 ・ ・ ・ ・ ・ 平年並の発生であった。
- 9 アザミウマ類 ・ ・ ・ ・ ・ 平年比やや多かった。
- 10 コナジラミ類 ・ ・ ・ ・ ・ 発生を認めなかった（例年並）。
- 11 その他の病害虫 ・ ・ ・ ・ ・ ヨコバイの発生を各地で認めた。

発生程度別基準

	調査項目	発生程度				
		無	少	中	多	甚
すずかび病	発病葉率(%)	0	1~25	26~50	51~75	76以上
	発病株率(%)	0	1~2	3~5	6~20	21以上
灰色かび病	発病葉率(%)	0	1~5	6~10	11~20	21以上
	1葉当たり寄生虫数	0	1~10	11~50	51~200	201以上
アブラムシ類	寄生葉率(%)	0	1~10	11~30	31~50	51以上
ハダニ類	寄生葉率(%)	0	1~10	11~30	31~50	51以上
	寄生花率(%)	0	1~25	26~50	51~75	76以上
アザミウマ類	1葉当たり寄生虫数	0	1~10	11~50	51~200	201以上
	成虫寄生葉率(%)	0	1~30	31~50	51~80	81以上

ナス巡回調査結果（20株の5葉及び合計50花調査）

調査日：令和4年6月14、15、16日

		うどんこ病		褐色円星病		すずかび病		灰色かび病		褐色腐敗病	アブラムシ類			ハダニ類		ハモグリバエ類		アザミウマ類				コナジラミ類			
		発病葉率	発病株率	発病葉率	発病株率	発病葉率	発病株率	発病葉率	発病株率	発病率	寄生虫数(/葉)			寄生率	寄生虫数	寄生率	被害率	被害株率	寄生虫数	寄生率	寄生虫数	寄生花率	寄生虫数	寄生率	
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	有翅	無翅	計	(%)	(/葉)	(%)	(%)	(%)	(%)	(/葉)	(%)	(/花)	(%)	(/葉)	(%)
京都市西京区	久御山町 ①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.11	0.08	0.19	8.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.30	20.0	0.62	12.7	0.00	0.0	
	久御山町 ②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.61	17.0	0.0	0.0	0.20	14.0	0.82	49.1	0.00	0.0	
	八幡市 ①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.03	0.00	0.03	3.0	0.48	8.0	0.0	0.0	0.10	6.0	1.40	63.3	0.00	0.0	
	八幡市 ②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.04	0.06	2.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.02	2.0	0.08	1.7	0.00	0.0	
	京田辺市 ①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
	京田辺市 ②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.03	3.0	0.30	10.0	0.00	0.0	
	平均	R4年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.02	0.04	1.9	0.18	4.4	0.0	0.7	0.10	6.9	0.51	23.6	0.00	0.0
	平年(例年)比	並	並	並	並	(並)	(並)	並	(並)	並	やや少	並	やや少	やや少	多	多	やや少	並	やや多	やや多	(多)	(やや多)	(並)	(並)	
	平年(例年)	0.0	0.0	0.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.22	0.12	0.34	14.5	0.04	0.8	1.0	4.3	0.13	4.7	0.12	11.3	0.00	0.1	
R3年	0.0	0.0	1.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.01	0.01	1.0	0.00	0.4	0.6	2.1	0.01	0.4	0.15	9.4	0.01	0.6		
R2年	0.0	0.0	0.3	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.16	0.04	0.19	14.8	0.02	1.2	0.2	0.8	0.05	2.7	0.15	14.7	0.00	0.0		
R元年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.03	0.00	0.03	2.8	0.03	0.2	0.0	0.0	0.02	2.2	0.03	3.3	0.00	0.2		
H30年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.08	0.02	0.10	8.8	0.00	0.0	1.2	6.0	0.08	4.6	0.09	4.3	0.00	0.0		
H29年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.71	0.96	30.8	0.13	0.7	0.2	1.5	0.06	5.0	0.23	11.6	0.00	0.0		
H28年	0.0	0.0	0.2	0.8	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.01	0.02	0.03	1.7	0.00	0.3	1.3	5.8	0.71	11.7	0.08	8.5	0.00	0.0		
H27年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.16	0.01	0.17	12.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.01	0.5	—	35.5	0.00	—		
H26年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.33	0.10	0.43	21.7	0.17	4.0	5.7	20.0	0.27	14.3	—	3.0	0.01	—		
H25年	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	—	0.0	1.04	0.24	1.28	40.4	0.01	0.8	0.0	0.0	0.02	1.6	—	—	—	—		
H24年	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	—	0.0	0.09	0.06	0.15	10.7	0.00	0.0	1.3	6.7	0.04	3.7	—	—	—	—		
発生 ほ場率 (%)	R4年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.9			42.9	14.3	85.7				0.0					
	平年(例年)比	並	並	並	並	(並)	(並)	並	(並)	並	少			やや多	並	やや多				(並)					
	平年(例年)	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0			21.8	30.0	61.8				8.5					
	R3年	0.0	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.9			14.3	42.9	42.9				42.9					
	R2年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.1			50.0	16.7	66.7				0.0					
	R元年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3			16.7	0.0	66.7				16.7					
	H30年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0			0.0	40.0	60.0				0.0					
	H29年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3			16.7	66.7	100.0				0.0					
	H28年	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7			33.3	33.3	100.0				0.0					
	H27年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0			0.0	0.0	25.0				0.0					
	H26年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3			66.7	66.7	66.7				—					
	H25年	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	—	0.0	100.0			20.0	0.0	40.0				—					
H24年	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	—	0.0	83.3			0.0	33.3	50.0				—						