

ネギ

病害虫発生状況

- | | |
|---|----------------------|
| 1 さび病 「小株」：発生を認めなかった（平年並）。 | 「大株」：発生を認めなかった（例年並）。 |
| 2 黒斑病 「小株」：発生を認めなかった（平年並）。 | 「大株」：発生を認めなかった（例年並）。 |
| 3 ペト病 | 「大株」：発生を認めなかった（例年並）。 |
| 4 えそ条斑病 「小株」：発生を認めなかった（例年並）。 | 「大株」：発生を認めなかった（例年並）。 |
| 5 アブラムシ類 「小株」：発生を認めなかった（平年並）。 | |
| 6 シロイチモジヨトウ . . . 「小株」：平年比やや多かった。 | 「大株」：発生を認めた。 |
| 7 ハスモンヨトウ | 「大株」：発生を認めなかった（例年並）。 |
| 8 ネギハモグリバエ 「小株」：平年比少なかった。 | 「大株」：例年比少なかった。 |
| 9 ネギアザミウマ 「小株」：平年並であった。 | 「大株」：例年比少なかった。 |
| 10 その他の病害虫 「小株」：発生を認めなかった。 | 「大株」：発生を認めなかった。 |

小株ネギ(葉長概ね40cm以下)調査結果(25株調査;害虫個体数は1株当たりに換算) 調査日:令和2年10月16日

調査場所	さび病		黒斑病		えそ条斑病		アブラムシ類		シロイチモジヨトウ		ネギハモグリバエ		ネギアザミウマ		葉長 (cm)
	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病度	虫数 (ノ株)	寄生株率 (%)	幼虫数 (ノ株)	寄生株率 (%)	被害株率 (%)	被害度	被害株率 (%)	被害度	被害株率 (%)	被害度	
京都市西京区1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.00	0.0	20.0	5.0	20.0	5.0	20.0	5.0	37.0
京都市伏見区1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.16	12.0	12.0	3.0	40.0	10.0	40.0	10.0	34.0
京都市伏見区2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	8.0	2.0	8.0	2.0	34.0
八幡市1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0
八幡市2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	24.0	6.0	24.0	6.0	38.0
平均	2年	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.03	2.4	6.4	1.6	18.4	4.6	18.4	4.6	35.4
	平年(例年)比	並	並	(並)	(並)	並	やや多	やや多	少	少	並	並	並	並	—
	平均	0.0	0.0	—	—	0.004	0.4	0.01	1.3	55.5	14.1	31.5	8.1	27.0	—
	元年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016	1.6	0.00	0.0	38.4	8.6	58.4	14.6	26.4	—
	30年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016	1.6	0.00	0.0	49.6	12.4	33.6	8.4	28.0	—
	29年	0.0	0.0	0.0	0.2	0.000	0.0	0.00	0.0	31.2	7.8	70.4	17.6	32.2	—
	28年	0.0	0.0	1.6	0.4	0.000	0.0	0.10	12.0	42.4	10.6	39.2	9.8	33.7	—
	27年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.00	0.0	32.8	8.6	48.8	14.6	29.8	—
	26年	0.0	0.0	—	—	0.000	0.0	0.00	0.0	40.0	10.0	32.0	8.0	22.8	—
	25年	0.0	0.0	—	—	0.000	0.0	0.00	0.0	68.7	19.8	8.7	2.2	18.7	—
	24年	0.0	0.0	—	—	0.000	0.0	0.00	0.0	87.0	21.8	19.5	4.9	31.5	—
23年	0.0	0.0	—	—	0.005	0.5	0.00	0.0	78.0	19.6	4.0	1.0	18.8	—	
22年	0.0	0.0	—	—	0.000	0.0	0.01	0.5	86.5	22.3	0.5	0.1	28.1	—	
発生 ほ場率 (%)	2年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	40.0	80.0						
	平年(例年)比	並	並	(並)	(並)	並	やや多	少	並						
	平均	0.0	0.0	—	—	7.3	5.3	92.0	72.3						
	元年	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	60.0	80.0						
	30年	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	100.0	100.0						
	29年	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	80.0	100.0						
	28年	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	40.0	100.0	100.0						
	27年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	80.0						
	26年	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	100.0	100.0						
	25年	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	100.0	50.0						
	24年	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	100.0	75.0						
23年	0.0	0.0	—	—	12.5	0.0	100.0	25.0							
22年	0.0	0.0	—	—	0.0	12.5	100.0	12.5							

大株ネギ(葉長概ね40cm以上)調査結果(25株調査) 調査日:令和2年10月16日

調査場所	さび病		黒斑病		ペト病		えそ条斑病		シロイチモジヨトウ			ハスモンヨトウ		ネギハモグリバエ		ネギアザミウマ		葉長 (cm)	
	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病度	発病株率 (%)	発病度	幼虫数 (ノ株)	寄生株率 (%)	被害株率 (%)	寄生株率 (%)	被害株率 (%)	被害株率 (%)	被害度	被害株率 (%)	被害度	被害株率 (%)	被害度		
京都市西京区1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	6.0	52.0	13.0	43.0		
京都市伏見区1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.08	8.0	8.0	0.0	0.0	8.0	2.0	28.0	7.0	42.0			
京都市伏見区2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.28	28.0	44.0	0.0	0.0	8.0	2.0	36.0	9.0	41.0			
京都市伏見区3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.08	4.0	20.0	0.0	0.0	4.0	1.0	4.0	1.0	45.0			
八幡市1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04	4.0	16.0	0.0	0.0	16.0	4.0	4.0	1.0	53.0			
八幡市2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.0			
八幡市3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.24	16.0	96.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.0			
平均	2年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.11	9.1	26.9	0.0	0.0	8.6	2.1	17.7	4.4	44.9			
	(例年)比	(並)	(並)	(並)	(並)	(並)	—	—	—	(並)	(並)	(少)	(少)	(少)	(少)	(少)	—		
	平均	0.0	0.4	5.8	2.6	0.7	—	—	—	1.8	0.2	48.5	13.4	50.8	25.4	50.6			
	元年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.8	4.0	0.0	0.0	39.2	9.8	48.8	12.6	47.2			
	30年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.8	4.0	0.0	0.0	39.2	9.8	48.8	12.6	47.2			
	29年	0.0	0.0	0.0	3.0	0.8	0.02	1.0	3.0	0.0	0.0	46.0	16.5	100.0	25.0	50.1			
	28年	0.0	0.0	0.0	2.0	0.5	—	—	—	1.0	1.0	57.0	14.5	40.0	10.0	54.5			
	27年	0.0	1.3	0.0	8.0	2.0	—	—	—	8.0	0.0	61.3	16.3	66.3	66.7	49.0			
	26年	0.0	1.0	35.0	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	55.8		
	発生 ほ場率	2年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.7	0.0	71.4	0.0	71.4	71.4	71.4	71.4	71.4	71.4	71.4	
		(例年)比	(並)	(並)	(並)	(少)	(少)	—	(並)	(少)	(少)	(少)	(少)	(少)	(少)	(少)	(少)	(少)	(やや少)
平均		0.0	12.5	12.5	41.7	—	—	—	4.2	92.7	89.3								
元年		0.0	16.7	0.0	66.7	—	—	—	0.0	83.3	100.0								
30年		0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	0.0	80.0	80.0								
29年		0.0	0.0	0.0	50.0	—	—	—	0.0	100.0	100.0								
28年		0.0	0.0	0.0	25.0	—	—	—	25.0	100.0	100.0								
27年		0.0	33.3	0.0	66.6	—	—	—	0.0	100.0	66.6								
26年		0.0	25.0	75.0	—	—	—	—	0.0	—	—								

(程度別基準)

調査項目	無	少	中	多	甚
さび病 発病株率	0	~20	~40	~60	~100
アブラムシ類 寄生株率	0	~25	~50	~75	~100
ネギハモグリバエ 被害株率(程度)	0	~25	~50	~75	~100
ネギアザミウマ 被害株率(程度)	0	~25	~50	~75	~100

※ ハモグリバエ、アザミウマの被害度 = (4A + 3B + 2C + D) / (25 × 4) × 100

- A: 1株被害率率 ~100%
- B: 1株被害率率 ~50%
- C: 1株被害率率 ~30%
- D: 1株被害率率 ~10%

ネギえそ条斑病 発病程度別調査基準

発病程度A: 全葉面積の31%以上に病斑が認められる。
 発病程度B: 全葉面積の21~30%に病斑が認められる。
 発病程度C: 全葉面積の11~20%に病斑が認められる。
 発病程度D: 全葉面積の1~10%に病斑が認められる。
 発病程度E: 病斑の発生が認められない。

$$\text{発病度} = \frac{4A + 3B + 2C + D}{4 \times \text{調査株数}} \times 100$$